




TSBIBLIOTHEEK GENT



0000191246



med
4621
HANDLEIDING

TOT DE

Med 4621
KENNIS EN GENEEZING

VAN DE

Z I E K T E N

DER

K I N D E R E N.

In het Zweedsch geschreeven

DOOR DEN HEERE

N. ROSÉN VAN ROSENSTEIN,

LYF-ARTS DES KONINGS VAN ZWEEDEN EN
RIDDER VAN DE NOORD-STER-ORDE.

Vertaald, met Aanteekeningen en Byvoegselen vermeerderd.

DOOR

EDUARD SANDIFORT,

*Med. Doct. Hoogleeraar in de Genees- Onlced- en
Heel-kunde op 's Lands Hooge School te Leyden.*

TWEEDE DRUK

Aanmerkelyk vermeerderd. Waarby gevoegd is eene
Verhandeling over de Gebreken, welke de Kin-
deren somtyds kort na de geboorte treffen,
en tot de Heelkunde betrekking hebben.

TWEEDE DEEL.

IN GRAVENHAGE

By **ISAAC VAN CLEEF,**

MDCCLXXIX.

224

HANDLEIDING

TOT DE

KENNIS EN GENEEZING

VAN DE *Med 4627*

ZIEKTEN

DER

KINDEREN.



XXII. HOOFDSTUK.

Van de Tuschenpoozende Koorts.



ANNEER de kinderen, voor de eerstemaal, door eene tuschenpoozende koorts aangetast worden; dan is dezelve by hen, gelyk by anderen, van zeer langen duur, en word ongeregeld, indien men op dezelve niet na behooren acht geeft. Zoodra die ongeregeld geworden is, noemt men haar in 't Zweedsch gemeenelyk *Aeltan*, 't geen dus geene byzondere ziekte, maar alleen eene ongeregelde tuschenpoozende koorts is.

De koorts houdt niet bestendig aan, maar blyft, op zekere dagen of uren, wech, en komt daarna op zekere uren weder; op welken tyd de lyder, gelyk men gewoon is te zeggen, den aanval (*paroxysmus*) heeft. Elke aanval begint met eene meerdere of mindere koude; daarop volgt eene hit-

II. DEEL.

A

te,

te, en op deeze zweet. Na dat het zweeten opgehouden heeft, bevind men zich wederom, gedurende zekere uren, wel, tot dat zich een nieuwe aanval opdoet. Komt de koorts alle dag weder, dan noemt men haar eene alledaagfche koorts: komt zy om den anderen dag, dan word zy eene anderendaagfche koorts geheeten: doch als zy op den derden dag wederkomt, dan noemt men haar de derdendaagfche koorts. Openbaart zich dezelve alle dag, doch zoo, dat, by voorbeeld, de aanval op maandag, ten aanzien van den tyd en de heevigheid, overeenkomt met dien, die zich des woensdags openbaart, en de aanval des dingsdags, in tyd en heevigheid, gelykt naar dien, die 's donderdags waargenomen word; dan noemt men deeze tusschenpoozende koorts, eene dubbelde anderendaagfche. Word men twee dagen na den anderen door de koorts aangetast, en is men op den derden dag vry; dan hiet dezelve eene dubbelde derdendaagfche koorts. Wanneer hy, die de derdendaagfche koorts heeft, dagelyks begint de koorts te krygen; dan zegt men gemeenelyk, dat de derdendaagfche koorts zich veranderd heeft in eene alledaagfche. Dit is egter eigenlyk zoo niet, maar hy heeft als dan een driedubbelde derdendaagfche koorts; want, geeft men nauwkeurig acht, dan komt, in tyd en heevigheid, de aanval des donderdags overeen met dien van maandag, die van vrydag met dien van dingsdag, en die van zaterdag met dien van woensdag.

Men moet elken aanval wel en met geduld afwachten, alzo anders de koorts ligt ongeregeld worden kan.

kan. Men neemt immers dagelijks waar, dat, als men niet geduldig verdraagt het zweeten, welk, in elken aanval, op de hitte volgt, maar kouder drank gebruikt, de kleederen afwerpt, van hembd veranderd, of opstaat, het zweeten alsdan belet word, en men in deszelfs plaatse eene nieuwe koude en hitte, of alleenlyk eene hitte krygt, die niet vermindert, voor dat men weder op nieuw aan het zweeten geraakt. Begaat men alsdan denzelfden mislag; dan krygt men andermaal eene koude en hitte, die niet overgaat, voor dat men wederom aan het zweeten raakt, dit nu moeten wy afwachten, tot dat het van zelve ophoud; wanneer men zich laat afdroogen, en een schoon hembd aantrekt. Op gemelde wyze word de tusschenpoozende koorts mede by kinderen ongeregeld; want vermits zy op geene andere wyze, dan door schreyen, kunnen te kennen geeven de ongemakken, die zy in de hitte en onder het zweeten uitstaan; zoo neemt men hen uit de wieg, om hen te stillen; zy worden koud, en het zweeten word gestuit. Hier door geeft men gelegenheid tot meer aanvallen, die het kind zoude ontgaan hebben; indien men hetzelfde had laten stil liggen, tot dat de regte aanval zich geëindigd had door een toereikend zweet.

Ik zal my niet ophouden met gisfingen, aangaande de waare oorzaak van de tusschenpoozende koorts, noch opnoemen de gevallen, die dezelve voortbrengen (*). Het zal voldoen, als ik opgeeve, hoe men

(*) Aanmerkelyk is het, dat, offchoon men in den

A 2

be-

4 *Van de Tufchenpoozende Koorts.*

men die geneeze , en hoe noodzaakelyk het zy, het in de geneezing niet te laten aankomen op den tyd en de natuur, want, fchoon zulks op andere plaatfen dus mogt gelukt zyn, zoo zal men nogtans by ons meêr dan te veel bemerkt hebben, dat daarop niet te vertrouwen zy. De verwifeling van koude en hitte maakt, binnen weinige aanvallen, het lighaam zoo zwak, dat de kragten verdwynen, en ontbindt het bloed zoo zeer, dat deszelfs vloeibaarfte deelen door het zweeten verteerd worden, het vet verminderd, de gezonde kleur in het aangezicht wechgaat, de lyder geel word, verhardingen in de ingewanden, eene opgezette maag, de waterzugt, en zulke ziekten krygt, die naderhand niet te geneezen zyn. Indien het kind zeer zwak is, en de tufchenpoozende koorts in den herfft krygt; dan is het te meêr noodzaakelyk, de geneezing niet lange uitteftellen, alzoo het anders zeer gemakkelyk, na zoo eene ziekte, in de Engelfche ziekte vervalt (*).

Van

beginne van de koorts koude befpeurt, men egter even warm is, als in de gezondheid, of zelfs vyf ja zes graaden warmer; waar van ons de Thermometer overtuigt.

(*) Men noemteene Herfft-koorts, welke tufchen Auguftus en February zich openbaard. De overige zyn voorjaars-koortfen, De laafte geneezen dikwils van zelve, de eerfte niet. Hoe vroeger de Herfft-koortfen beginnen, hoe meêr menfchen daardoor aangetaft worden,

Van volwasfenen verhaalt men , dat hen fomtyds eene langduurige tusschenpoozende koorts heilzaam geweest zy. De beroemde Wiskunstenaar **DE LA HIRE** verloor , door eene derdendaagfche koorts , zyne hartkloppingen , die hem zoo zeer bezwaard hadden , en bereikte eenen hoogen ouderdom. Door deeze zelfde koorts heeft een ander heevige en langduurige pynen in zyne regter fchouder overwonnen. Een man van aanzien , die veele jaaren met rheumatieke pynen in de linker fchouder geplaagt was geweest , kreeg in den herfft 1766. eene derdendaagfche koorts , en na weinige aanvallen bleef de pyn wech ; nadat men de koorts door ammoniak-zout en kina overwonnen had , openbaarde zich de pyn op dezelfde plaats wederom. Deeze verdwynende kreeg hy tand-pyn , welke men wechnam door eene fterke trekpleifter , boven aan den linkerarm geplaatft. Naderhand heeft hy nergens meer pyn befpeurt. Dit heeft egter geen plaats by kinderen : Derzelver meefte ziekten komen voort uit een zuur , en dit word door de tusschenpoozende koorts meêr vermeerderd , dan verminderd. Het eenigft voordeel , dat ik by kinderen van deeze koorts bemerkt hebbe , is , dat ze den wasdom bevorderd heeft. Volgens het verhaal van den Hooggel : Heere **SCHULTZ** , wierd een kind , dat derde-half jaar lang de tusschenpoozende koorts had , geduurende deezen tyd eene el langer.

Ik ontkenne niet , dat kinderen hunne eerfte tusschenpoozende koorts fomtyds zonder genees-middelen zouden kunnen overwinnen , voornamentlyk

als zy door dezelve in het voorjaar aangetast worden: Maar krygen zy eene herfst-koorts; dan blyft zy niet ligt wech voor twee of drie maanden, ja, dikwils in nog langer tyd niet, ten zy het kind een hard gezwel in de linker zyde onder de ribben (*placenta febrilis*) (*), of eene andere ziekte, die de koorts verdryft, kryge. Ik herinnere my, dat een kind drie maanden lang aan eene tusschenpoozende koorts ziek was, doch dezelve kwyt raakte, wanneer hetzelfde door zyne zuster met de pokjes besmet wierd. Een kind, welk de anderendaagsche koorts had, wierd op den goeden dag ingeënt. De koorts kwam niet weder, noch terwyl het de pokjes had, noch naderhand. *Jnrikes Tidningar* 1769. n. 47.

De

(*) Deze zwelling is eene soort van onvolkome scheiding (*crisis*), en schynt overeen te komen met 't geen HIPPOCRATES eene verstopping der milt gezegt heeft te zyn. In heete lugtstreeken word dezelve meer waargenomen (BROCKLESBY'S *Observat.* pag. 262.) By kinderen moet deeze zwelling van minder belang zyn, dan by volwasfenen, vooral in veld-hospitaalen; dewyl SYDENHAM en ROSÉN in de Herfst-koortsen by de eersten daar uit eene spoedige geneezing belooven; en PRINGLE, MONRO, en BROCKLESBY dezelve kwaadaartig gevonden hebben, zoo dat zy verzeld of gevolgt wierd door eene waterzugt. Het geen PRINGLE gegift heeft, hebben MONRO en BROCKLESBY by het openen der lyken gevonden, namentlyk, dat de zwelling bestondt in eene verstopping en vergrooting van de milt, welke vier ja vyf ponden zwaar geweest is.

De tusschenpoozende koorts verbergt zich somtyds onder andere ziekten, en is alsdan moeijelyk te kennen. Ik zag in *Gefle* een kind, dat om den anderen dag zeer sterk uit de neus bloedde, en reeds zoo veel bloed was kwyt geraakt, dat het, buiten twyffel, daar by het leven zou verloorren hebben, indien ik aan hetzelfde niet aanstonds den koorts-bast gegeven had. Eene Dame wierd alle twee dagen geplaagd met eene heevige pyn en roodheid der oogen, welk toeval op gezette tyden wederkwam, en door niets, dan door de Kina, te overwinnen was. Ik bringe my te binnen eenen aanzienlyken man, die om den anderen dag in de regter zyde aangetast wierd door toevallen, die anders met den steen vergezeld gaan, en dien ik insgelyks door den koorts-bast genas. Een ander kreeg op denzelfden tyd eenen sterken droogen hoest, daarop eenen diepen slaap, en raakte toen aan 't zweeten; deeze wierd mede door de Kina gered. Zulk eene verborgen koorts kent men hierdoor, dat elke aanval zynen bepaalden tyd houdt, met geeuwen begint, en door zweeten eindigt, en dat het water, welk in de aanvallen geloosd word, op den bodem van het glas een grondzetzel formeert, niet ongelyk aan gemaalen steen. Zoodanige tusschenpoozende koortsen vereisfchen eene spoedige hulp.

Het gevaarlyft zyn die, welke by den aanval vergezeld gaan met andere toevallen; als, met braakingen, of met den loop te gelyk; of met bloed vermengde afgangen; of met pyn aan den linker mond van de maag; of met een sterk zweet, dat de hitte

niet vermindert; of met een koud zweet; als mede zulke koortfen, die, zonder eene klaarblykelyke oorzaak, met flauwtens en benauwdheden verfchy-
nen; of als de koude niet ophoudt en in hitte en zweet eindigt; of als zy eenen diepen flaap verwekken, als of men eene beroerte had; of die zich veranderen in eene aanhoudende kwaadaartige koorts. Deeze zyn doodelyke tufchenpoozende koortfen, die men aanftonds door toereikende giften van den koorts-baft moet tegen gaan, want anders verliest de lyder het leven, eer hy den derden, vierden, of vyfden aanval overwonnen heeft. Soortgelyke koortfen vertoonen zich ook fomtyds by ons; doch voornamentlyk neemt men dezelve waar in Italien, Engeland, op het Eiland Minorca, en in Hannover. Men houdt in 't algemeen fttaande, dat zy, die aan de tufchenpoozende koorts fterven, altyd het leven verliezen geduurende de koude; doch ik vinde, dat op Minorca de meeften onder de hitte geftorven zyn, en dit verzekerd ook LIND.

Dit alles brenge ik alleen by, met oogmerk, om te toonen, dat de tufchenpoozende koorts geene ziekte zy, waar mede te fpotten is, maar die eene goede behandeling, en, zoo zich kwaade toevallen openbaaren, eene fchielyke geneezing vereifcht: Ik zal my derhalve spoeden, daarvan zoodanige onderregtingen te geeven, die by kinderen te pas komen.

Wanneer een kind met de tufchenpoozende koorts aangetaft word; dan moet men hetzelve in een warm bed, en wel, als het mogelyk is, in een
groot,

groot, togt-vry, vertrek leggen: Want men bemerkt altyd eenen zuuren reuk, ter plaatse, daar iemand aan deeze koorts ziek legt; welke reuk voortkomt van de uitwaasfeming, die de lyder in een klein vertrek gemakkelyk tot zich zelve trekt, en waardoor de koorts langduuriger word. Uit deeze oorzaak moet het vertrek ook zuiver gehouden, en de grond met versche takken van denne boomen belegd worden; en, de tyd van het jaar, het weder, en de omftandigheden het toelaatende, dan moet fomtyds de deur, of een venster, geopend worden op de uren, als de lyder vry van de koorts is; egter met die voorzigtigheid, dat geen togt op den lyder valle. Indien men den lyder na een boven-vertrek brengen kan; dan is het zoo veel te beter: maar kan dit niet geschieden; dan moeten gestadig eenige houten in de kagehel, of in den schoorsteen branden, ten einde de lugt in het vertrek altoos zuiver gehouden worde.

Gedurende de koude moet de lyder niet drinken; het geene hy alsdan gebruikt, kwelt hem daarna, vermeerdert de onrustigheid, en verlengt den aanval (a). Beter is het, dat hy, van koorts vry zyn-

(a) Gantsch anders zyn de gedagten van den Grootten BOERHAAVE, en van deszelfs allezins beroemden Uitlegger, die op deezen tyd der ziekte een rykelyk gebruik van ontblindende, verdunnende, en openende vogten aanpryzen, terwyl de rede mede voor hun gevoelen pleit, alzoo op den genoemden en gevaarlyksten tyd der ziekte de beweeging van het bloed na de

zynde, rykelyk drinke een' welsmaakenden drank van de *radices graminis* & *taraxaci*, en kort voor den aanval, volgens den raad van TISSOT, een af-trekfel van vlierbloemen met honig. Doch, begint de lyder te braaken; dan bevordert men dit door lauwwater; 't welk derhalven by der hand zyn moet.

Gedurende de hitte moet hy wat warmen thee, met eenige droppen Rhynschen wyn, drinken, of bier-wey met water verlengd; want dan lescht dezelve beter den dorst; of brood-water, dat met wat citroenen-sap, zuiker, en een weinig Rhynschen wyn, wel-smaakend gemaakt is; of thee met citroen-marmelade; of even veel dun bier en water, met een weinig citroenen-sap en zuiker gemengd; of gersten-water, waar in men een weinig geley van herts-hoorn ontbindt; of men neemt ingemaakte aal-besfen, Noordsche braamen (*bacca rub. arct.*) aard-bezien, wolken-bezien (*bacca rubi Chamæmori* (*)) kersfen, veen-bezien (*vac-*
ci-

uiteindens der slag-aderen belet is, en hetzelfde by het regter harte en de long opgehouden word, doch door het gebruik van ontbindende vogten deeze tyd verkort word, en naderhand, door de daar op volgende hitte, de stilstaande vogten beter in beweeging gebragt en ontbonden worden.

(*) Deeze groeijen rykelyk in Zweeden en Noorwegen, en zyn zeer gezogt van wegens het zuuragtige en verkoelende sap. Zy worden egter des winters meer, als een salade, dan als een Genees-middel gebruikt.

cinium oxycoccus) (*); giet op eene van deeze soorten kookend water, 't welk, als het begint lauw te worden, 'er afgegooten, en met een weinig Rhynschen wyn vermengt word; ook kan men geleyen, die daar uit bereid zyn, in water smelten.

De lyders krygen schielyk tegenzin in eenen en denzelfden drank; en daarom is het noodig, meer dan eene soort daarvan te hebben, om dien te kunnen verwisfelen. Het is te beklagen, dat de dorst door geene andere, dan zuuragtige dranken, kan gestild worden. De tusschenpoozende koorts heeft daarenboven, voornamentlyk by kinderen, zuur by zich, en in zoo verre zou zuiver water, of eene flappe hoener-soep, een goede drank zyn. Drinkt men niet, voor dat de hitte haare hoogte bereikt heeft; dan is het zoo veel te beter.

De hoofd-pyn, die zich in deezen tyd openbaart,
ver-

bruikt. Tot dat oogmerk brengt men dezelve uit *Norrland*, alwaar zy vooral gevonden worden, naar de zuidelyke Provintien van Zweeden. Men vindt de afbeelding daar van by OEDER *Flor. Dan. Tab. 1. M.*

(*) Schoon deeze besfen meerder zuur zyn, dan andere van hetzelfde geslagt, worden zy egter door de Rusfen in groote meenigte rauw gegeten. Men verkoopt dezelve bevroozen in Petersburg, en begiet dezelve, nadat zy ontdooit zyn, met water, dat men den geheelen winter daar op laat staan. Dit krygt daar door de kleur van Bourgogne-wyn, en is een goede drank. Men zie DE GORTER *Flora Ingrica pag. 59.* en OEDER *Flor. Dan. Tab: 80.*

verdwynt gemakkelyk, indien de lyder eenen dunnen doek over het aangezicht kan verdraagen. De uitwaasfemingen, die als dan te rug gehouden worden, maaken de uitwaasfemende vaten van het aangezicht slap, zoo dat hetzelfde schielyk begint te zweeten. Koude omslagen zyn als dan gevaarlyk. Het zweeten moet men geduldig afwagten. Geduurende hetzelfde mag men, zoo dikwils als men wil, doch weinig teffens, en niet koud, drinken. Het is niet noodig, dat men de handen onder de deken houde, maar het voldoet, als men die met eenen doek, of neus - doek, bedekt; want als zy bloot liggen, dan houdt het zweeten te vroeg op. Dit op zyn' tyd van zelve ophoudende, dan trekt men een schoon hembd aan, dat droog, warm, en met *maftix* moet beroekt zyn. Is hetzelfde niet droog en warm genoeg; dan kan het niet aan zich trekken de onreine vogten, die in de zweet-gaten te rug gebleeven zyn; en door het berooken verhindert men, dat de uitwaasfemende vaten slap worden. Wanneer de aanval voorby is, dan mag men het kind uit het bed neemen, en kan zich alsdan met hetzelfde voor een vuur plaatsfen, ten einde de dampen, die nog uitwaasfemen, zich dies te meêr verdeelen, en niet in de zweet-gaten, of op de huid, zouden blyven staan. Eer men het kind weder na bed brengt, moet men de lakens veranderen, of, als men dezelfde gebruikt, die met een heet yzer uitstryken.

Met het eeten schikt men het zoo, dat de lyder niets gebruike geduurende den aanval, ook niets kort na denzelyven; maar omtrent vier of vyf uren
te

te vooren, ten einde de spys - verteering voorby zy, eer de aanval komt. In de tusschenpoozende koorts verbiedt men in 't algemeen melk, visch, gezouten en gerookt vleesch, groene ongekookte spyzen, hard-gekookte eyeren, en al wat vet is. Konnen zy zich vergenoegen met gebraden vleesch en ryfsoepen, bier-soepen met eyeren, en bier-en brood; dan is het wel. Nooit moeten zy zich met eeten overlaaden, maar slechts zoo veel genieten, als tot onderhoud der kragten noodig is. Door honger eene tusschenpoozende koorts te verdryven, gaat niet a an. *TULPIUS* toont met voorbeelden, dat zulks kwaad is afgeloopen.

Zoo dra de eerste aanval overwonnen is, moet men aanstonds daar op bedagt zyn, wat het kind op de goede uren zal innemen; en dewyl dit bestaat, of in een braak-of laxeer-middel, die beiden de kragten eenigzins aantasten; zoo is het noodzaakelyk, dat een van beiden aanstonds gebruikt worde, voor dat de koorts al te zeer de overhand neemt, en de kragten verminderd heeft.

Het braaken is noodig, als men weet, dat het kind eene sterke eet-lust gehad, veel, inzonderheid vaste en harde spyzen, gegeten heeft: als de tong en keel onzuiver zyn; wanneer het eenen lelyken smaak in den mond, en eenen stinkenden adem heeft, en by den aanval met draajingen in het hoofd aangetast word; wanneer de onderste lip beeft, en het kind alsdan over walgingen klaagt, of wezentlyk gebraakt heeft. By zulke omstandigheden moet men een braakmiddel uit de *Ipecacuanha* geeven, 't geen

ge-

gemengd en ingegeven word op die wyze, als ik in de afdeeling over den kink-hoest aangewezen hebbe. Doch de vraag is, welke de bekwaamste tyd daar toe zy. Gemeenelyk neemt men hetzelfde in, drie uren voor den aanval, ten einde het zyne werking gedaan hebbe, eer de aanval komt. (*) Doch ik ben volkomen overtuigd, dat het van groot nut zyn zou, wanneer men zich van hetzelfde aanstonds na den aanval bediende, en daarom wenschte ik wel, dat men het terstond na den eersten of tweeden aanval, wanneer de kragten het nog toelaaten, mogt gebruiken: Want als het kind meêr-maalen de koorts gehad heeft, dan duurt het lange, eer het zich na den aanval kan herhaalen. Gelyk men, op het einde van elken aanval, uitwendig zweet, en daardoor een gedeelte van de stoffe der koorts wech gaat; alzoo zweet men ook inwendig. Het gedeelte van de stoffe der koorts, welk het laast-ge-noemde zweet vergezelt, word binnen het lighaam gehouden, blyft in de maag en darmen, als mede in

(*) Dit tydftip is voornamentlyk door SYDENHAM en BOERHAAVE aangepreezen. THOMSON (*Medic. Essays and Observat. in Edinb. vol. 4. pag. 406*) heeft, twintig jaaren lang de beste uitwerking daar van ondervonden, in het begin van de koude, of ook, deeze reeds eenigen tyd geduurt, en het lighaam geschat hebbende, met het begin van de hitte. Hier mede stemt ook overeen GRAINGER *Hist. febris anomale Batavæ* p. 76. De Hr. COLOMBIER verkiest dezelfden tyd als de Hr. ROSÉN *Code de medicin. milit. Tom. 4. pag. 88. M.*

in de lever ſtaan, en begeeft zich uit dezelve met de gal in de darmen. Geeft men acht op den tyd, om hetzelve uittedryven, eer het, door de opſlorpande en melk-vaten, in ſtaat geraakt, om weder in het bloed te rug te keeren; dan heeft men veel gewonnen. Daarom ziet men ook, dat ſommigen door een eenig braak-middel de koorts overwinnen. Kan men uit de opgegeeven tekenen afneemen, dat meêr dan een braak-middel noodig zy; dan geeft men het op dezelfde wyze na den volgende aanval.

Bevindt men, integendeel, dat de maag hard en opgezet is, en de lyder klaagt, dat de winden in den buik rommelen, en de pynen in de lendenen heevig zyn; dan is het noodig, dat men hem een of meêr purgeer-middelen geeve. Ik ben meêſtentyds gewoon, my van het volgende poeder te bedienen.

Rad. Jalapp. gr. x.

Ari præparat.

Sal. Abſinth. aa. gr. iv.

Tartar. vitriol. gr. ij.

M. F. Pulvis.

Dit poeder laat ik op den goeden dag in eene ſlappe hoener-ſoep, zoo vroeg neemen, dat het zyne werking gedaàn hebbe, twee uren voor dat de naaſte aanval verwacht word.

Zoo lange de genoemde tekenen zich openbaaren, kan dit poeder op den goeden dag herhaald wor-

worden; en ik kenne veelen, die alleen daar door van de koorts zyn bevryd geworden.

In de dubbelde anderendaagsche koorts is de aanval, om den anderen dag, heeviger, en dewyl de voormiddag na den fimften aanval altyd het beſte is; zoo verkieft men deezen tyd, om het laxeer-middel te geeven.

Wanneer de derde aanval voorby is; dan laat men het kind op den goeden tyd, alle twee of drie uren, een' ſpys - lepel vol van het volgende drankje tegen de koorts neemen: Men ſmelt een dragme zout van alſem in zes oncen water; giet daarop allengskens vier lood citroenen-ſap, of zoo veel, tot dat men geene opbruiſing meer beſpeurt. Hier by neemt men vervolgens zoo veel ſtroop van oranje-ſchillen, als noodig is, om deezen drank aangenaam te maaken. Heeft men geen citroenen-ſap; dan bedient men zich van goeden wyn-azyn; 't geene men daar van inneemt tegen den naaſten aanval, word een weinig warm gemaakt. Indien de aanval, die zich als dan zoude moeten openbaaren, niet wechblyft; dan onderzoekt men nauwkeurig, of de voornoemde tekenen, die te kennen geeven, of 'er braak-dan laxeer-middelen noodig zyn, nog waargenomen worden; in welk geval men zich op nieuw bedient van een van beiden, en daarna met het drankje zoo lange voort gaat, tot dat men de koorts geheel en al is kwyd geraakt.

Men heeft reden te hoopen, om op deeze wyze van dezelve bevryd te worden: 1. indien de aanval, die op den vyfden dag komt, noch langer;
noch

noch heviger is; 2. als de pis na den aanval troebel word, en op den grond een bleek grond-zetzel maakt; 3. wanneer elke aanval naderhand minder word; 4. als de kragten niet te zeer afneemen; en 5. als de lyder nu aan de neus of lippen een uitflag krygt; want deeze, zich vroeger openbaarende, geeft, gelyk ik dikwils waargenomen hebbe, eene hardnekkige tufchenpoozende koorts te kennen, te meêr, wanneer het de eerfte koorts is.

Befpeurt men deeze tekenen niet, maar blyft de koorts duuren; dan moet men evenwel met het gebruik van het opgegeeven drankje voortgaan, en te gelyk tragten te weeg te brengen, dat het kind, in plaatfe van koude of huivering, hitte kryge, en aan 't zweeten geraake op het uur, wanneer men de koorts verwacht. In zoo verre is het noodig, dat men wel acht geeve, hoe veele uren dezelve voor- of agterwaards gaa, dan of zy altyd op het zelfde uur zich openbaare, (welk laafte eene langdurige koorts voorfpelt), anders weet men niet, op welk uur de lyder aan het zweeten moet gebragt worden.

Met dit oogmerk heb ik verfcheide middelen gebruikt :

I. Heb ik den lyder, een heel of half uur voor dat men de koorts verwagtte, in een warm bed gelegd, en hem warmen thée, of dun warm bier en brood met comyn laten drinken, en daarenboven over de maag geflaagen eenen dikken wollen lap, gedoopt in een mengfel van eene gelyke quantiteit ongezouten boter en azyn, 't welk ik over het vuur

II. DEEL.

B

t'fa-

t'famen had laten smelten. Den lap wringt men uit, rolt hem in eenen dunnen doek, en legt hem zoo warm op de maag, als het kind 't verdraagen kan.

2. By anderen heb ik te gelyk deezen lap met een weinig Hongaarsch - Koninginne - water (*Aqua Regina Hungaria*), wyn, of, deeze niet by der hand zynde, met wat brande-wyn besprengd.

3. Wederom by anderen heb ik een heet roggebrood door midden laten snyden, hetzelfde in dun linnen gerold, daar op gegooten Hongaarsch - Koninginne - water, of campher - brandewyn (*Spiritus vini camphoratus*), en hetzelfde zoo warm over de maag laten leggen, als het kind 't verdraagen kon.

Het daarop gevolgd zweeten heb ik, gedurende den aanval, onderhouden met warmen thée, bierwey, of 't geene voor 't kind het aangenaamste was om te drinken. Wanneer de naaste aanval verwacht word; dan gaat men even eens te werk; en daarmede is de tusschenpoozende koorts gemeenlyk geneezen; te weeten, als dezelve van geene kwaade soort is.

Hier op zyn byna alle geneezingen der oude wyven in de tusschenpoozende koortsen gegrondt. Het is bekend, dat onze voor-ouders eene spaansche vlieg-pleister leiden, of in den nek, of aan de binnen-zyde van eene der handen, en het zoo schikten, dat de pleister zou trekken op den tyd, wanneer men de koorts verwachtte. Hier door openbaarde zich eene hitte en zweet in plaatse van koude

de. Even zoo leggen de vrouwen de zoogenaamde egel-koolen (*Aeltgräs, Ranunculus Flammula*) op de vlakke der hand, welk middel insgelyks eene bladder trekt, en dikwils helpt, als het werkt op dentyd, wanneer de kóorts zich moest openbaaren, en daar door eene zoo sterke hitte verwekt, dat de koude de overhand niet kryge. Anderen wederom neemen theer en knoflook, welke zy over de maag, voornamentlyk in de gedaante van een hoefzyzer fmeeren: Dit trekt, of kleine, of groote blaazen. Anderen neemen even veel roet, gember en zout, waar van zy, door middel van het dooir van een ey, eene pleifter maaken, die op de genoemde plaats aan de hand gelegd word. Deeze word alle twaalf uren verfch aangelegd, tot dat zy hulpe aanbrenge. Anderen maaken eene foortgelyke pleifter, of omslag van roet, ammoniak-zout, spinne-webben, peper, theriakel, of terpentyn-olie. Het komt op hetzelfde uit, wat men neemt, als 'er flegts eenige fcherpte in is, inftaat om blaazen te trekken, te prikkelen, en, ten tyde dat men koud zou moeten worden, eene hitte te verwekken. Soortgelyk middel zal ik opgeeven; 't welk my een goed vriend heeft medegedeeld, en waar van hy verzekert, dat het zoo wel ouden als jongen van de ongeregelde tufchenpoozende, als ook van de derdendaagsche, koorts, en zulks wel binnen de vier en twintig uren, hersteld heeft. Men neemt rook-tabak, zoo veel als noodig is om eene pyp te stoppen; vermengt denzelven met eens zoo veel geraspt zuur brood, giet daarop een weinig wyn-

B 2

azyn,

azyn, en maakt daar uit eene foort van deeg, korten tyd voor dat men den aanval verwacht. Dit deeg verdeelt men in twee deelen, legt dezelve, zoodra de aanval begint, op elken arm midden op den pols, en bezorgt dezelve met zwagtels, ten einde zy niet afvallen. Hier door word eene jeukte en hitte verwekt. Het deeg neemt men egter niet wech, voor dat de dag ten einde is; ook moet men de blaazen niet openen, welke opkomen. Ik beproefde dit middel in den jaare 1753. des zomers by verscheide zieken, waar van eenige gezond wierden, doch by anderen was het kragteloos.

Een geloofwaardig man berigt, dat de volgende pleister van goede uitwerkingen geweest zy: Men neemt twee dragmen theriakel, een dragme terpentyn, bloem van zwavel, aluin en peper, van elk twintig grein', tien droppen overgehaalden olie van wyn-ruit, en tien 'grein' campher. Hier uit maakt men twee pleisters, die men van binnen op de vlakke hand legt. Van anderen heb ik de milt, die men zeer schielijk uit een gellagt dier genoomen had, zeer hooren pryzen, als men die, namentlyk, zoo warm als ze is, over de maag van het kind legt: Doch dit heb ik niet beproefd; ook geloof ik, dat de wolle lap, dien ik aangepreezen heb, en beter, en werkzaamere zy. Anderen maaken een klein zakje, waarin zy een weinig duivelsdrek en campher doen, en 't welk zy om den hals hangen: Doch ik heb nog niet gezien, dat dit geholpen hebbe, schoon my veelen bekend zyn, die daar mede de proef genoomen hebben. De campher,

om

om den hals gehangen, brengt sommigen aan het zweeten, en dit is de reden, waarom zy het aanprijzen. Met hetzelfde oogmerk laat men volwasfen menschen knoflook, tegen de tusschenpoozende koorts, neemen, 't geen dikwils geholpen heeft. PROSPER ALPINUS verhaalt, dat hy zich en andere door clysteeren, uit een pond *decoct. majoranae*, en zes loot *ol. laurin.* geholpen heeft. Andere hebben verhittende olien langs den ruggegraad gewreeven. Dus verzekerd FORESTUS, dat hy iemand, die op nieuws eene derdendaagfche koorts gekreegen had, aldus met een mengfel uit het *oleum DIPPELII* en *Chamomille* te regt geholpen heeft. DE HAEN *rat. med. tom. 12. pag. 262.* berigt, dat eene Vrouw, die vyf weeken lang eene derdendaagfche koorts had, van dezelve verloft is, nadat zy met het opkomen van de koorts zwavel gebruikt had, en daarop in eene fterke uitwaasfeming geraakt was. De volgende reis bleef de koorts wech, en kwam niet weder, offchoon kort daarna een buikzuiverend middel gebruikt wierd.

Is de koorts van eene flegte foort, dan moet men het niet waagen, om het op deeze middelen te laaten aankomen. De dubbelde anderendaagfche koorts, waar in de flegfte toevallen zich op de gelyke dagen openbaaaren, is meeftentyds kwaadaartig. De derde aanval in de anderendaagfche koorts geeft gemeenelyk te kennen, of dezelve van eene flegte foort zyn zal. Openbaaren zich als dan eenige der kwaade tekenen, waar van ik reeds gewag gemaakt heb, dan komen zy by den vierden aanval veel

heeviger weder. In zulke omftandigheden geef ik aanftonds den koorts-baft; ja, ik neem fchielyk toe- vlugt tot dit gezegend middel, wanneer ik bemerke, dat de aanval, die zich op den vyfden dag openbaart, langduuriger, zwaarer en heviger is, dan een der voorgaanden; gelyk ook, wanneer het kind zwaklyk is; en fterk zweet, zoo dra het flaapt. Dat dit middel onfchuldig zy, zoude ik, zoo wel als, myne ampt-gerooten, zulks vereifcht worden- de, door veele voorbeelden kunnen bevestigen. Men heeft alleenlyk acht te geeven, dat hetzelfde onvervalscht zy, en dat men het in eene voldoende quantiteit, en zoo lang gebruike, tot dat de ftoffe der koorts daar door geheel overwonnen is. Blyft van dezelve iet in het lighaam te rug; dan is het eene zaad-ftoffe, die zich vermeedert, en eene wederkeering der ziekte te weeg brengt. Het is hier mede even eens gefield, als met de fchurft: wort de bloem van zwavel niet lange genoeg, en in toereikende giften gebruikt; dan komt de fchurft weder. De fchuld legt daarom niet aan den koorts-baft, als men door de koorts op nieuw aangetaft word, maar hier aan, dat men denzelven te fpaarzaam, en niet lange genoeg gebruikt heeft. Alle die ongemakken, waarom men de Kina veracht, wierden in voorgaande tyden (wanneer de koorts-baft in Europa nog onbekend was) nog veel menigvuldiger waargenomen, dan tegenwoordig, en waren gevolgen van de tufchenpoozende koorts zelve. Hy kwam omtrent in den jaare 1649. 't eerft in Europa, doch wierd voor den jaare 1679. niet

riet met ernst gebruikt. Na 1690. leerde men denzelven 't eerst in Zweeden kennen. De grootste zwaarigheid is, denzelven aangenaam te maaken, zoo dat men dien aan een kind geeven konne (*): van de volgende wyze heb ik meesten tyds gebruik gemaakt:

Men kookt drie dragmen fyn gestooten kina, in anderhalf pond water, tot dat daar van maar drie oncen overig blyven. Dit doet men door, en op de kina giet men vier lood water van oranje-schillen, 't welk men insgelyks doorzeigt, en met het voorgaande vermengt. Hier by doet men een of twee lood *Syrupus Hordeatus*, zoo als dezelve in Parys gemaakt word, naar maate dat het kind meêr of minder het zoet bemint. Van dit middel geeft men aan het kind een thée-kopje vol, zoo dikwils, dat het op den goeden tyd twee zulke vlesjes uitdrinkt.

De

(*) DE HAEN (*Rat. medendi tom. 12. pag. 261.*) zegt, dat eene voornaame Vrouw haar kind daar door den koorts-bast smaakelyker maakte, wanneer zy zes loot met twee pond water, anderhalf uur lang, liet kooken, en dit afkookfel, koud geworden zynde, door dubbeld filtreer-papier loopen. Het grofste van het poeder zonk dan gedeeltelyk op den grond, terwyl het koud wierd, voor een gedeelte bleef het op het filtreer-papier. Het afkookfel wierd daardoor wel slapper, doch de smaak zoo veel zagter en beeter. Het poeder van den koorts-bast is ontegenzeggelyk het kragtigste, doch hun, die eene aandoenelyke maag hebben, bekomt het afkookfel beeter. Hoe men het poeder den kinderen in een ouwel kan ingeeven, is reeds gezegd.

De volgende reize blyft de koorts wech; men moet egter, des niet-teenſtaande, het kind dagelyks zoo een vlesje laaten uitdrinken, tot dat het zyne gezonde kleur en voorige gezondheid wedergekreegen hebbe, en tot dat het op de kwaade dagen zich zoo wel bevinde, als op de goede. Als dan houdt men, in de anderendaagſche koorts, zeven dagen lang, doch, in de alledaagſche en derdendaagſche, dertien dagen op. Na verloop van deeze dagen geeft men aan het kind wederom dagelyks een vlesje, zeven dagen lang. Dit noemt men de eerſte herhaaling. Daar na houdt men wederom zoo lange op, als de eerſte reize, en geeft alſdan aan hetzelfde dagelyks, de zeven volgende dagen op nieuw een vlesje. Dit is de tweede herhaaling. Op deeze wyze gaat men voort, tot dat de derde of vierde herhaaling geſchied is; en als het kind de derdendaagſche koorts gehad heeft, dan laat ik, om dies te zekerder te zyn, hetzelfde altyd, voor de vyfde maal, dit middel gebruiken. Krygt het kind eene walg van deezen drank; dan kan men aan hetzelfde de Kina op de volgende wyze geeven:

Men neemt fyn-geſneede ingemaakte citroen- en oranje-ſchillen, van elk drie lood: Deeze ſtoot men in een' marmer mortier, terwyl men 'er al-
 lengskens bygiet zes oncen kersſen-water, en drie oncen water van oranje-ſchillen: Dit doet men door, en vermengt het met drie dragmen poeder van Kina, twee dragmen ſlap kaneel-water, en drie lood ſtroop van oranje-ſchillen. Hier van geeft men aan het kind in eens een' lepel vol, en wel zoo dikwils,

wils, dat de vles voor den naaften aanval gebruikt zy. Men kan ook poeder van Kina in amandelmelk, als mede in flappe chocolaad geeven (d). Den Zoon van eenen voornaam Heer, die reeds aan den wyn gewoon was, en de Kina niet op genoemde wyze kon neemen, herstelde ik door den volgenden wyn:

Rx. Pulver. Chinchin. unc. vj.
Coque c. aquæ font. libr. vj. ad libr. ij.
Magmat. residuo affunde.
Vini alb. gall. opt. ℥. ij.
Digere per horam. Exprime & affunde
de novo
Vini opt. ℥. ij.
Digere per horam. cola, & exprime.
In colaturis mixtis solve super ignem
Sacchar alb. unc. xv.
& adde
Flaved. cort. aurant. rec. e malis. N. ij.
Ebulliant semel addendo.
Pulver. Cochinell. dr. ij.

D. S.

(d) In het Eerste Deel bladz. 276. n. b. heb ik reeds gezegd, dat harst van den koorts-bast ook gemakkelyk van kinderen ingenomen word, en dat men uit denzelven mede eenen stroop maaken kan. TORTI geeft van den laatstgenoemden het volgende voorschrift: *Rx: Chinæ Chinæ in tenuissimum pulverem redactæ unc. j. irroretur Spiritu vini quo usque humescat tota, mox infundatur in unc. xvj. vini albi generosi, digeratur in B. M. tepido per*

B 5

bi

D. S. Kina-wyn, waar van men twee spys-le-pels vol alle uur, of alle twee uren, ten tyde dat de lyder vry van koorts is, neemt.

Het kind lyd niets daar door, wanneer het meêr Kina inneemt, dan vereischt word, maar het lydt, als het minder gebruikt.

Indien het kind niets kan inneemen, dan helpt men het met clysteeren van het afkooksel van Kina, nadat men door een gewoon clysteer eerst ontlasting heeft te weeg gebragt. Daarna spuit men van het afkooksel eenige oncen in, opdat het door de opslorpende en melkvaten in het bloed kome. Zoo dra dit gedeelte ontlast is, spuit men wederom een ander in.

Wanneer de geneezing volbragt is; dan hebben de ouders gaarne, dat men iet geeft om den buik te zuiveren; doch dit is zelden noodig; want goede Kina verwekt gemeenelyk van zelve opening. Maar, is het kind verstopt; dan mag men hetzelfde laxeerren. De kina blyft even weinig in het lighaam te rug, als het brood.

Krygt het kind de koorts, terwyl het nog zuigende is; dan heeft men niet anders noodig, dan

biduum vel triduum, agitando vas pluries in die, dein facta per linteum valde rarum colatura cum forti expressione, ut portio saltem tenuior substantiæ Corticis trajiciatur, adde Sacchari albi clarificati unc. viij. & in vase fictili coquatur lento igne ad consistentiam Syrupi.

1. de maag en darmen met het Rhabarber-elixer te zuiveren , en 2. aan de Minne Kina te geeven , even als of zy zelve de koorts had. Zy kan dezelve in poeder , en op dat zy geene walging daar van kryge , in ouwels gebruiken.

In den jaare 1750. kreeg ik eene soort van koorts , die van de Geneesheeren *Semiteriana* genoemd word. Dezelve had eenen aanval op den eenen , en twee aanvallen op den anderen dag. Dewyl ik kort te vooren eene kwaade koorts , veroorzaakt door eene verstopping in den buik , gehad had , stond my de Kina zoo tegen , en ik was zoo zeer afgemarteld en kragteloos , dat ik niets kon inneemen. Ik liet daarom zes oncen poeder van kina in water kooken , tot dat het eene pap wierd , die ik in eenen doek , maatig - warm , den derden dag des morgens op de maag leide. Dezelve wierd warm gemaakt , zoo dikwils die begon koud te worden. De koorts bleef wech. Ik ging met de pap zeven dagen lang voort , en raakte tamelyk schielyk tot myne voorige kragten en gezondheid. Uit de voortreffelyke verhandelingen , door een gezelschap van Geneesheeren in Londen uitgegeeven , (*Medical Observations and Inquiries vol. II. p. 245.*) zie ik , dat de Heer SAM. PYE tot dezelfde gedagte komen is (*). Hy toont , door verscheide voorbeel-


(*) Het uitwendig gebruik van den koorts - bast in tusschenpoozende koortsen begint thans meer en meer in aanmerking te komen. Men heeft denzelfen by wyze van clystereen , in pappen , als een zeer syn poeder ,
ja

beelden, hoe gelukkig kinderen zoo wel van de tusschenpoozende, als van de aanhoudende, en by tyden zich verheffende, koortsen, door het uitwendig gebruik van den koorts-bast, zyn bevryd geworden. Door stoovingen van den Koorts-bast gemaakt heeft de Hr. ALEXANDER zich ook van de tusschenpoozende koorts bevryd. De zwaarigheid, die

ja als een bad, gebruikt. De tweede eerste soorten zyn reeds voor lange bekend geweest. HELVETIUS maakte gebruik van dezelve, TORTI (*Therap. spec. febr. pag. 460*) oordeelt dezelve niet kragteloos, en na hem hebben verscheide Geneesheeren deeze nuttig bevonden. Dat TORTI de pappen verwerpt, is minder te verwonderen, dewyl 'er alleen gesproken word van dezelve op den pols te leggen. HANNES heeft het voorbeeld van ROSÉN by eenige kinderen met vrugt gevolgt, met dat onderscheid, dat hy den koorts-bast in wyn liet kooken. PYE liet een eamifool van synlinnen maaken, en daar tusschen den koorts-bast syn gestooten doen, hebbende dus voor een kind van vier of vyf jaaren vier tot zes oncen poeder noodig. Hy bewyft de kragten daar van met twaalf voorbeelden. Hier uit zou men nog meer kunnen bewyzen, dat de koorts-bast voornamentlyk door fyne en zeer doordringende deelen werkt, doch het komt in de Geneeskunde 'er meer op aan, wat een middel doen kan, dan hoe het werkt. ALEXANDER *Experim. Essais on the extern: Applicat. of Antiseptics. pag. 38.*) heeft door zulke voetbaden de koorts zoeken te verdryven. Hy kookte een pond in water, en liet de beenen, eerst wel gewreeven zynde, in een nauw vat, waar in dit afkookfel was, na het eindigen van den aanval, houden. M.

die men ontmoet, als men kleinen kinderen de Kinna ingeeven wil, maakt deeze uitvinding van groot gewigt (*).

(*) Het *Oleum animale* DIPPELII heb ik nooit by kinderen gebruikt, doch dikwils by volwasfenen; ook in derdendaagsche koortfen. Het lighaam na behooren bereid zynde, heb ik daarvan dertig droppelen, in een weinig bier-en-brood, een half uur voor den aanvalgegeeven, en alles zoo ingerigt, dat het in de Kamer, wanneer de aanval verwacht wierd, zeer stil geweest is. De zieke is dan in slaap, en aan het zweeten geraakt; doch is hy op dien tyd wakker gemaakt, dan is het middel voor deezen tyd vrugteloos geweest. Het ammoniak-zout is langen tyd tegen de tusschenpoozende koorts in gebruik geweest: doch het is niet wel mogelijk kinderen hetzelfde in te krygen; en zelden ben ik in staat geweest, volwasfenen eene genoegzaame quantiteit te doen gebruiken. Een aanzienelyk man nam in gersten-water twee dragmen op een dag daar van, en raakte dus de anderendaagsche koorts kwyd, doch storte na eenige weeken wederom in, en vond toen meer smaak in den koorts-bast. By gemeene menschen, die om den smaak niet veel geeven, gaat dit aan. Doch men moet de gifte van dit zout herhaalen, even als den koorts-bast, want ik bemerk, dat zy, die zulks niet gedaan hebben, door de koorts wederom aangetaft zyn.



XXIII. H O O F D S T U K.

Van de Wormen.

DE wormen zelve zyn wel geene ziekte ; maar zy veroorzaaken veele ziekten. Word men door dezelfen geplaagd ; dan moet men zich moeite geeven , om daar van schielyk bevryd te worden. Hoe langer men hen voedzel geeft , dies te sterker vermeerderen zy zich , en neemen in grootte toe. Zoo lange men dezelfen in het lighaam heeft , is men geen uur van zyne gezondheid verzekerd. Als men , op eene vreemde plaats , by geval , eene ongewoone spyze nuttigt , of het een of ander zoet eet , of als de wormen door de eene of andere oorzaak in beweeging komen , kruipen , zuigen , of door de darmen heen zoeken te dringen ; dan is men aanstonds ziek. Kinderen en jonge lieden zyn daar van ten eersten aangedaan , bejaarde , in tegendeel , wier darmen niet zoo gevoelig zyn , en sterke menschen , wier darmen inwendig met eene vaste slym overtrokken zyn , voelen derzelver beweeging zoo ligt niet. Des niet tegenstaande sleepen zy in allen deeze ongemakken met zich , dat zy het voedzel met hen deelen , en dat dit vermengd word met 't geene de wormen uitwerpen , en met de vogten , die van hen uitwaasfemen. Dit brengt te weeg , dat men , of te weinig , of te slegt voedzel krygt , of eenen aanhoudenden

den honger heeft. (*) Hoe meer en grooter wormen men heeft, dies te meer moet men van hen lyden. Menschen, die wormen hebben, worden in heete ziekten, voornamentlyk in de pokjes, altyd heeviger aangetast, dan anderen, daarom waagt men het niet ligt, aan een kind, 't welk men weet wormen te hebben, dezelve in te enten.

De wormen komen voort uit hun zaad, gelyk alle andere levendige schepzelen. Uit het ey van eene vlieg word eene vlieg; uit het ey van eene hen, een kuiken, en geen slang; uit het ey van eene gans, eene gans, en geen visch gebooren. Even eens word door eenen worm niets anders voortgebracht, dan een worm. Dergelyke zaaden kunnen in ons lighaam gebragt worden met het eten en drinken, voornamentlyk met het water; dat men drinkt, en waarmede men het vaat-werk in de keukens reinigt. De gemeene man drinkt veel water, voornamentlyk des zomers, en dikwils zeer onzuiver: Hy eet gerookt spek en vleesch: In dit alles kunnen de wormen, by duizenden, hunne eijeren gelegd hebben, die doorgeslikt, en in de maag en darmen uitgebroeid worden; ja, met onzuiver water

(*) De Hr. NITERT schryft in een' brief aan DE HAEN *Rat. med. Tom. 12. pag. 219.*, dat eene vrouw, welke verscheide lint-wormen by zich had, door zoodanig een' honger geplaagt wierd, dat zy dag en nacht eten moest. Ook was dit niet te verwonderen, daar men haar van agttien lint-wormen verlost heeft.

ter kan men fomtyds kleine wormen doorslikken. Dit is veelligt ook de oorzaak, waarom de gemeene man zoo dikwils met wormen geplaagd word (*b*). Daarom ziet men, dat van de arme zieken, die, door

(*b*) Tot hiertoe kan men nog niets, met zekerheid, aangaande den oorsprong der wormen in het menschelyk lighaam zeggen; en hetgeene latere Schryvers, van derzelve oorsprong uit het water, en van lint-wormen, in het water gevonden, geleerd hebben, voldoet even weinig, zegt de Heer PALLAS, als het gevoelen der ouden, dat, namentlyk, derzelve zaad-stoffe door de lugt zweeven, of met het voedsel vermengd zyn zoude; en, schoon men toestaat, dat LINNÆUS en GADD in Zweeden, UNZER in Duitschland, VAN DOEVEREN, en de vrienden van TISSOT, waare lint-wormen in het water gevonden hebben; zoo zal men nogtans voorzigtiger doen, te zeggen, dat dezelve door het een of ander dier ontlast zyn, dan te beweerden, dat zy natuurlyke inwooners van dit element zyn; want, kwamen zy uit het water in onze lighaamen, dan zouden zy in eene groote menigte in hetzelfde moeten zyn, en daarin hunne eijeren leggen: Doch, zy zyn daar in zeer zeldzaam, en alleen van eenige weinige Natuurkundigen gezien. Men zou veel eer kunnen stellen, dat die wormen, welke in vischen, vogelen, dieren van beiderlei leven, en in viervoetigen, zeer gemeen zyn, in het water woenen, en, nogtans zyn dezelve nooit van iemand buiten het dierlyk lighaam gevonden. Kreegen de viervoetige dieren de lint-wormen uit het water; dan zouden de vischen die ook moeten hebben; en egter vindt men hen nooit in dezelve, maar zeer dikwils eene gantsch onderscheide soort.

door de Christelyke zorg van wylen den Bischof, Doctor KALSENIUS, by de Sättra - bron onderhouden en opgepast worden, altyd byna drie van de vier geplaagd zyn met zulke ziekten, die haaren oorsprong aan de wormen verschuldigd zyn. Daar zyn vischen, als aalen, braasfems, roode zee-braasfems, en andere meêr, waar in men dikwils wormen, en voornamentlyk, den lint-worm gevonden heeft. Het is waarschynlyk dat wy met dezelve meestentyds den genoemden worm in het lighaam krygen: Daarom neemt men ook waar, dat dezelve vry gemeen is ter plaatse, daar veele vischen zyn. In Stockholm is dezelve gemeener, dan in Upsala. In Finland en Rusland is hy zeer gemeen. In Holland word de tweede (c) en in Switserland de tiende, door den lint-worm geplaagd. Het is wel niet te ontkennen, dat die, welke men gemeenelyk, by voorbeeld, by de Braasfems vindt, plat en wit, maar van geene leden voorzien is (*).
Som-

(c) Schoon men den lint - worm hier te Lande ook waarneeme; zoo is dezelve nogtans geenzins eene zoo algemeene ziekte, als de Schryver beweert.

(*) De lint-worm, waar van de Schryver hier spreekt, is de *Fasciola Intestinalis* L. (*Syst. Nat. Ed: 12. T. 1. P. 2. p. 1078.*) Wylen de Hooggel. Hr. SPÖRING heeft denzelven inde Zweedsche verhandelingen voor den jaare 1747. Tab. 5. litb. (*geneesk: verb: I: D: p: 164*) uit RUISCH laten tekenen, en in 't kort beschreeven. Eene nog meêr nauwkeurige beschryving heeft de Heer MONTIN in 't zelfde werk voor den jaare 1763 p. 114. bekend gemaakt, alwaar hy eene zeer merkwaardige historie bybrengt van

Somtyds egter vind men deezen met leden, hoedanig een ik ook bewaar, die men in een braasfem gevonden heeft. Doch dewyl men, volgens het getuigenis van den lyf-artz en Ridder VAN LINNE', van den Heere Bisschop MENNANDER, en van den Heere Doctor UNZER, in het water aantreft dezelfde soort, die in menschen gevonden word; zoo is 'er geen twyfel, dat zy niet insgelyks in vischen zou kunnen zyn (*). Dat men denzelven wezentlyk daar in vinde, zien wy uit de ontleedkundige waarneemingen van den Heere RUISCH (*Observ. Anat.* 64. pag. 60.) Wel is waar, dat men den visch kookt, eer hy gegeten word, en dat zoo wel de worm; als deszelfs zaad, door de hit-

een vrouws-perfoon, dat, met kauwoerswormen, stukken van lint-wormen, ronde wormen, en de lange aars-maaden (*Ascaris Lumbricoides*), deezen lint ook verscheide-maalen ontlast heeft. By eene andere gelegenheid heeft een vrouws-perfoon, wanneer zy eenen braasfem at, eenen levendigen lint (*fasciola*) op de tong gehad. M.

(*) De nieuwste berigten der Zweedsche Geneesheeren in de Provintien, verzekeren ook, daaromtrent door het *Collegium Medicum* gevraagd zynde, dat de lint-worm op vischryke, en dicht aan zee gelegen, plaatsen zeer menigvuldig is. in *Biörneborg* word de vierde man daar mede geplaagt. De Hr. FAXE vooral heeft denzelven in onderscheide vischen gevonden. Volgens zyne waarneemingen openbaart zich by menschen deeze worm, voornamentlyk in September en October, welk ook de tyd is, dat de visch-vangst eindigd. M.

hitte van het water zou kunnen gedood worden: Doch dat dit niet altyd geschiede, heb ik tegelyk met zeven andere menschen op den zelsden tyd gezien. 'Er wierd eene schotel met braassens op tafel gezet, waar onder eene was, waarin zich een lintworm (*) bevondt, die zich nog beweege, en leefde. De schult zal hier aan liggen, dat de visch hier te lande zelden goed gekookt, maar meest - al half gaar gegeten word. Hoe groote hitte de wormen verdraagen; eer zy daar van sterven, heeft de Heer Lands - Doctor D. MONTIN in de verhandelingen der Koninglyke Academie der wetenschappen, voor den jaare 1763. pag. 115. getoond (†). men zie *Geneesk. verhand. III. D. p. 135.* Wei-

(*) Offchoon de Hr. ROSÉN een naam gebruikt, welke aan den lint-worm eigen is, ziet men egter uit het *Syst. Naturæ* van LINNÆUS Ed. 12. T. 1. P. 2 pag. 1078., dat dit met eene *Fasciola* gebeurt is. M.

(†) De Heer MONTIN heeft zyne proeven genomen op den lint (*Fasciola*), waar van in de voorgaande noodte gesproken is, en die hy uit vischen genomen had. Wanneer hy denzelven op gloeiende koolen van beuken-hout gelegd had, hebben zy die twee- of drie-maal door hunnen slym gantschlyk uitgedoofd, eer zy het leven 'er by inschooten. In den gloed van een sterk koolen-vuur hebben zy het dikwils langer dan twee minuten uitgehouden. Even hardnekkig zyn, volgens de proeven van COULET, de kauwoers-wormen, of, gelyk hy dezelve met *AMATUS LUSITANUS* te onregte noemt, de aars-maden; want in kookend vleesch-nat blyven zy, geduurende twaalf uren, zoo levendig als

Weinige menschen kunnen zich in acht neemen , om het zaad van wormen niet in te slikken , te minder , daar men 'er dikwils in een glas water dui- zenden drinkt. Maar van waar is het dan , dat niet elk en een yder met wormen geplaagd is? Het zaad der wormen kan in de maag en darmen uitgebroeid worden: 1. wanneer in dezelve eene maatige warmte is; 2. wanneer zy stil kunnen lig- gen: Dit nu geschiedt , als zy vast zitten in de na- tuurlyke slym , waar mede de maag en darmen be- dekt is , of als zy tussehen de klap-vliezen der darmen komen te liggen , of wanneer zy niet ge- stoord worden door de geduurige klopping der slag- aderen op de maag en darmen; 3. wanneer zy niet aanstonds door de aanhoudende worms - wyze be- weeging van de maag en darmen uitgedreeven worden; 4. als zy niet smelten en vergaan door de dampen , welke geduurig uit de uitwaasfemende va- ten van de maag en darmen uitwaasfemen. Dus zien wy , dat het gezaaide kooln vergaat , zonder te kunnen uitspruiten , wanneer een aanhoudende re-

te voeren. (Men zie deszelfs *Traclatus hist: de Asca- rid: & Lumbrico lato L: B: 1729.*) FAXE, die insge- lyks aan het weinig kookken van den visch toefchryft , dat de lint-worm in Zweeden zoo gemeen onder de menschen is , heeft in zyne proeven bevonden , dat , als men de visch langzaam kookt , en 'er veel zoutby doet deeze wormen d an in korten tyd gedood worden , en dat dezelve zoo veel te eer sterven , hoe meêr zout in het water gedaan word. M.

regen valt. Bevrugte kuit van visch kan niet in een vlietend, maar wel in een stillstaand, water verplant worden. Van deezen aart zyn gemeenelyk de omstandigheden by een zwakkelyk mensch. Daar en tegen beweëgen zich de darmen veel méér in sterker menschen: De slag-aderen slaan met grooter hevigheid; de uitwaasfeming geschiedt met méér kragt, en de hitte is grooter, zoo dat die dikwils den kwik in den thermométer van Fahrenheit tot vier en negentig graaden doet klimmen; doch by zwakke menschen klimt hy niet zoo hoog. Wanneer nu zwakke en sterke menschen eenerleijs spyze en drank gebruiken, en by gevolge even veel zaad van wormen doorflikken; zoo volgt, dat de wormen, in de eersten, gemakkelyk kunnen voortkomen, doch by de laatsten moeten wech gaan, ten zy zy door onzuiver water, dat zy drinken, of op eenige andere wyze, in zoo eene meenigte in het lighaam komen, dat sommigen derzelven moeten blyven zitten in de bovengenoemde slym, of tusschen de klap-vliezen der darmen; 't geen waarschy-nelyk by den gemeenen man gebeurt. Uit het gezegde volgt ook, dat kinderen méér aan de wormen onderworpen zyn, dan volwassnen, veruws-per-soonen méér, dan mans-persoonen, en menschen, die veel zitten, méér, dan zulke, die in eene gestaadige beweging zyn, 't geen ook met de onder-vinding over een komt.

Schoon geen een deel in het menschlyk lighaam zy, waar in men geene insecten of wormen zou

gevonden hebben (*d*); zoo zyn nogtans de maag en darmen de plaats, alwaar zy zich voornamentlyk ophouden.

De menschen worden inzonderheid van vyf soorten geplaagd (*e*).

De

(*d*) Zulke voorbeelden vindt men door VAN DOEVEREN in *Diff. de Vermibus Intestinalibus* en door PALLAS *de infestis viventibus intra viventia*, *Thef. Dissert.* vol. 1. pag. 250. uit veele Schryvers byeen gebragt.

(*e*) Dat ook andere soorten van wormen, of insecten, in de darmen gevonden zyn, blykt uit FEUILLÉE *Journ. des Obs. Phys.*, Tom. 1. p. 421. GALLO *Dissertaz. dell uso del latte* tom. 2. p. 133. *Acad. des Scienc.* 1740. *Hist.* pag. 72. *Medical Essais* tom. 2. art. 26. PALLAS *Diff. de infestis viventibus intra viventia*. Deeze laatste heeft veele zulke voorbeelden verzameld. S.

Voorheen heeft de Hr. ROSÉN, volgens de rekening van LINNÆUS maar vier soorten van wormen aangenomen, welker getal met twee andere kan vermeerderd worden, namentlyk de *Fasciola inestinalis*, en *Gardiis aquaticus*. Hier by komen nog de *Trichurides* van ROEDERER. Deeze komen in groote en gedaante over een met de aars-maaden, doch hebben van agteren eenen draad, welke eens zoo lang, als het lighaam is, en van vooren een' beweeglyken snuit. Men zie WAGLER *de morbo mucoso* pag. 41. *Tab. 3 fig. 4. a. b.* LINNÆUS heeft dezelyen *Ascaris trichiura* genoemd *Mani. plant.* 2. pag. 543. Het ware te wenschen, dat de groote Natuurkundige, de Heer ZÜGA in Coppenhagen, zyne beschryving van deeze en veele andere wormen, die hy in vischen gevonden heeft, door den druk gemeen maakte. In een' brief aan my noemt hy deezen worm

Echi-

De eerste soort heeft met de kaas-maade eene overeenkomst, en word genoemd de aars-maade; (*Ascaris* LINN. *syst. nat. Edit.* 12. T. 1. p. 1076). Dezelve is meestentijds wit, zeer klein, en aan de einden puntig, doch iets smaller aan het eene einde (*), houdt zich op in den endel-darm, is onge-

Echinorhynchus Trichuris. De Hr. LEIGH *medic Transact.* vol. 1. pag. 54. spreekt van eene soort van wormen, die hy *boits* noemt, welke een man, benevens eene groote meeningte aars-maaden uitgebraakt heeft, na het gebruik van eene ongemeen groote quantiteit keukenzout, in water ontbonden. De wormen, zegt men, worden rykelyk in de maagen der paarden gevonden, doch hier waren zy veel kleiner, en omtrent zoogroot, als een tarw-korreltje. M.

(*) Deeze waarneeming is van den Hr. VAN PHEL-SUM, die deeze verdienste heeft, dat Hy, in zyne *Hist. Physiol. Ascaridum*, de nauwkeurigste beschryving, en beste afbeelding, gegeven heeft van een' worm, die reeds veele eeuwen is bekend geweest. Van Hem leeren wy, dat het lighaam van den worm veele ringwyze vouwen heeft, die zoo fyn zyn, dat men dezelve niet, dan door een zeer goed microscoop, zien kan; dat eene van dezelve, omtrent $\frac{1}{4}$ van een lein van het breedste gedeelte aanmerkelyker is, en zoodanig eene verdieping maake, dat daar door het lighaam van den langwerpigen kop onderscheiden worde, waaraan ook eene opening gezien word, die op een' mond doet denken; dat aan het agterste gedeelte de ringen meeren-deels verder van elkander afzyn, en dieper worden.

LINNÆUS *Faun. Suec. ed.* 2. p. 504. verzekerd, dat deeze worm zich aan wortelen van verrotte planten, en

gemeen gauw in zyne beweegingen, kruipt dikwils in en uit, en veroorzaakt niet zelden, vooral by kleine meisjes, eenen ongelooflyken brand in en omtrent den pis weg, ja, zelfs den witten vloed (*f*). Men vindt denzelven nooit alleen, maar daar hy zich ophoud, zyn 'er zeer veele by elkander (*).

De tweede foort zyn, de ronde wormen (*Lumbricus teres* LINN. *Syst. nat. Edit. 12. T. 1. p. 1076.*): deeze zien uit als de aard-wormen, schoon zy witter zyn, en geen zoo duidelyken ring hebben, welken egter VAN PHELSUM en VAN DEN BOSCH waargenomen hebben. Beide deeze zyn omtrent van honderd of meer ringen voorzien: de
Hr.

ook in de darmen der paarden ophoud. PALLAS heeft denzelven in de darmen der Kikvorschen, en in de long van eene Water-Hagedis ontdekt. In verscheide vischen heeft de Hr. FAXE dezelve waargenomen, en daaruit kan men zoo veel te gemakkelijker begrypen, hoe dezelve in het ligchaam komen. M.

(*f*) Dat deeze aars-maden eijer-leggende en geenzins leevend-baarende dieren zyn, heeft de Heer MEESE klaar aangetoond; *Uitgezogte Verhandelingen 9. D. pag. 338.* Sommigen zyn van gedagten geweest, dat kinderen voor de jaaren van huwbaarheid door deeze foort niet geplaagd wierden; doch de ondervinding van anderen heeft het tegendeel geleerd.

(*) Gelyk de hier voor aangehaalde waarneeming van LEIGH bewyft, dat de aars-maden somtyds tot in de maag komen, zoo leer ik uit het geval van een' Geleerden alhier, dat somtyds slegts een zeer gering getal kan tegenwoordig zyn, alzo deeze verscheide maalen enkelden zonder ongemakken looft.

Hr, Landdrost VAN MÜNCHHAUSEN heeft aan een aard-worm honderd en veertig ringen getelt. Aan elk, de groote ring uitgezondert, vind men by de aard-wormen vier dubbelde reyen van syne steekels (*setæ*), en by gevolge agt honderd, wanneer 'er honderd ringen zyn, welke zy uitsteken en te rug trekken kunnen. Deeze staan in de midden regt op, doch zyn, aan beide einden, na dezelveu gekeert (*).

Door

(*) Deeze waarneemingen behooren aan den Hoogel: Heer MURRAY. R. Die dezelveu beschreeven heeft in zyne *Observationes de vermibus in lepra obviis, & de lumbricorum setis*. pag. 65. waarvan ik den inhoud heb medegedeeld in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek. VII. D. pag. 822. S.

Door de beweeglykheid derzelver, zoude men die Natuur-kundigen, welke deeze steekels aan de aard-wormen toefchryven, doch ontkennen, dat dezelveu aan de lange, ronde, wormen in de menschen zyn, en dus onderscheide soorten daar van maaken, met LINNÆUS kunnen vereenigen, dewyl 'men mogelyk de laatstgenoemde wormen onderzocht heeft op een' tyd, wanneer die steekels verborgen waren. SCOPOLI *Ann. hist. nat.* 5. pag. 126. stemt daar in met my overeen. Uit het groot getal der steekels, welk, als men met LINNÆUS honderd ringen aanneemt, 800., doch als men met RAY hondert en veertig ringen telt, 1120 (eenige weinige daar af gerekend zynde, welke aan den grooten ring ontbreken) bedraagt, zal men veele toevallen, ende moeijelykheid, om dezelveu uit te dryven verklaaren kunnen, vooral als men dit getal met negentig of hondert zeven- en zeventig vermenigvuldigd, want ROSÉN heeft van één' mensch negentig, en MOUFET hondert en zeven en zeventig wormen zien ontlasten. M.

Door middel van deezen kan hy zich gemakke-lyk van de eene plaats na de andere begeeven, zich vasthouden, de darmen prikkelen, pyn en veele toevallen, ook door den mond, welke aan dat einde is, alwaar men drie kleine verhevenheden ontdekt, veroorzaaken. De gemeene aard-worm kan zich samentrekken, verkorten, en dikker maaken. Zulk eene gedaante heb ik die niet zien aanneemen, welke levendig door menschen geloosd zyn. De gemeene worm is week, hy zy levendig of dood: In tegendeel is die der menschen gemeenelyk hard en opgezet. Des niet tegenstaande ontdekt men deszelfs ringen; welke even als uitgerekt zyn. Van deeze soort vindt men zelden in de menschen eenen alleen (*), maar gemeenelyk meêr. Zy zyn dan doorgaans klein, doch word 'er een groote ontlast, dan hoopt men, dat hy maar een klein, of in het geheel geen, gezelschap heeft. By een arm meisje van agt jaaren, dat door de wormen geplaagt was, en een geheel quartier, ja somtyds een half uur, na verscheide stuiptrekkingen uitgestaan te hebben, zonder gevoel lag, dreef ik, binnen negen dagen, meêr

(*) De rede, dat zy anders zoo talryk zyn, moet gezocht worden in het groot getal eijeren, welk zy by zich hebben. Deeze zyn beslooten in vaten, die zeer konstig door elkander geslingert zyn, door de uitwendige bekleetselen doorschynen, en veel langer zyn, dan de worm zelve; welke men ook somtyds in wormen, die ontlast waren, uit het lighaam heeft zien hangen: Men vergelyke VAN DEN BOSCH *Hist. conspit. epid. verminosa. pag. 12. M.*

meer dan negentig stuks af, door eene soort van pillen, die ik op zyn plaats beschryven zal. Van die soort, welke men by de menschen vindt, heeft men mannetjes en wyfjes; doch de aard-wormen hebben beide geslagten met elkander vereenigt. Hoe zeer zy uitwendig schynen overeen te komen, is het inwendige maaksel zeer verschillende, gelyk uit de ontleding blykt, welke WILLIS aan de aard-wormen, REDI, VALISNERI, TYSON en KLEIN aan die der menschen verrigt hebben. Dat zy by ons zeer graag de vliezen der darmen doorbooren, en aldaar zich ophouden, hebben yeele onderyonden. Het zy genoeg het voorbeeld van STÖRCK *ann. med. sec. pag. 228.* aantehaalen. Deeze soort word by ons niet alleen in de maag en darmen gevonden, maar ook somtyds in de nieren, gelyk onder anderen, RUISCH *Observat. anat. Chir. n. 64.* en PALLAS *diff. cit.* verhaalen. DUVERNEY *Hist. de l'Acad. R. an. 1700.* zegt zulk een' worm in het hoofd, en wel in den *sinus longitudinalis* waargenomen te hebben by een meisje van vyf jaaren, welk, in het leeven, over eene zwaare pyn boven aan den neus klaagde. Men ontdekt deezen ook by kalveren, varkens, vischen, en andere dieren. By honden vindt men dezelve dikwils in de nieren, en in dezelve verwekken zy yeele toevallen: zie PALLAS *diff. cit.* REDI, BAGLIVUS, ANDRY, LE CLERC, LANZONUS, TORTI, en meer andere beroemde mannen, hebben dezelve, levendig ontlast zynde, in allerhande soort van vogten gelegd, om te beproeven, door welk middel zy het gemakkelykst konden ge-

dood

dood worden. Doch deeze proeven zyn zoo verschillend uitgevallen, dat men daar uit weinig nut trekken kan. In koud water sterven zy aanstonds, en dit heeft de Hr. VAN DEN BOSCH ook waargenomen.

Deeze hebben eenen afkeer van kwik; ook wil men, dat zy den wyn en brandewyn niet kunnen verdraagen; ik heb egter eenen gezien, die 's morgens levendig door een kind geloofd wierd, en s'avonds nog leefde, schoon hy reeds zoo veele uren in eene vles met brandewyn gelegen had. Zy hebben een zoo taay leeven, dat zy zelfs door het zaad van de *Staphisagria* niet gestorven zyn. **PALLAS** doodde daar mede een' hond, en, wanneer hy denzelven naderhand opende, vond hy levendige ronde en kleine lint-wormen by hem.

De derde soort word genoemd, de lint-worm (*Tenia* LINN. *Syst. nat. Edit. 12. T. 1. p. 1323.*), om dat zy veel overeenkomst met een lint heeft. Dezelve is plat, lang, meestendeels wit, en heeft geledingen. Men meent, dat dezelve altyd met nieuwe leden aangroeie, even als de *Sertularia*. Van deeze soort vindt men somtyds eenen, somtyds meêr, in een' en denzelfden mensche (g).

Des-

(g) Voor deezen was men van gedagten, dat men nooit meêr dan eenen lint-worm in het lighaam kon hebben, en daarom wierd dezelve de eenzaame worm (*Vermis Solitarius*) genoemd; doch de ondervinding heeft naderhand geleerd, dat men niet alleen meer dan eenen lint-worm hebben konne, gelyk, volgens VAN
DOE-

Deszelfs eene einde is breed , met lange geledingen ; doch aan het ander einde neemt hy allengskens in breedte af , en de geledingen worden langs zoo korter , zoo dat men dezelve op het laafst niet meer met het vergroot-glas zien kan ; en eindelyk eindigen zy zich in een klein knopje. De meesten noemen dit den kop. Het smalle einde kan hy lang en kort maaken. De geledingen aan het breede einde laaten zich gemakkelyk uit elkander trekken ; en deeze stukken noemt men kauwoers-wormen (*Verme cucurbitini*) , welke , alzoó elk op zich zelve leeven kan , eenen byzonderen naam ontvangen hebben , en te onregte voor byzondere wormen aangezien zyn geworden (*). Wanneer alleen eenige ellen van deezen lint-worm geloofd worden ; dan schynt het , als of alle geledingen even lang en even breed zyn ; Doch als zefstien tot twintig ellen te gelyk daarvan te voorschyn komen ; dan bemerkt men gemakkelyk , dat hy in de midden het breedste is , maar dat aldaar de leden korter zyn , dan aan het zoogenaamde breede einde. Elke geleding heeft eene verheevenheid , of even als eene ronde ope-

DOEVEREN, Dr. Dozy 'er drie te gelyk heeft uitgedreeven , maar dat zelfs deeze soort dikwils door andere soorten vergezeld worde.

(*) Deeze leeden scheiden zich fomtyds , in het leeven , van zelve van elkander af , en , volgens de waarneemingen van KÖNIG , voornamentlyk , in de lente en herfst. Dan kan het gebeuren , dat 'er veele zulke deelen ontlafst worden , daar egter het voornaamste in het lighaam blyft. M.

opening. De eerste soort heeft 'er eene op den rand, en de tweede heeft 'er twee op zyde (*h*).

Deeze

(*h*) De Heer PALLAS noemt, in syne aangehaalde verhandeling, zes soorten van lint-wormen op; waarvan 'er vier in de menschen gevonden worden. Deeze worden van LINNÆUS onderscheiden volgens het getal en de plaatsing der mondjes. In het algemeen verdeelt men deeze wormen in twee soorten, waar van de eene lange, en de andere korte, geledingen heeft. 8.

De eerste word door LINNÆUS genoemd *Tania Solium*. Syst. Nat. Ed. 12. Tom. 1. p. 1323. sp. 1., de tweede *Tania vulgaris* spec. 2. Behalven deeze vind men, hoewel zelden by menschen, doch des te meer by honden, eene derde soort *Tania lata* spec. 3. Men kan thans beter begrip maaken van den kop van den lint-worm. Aan het smalle einde van de laatstgenoemde soort heeft de Hr. BONNET (*Memoir. de mathem. & de phys.* Tom. 1. tab. 1. 2. p. 478.) vier kleine knopjes ontdekt, die in het midden open zyn, en met elkander gemeenschap hebben. ROSÉN beschryft deeze volgens eige ondervinding, en ROEDERER heeft dezelve ook aan een' lint-worm met lange geledingen gezien, *Progr. de tania* pag. 7., en deeze is waarschynelyk dezelfde, welke thans onder de Ontleedkundige verzameling alhier (in Göttingen) bewaart word, en waaraan ik dezelve zoo duidelyk bespeurt heb. MALPIGHIIUS heeft dezelve 't eerst gezien. Deeze verhevenheden maaken den kop van den worm uit, zoo men dien aan denzelven wil toeschryven. Egter schynen niet alle soorten van lint-wormen, aan het smalle einde, vier zulke verhevenheden te hebben. By de *tania vulgaris* heeft FEHR *Anal. de Absynthio* p. 125. 'er maar drie gezien, en de Hr. VAN DORVEREN in 't geheel geen konnen waarneemen. Volgens

Deeze openingen of mondjes kan de worm, wanneer hy nog leeft, uitsteeken, en weder intrekken. Door middel van deeze zal hy te weeg brengen, het zuigen in de maag en darmen, 't welk onder vinden zy, die met hem geplaagd worden; zonder te spreken van de nuttigheden, die zy voor het overige zouden kunnen hebben. Men heeft duidelyk gezien, hoe dik een afgescheiden lid word, wanneer men hetzelfde in lauwe melk legt (i).

Het is bykans ongelooflyk, tot welk eene lengte hy in menschen kan aangroeijen. Ik heb daarvan tagtig ellen op eenmaal zien loozen. Anderen hebben tot drie-honderd ellen toe waargenomen. De Hr. VAN DOEVEREN berigt, dat een boer, na een braak-middel ingenoomen te hebben, eenen worm, ter

gens PALLAS behooren deeze vier verheevenheden ook onder de kentekenen van den lint-worm. Dus brengt hy ook tot het geslagt van den lint-worm de *Hydra Hydatula* LINN. *Syst. nat. Ed. 12. Tom. 1. p. 2. pag. 1320.*, die door hem *Tania hydatigena* genoemd word, en zoo voortreffelyk beschreeven en afgebeeld is in *Miscell. Zoologic. n. 13. en Stralsund. Magaz. st. 1. pag. 64. M.*

(i) KOENIG had eenen levendigen kauwoers-worm op zyne hand gelegd by eenige druppelen melk, en zag toen, dat dezelve na de melk op zyde voortkroop, en dat het tepeltje, of de opening, welke op zyde is, begon te zwellen. Wanneer hy nu door een vergroot-glas dit tepeltje beschouwde, zag hy, dat uit hetzelfde kwam even als een snuitje, en dat de worm daar mede de melk inzoog: *AG. Helv. vol. 1. pag. 28.*

ter lengte van veertig hollandsche ellen, uitgebraakt heeft, en dat hy nog meer zoude uitgeworpen hebben, zoo hy niet bevreesd ware geweest, dat hem alle de darmen uit den mond zouden gekomen zyn, en hy denzelven daarom afgebeeten had. Hieruit blykt mede, dat hy zich niet alleen in de groote darmen, maar ook in de kleine, ja zelfs in de maag, ophoude. In honden ziet men dit dikwils; en RAULIN heeft in den derden kleinen darm van een lyk eenen lint-worm van zestien voeten gevonden (*).

Wanneer de lint-worm eerst geloosd word; dan ziet hy zoo wel langer als breeder uit, dan korten tyd daarna. Komt hy levendig te voorschyn; dan kan men zeer duidelyk zien, dat hy voortkruipt, alzoo hy, dan breeder, dan smaller word, en op de randen zich met bogten beweegt, zynde dit de worms-wyze beweging, welke in hun lyf voelen zy, die den lint-worm hebben. Somtyds schynt hy dood te zyn, wanneer hy te voorschyn komt, schoon hy egter levendig zy. Dit heb ik dikwils ondervonden, zelfs als hy reeds vier en twintig uren lang op een bord voor het venster geleegen had: Ik heb hem in een kommetje gelegd, en met een weinig warm water besproeid, wanneer hy aanstonds begon te kruipen, en zich te bewegen:

Doch

(*) STRANDBERG *Tal om felen vid Chron: Siukdomars botande* p. 12. spreekt van eene maagd, die van het midden van Juny 1759. tot in het midden van September 1764., 793 $\frac{3}{4}$ ellen van den lint-worm by stukkenis kweijt geraakt. M.

Doch zodra ik hem daarna met koud water begoot, lag hy aanstonds als een doode; en op deeze wyze heb ik hem, zoo dikwils als ik wilde, konnen dooden en wederom levendig maaken. Na dat ik lang genoeg het koud en warm water verwisfeld had, nam ik eindelyk waar, dat zich eene zeer dunne huid, waar mede hy overal bedekt geweest was, afgescheiden had. Dat dezelve gevoel hebbe, heb ik meêr dan eens gezien; want zoo dikwils als ik hem, wanneer hy nog leefde, met de punt van eene schaar aanraakte, heeft hy aanstonds beginnen te kruipen. Men zou denken, dat gemakkelyk zyn zou, hem, als zich een gedeelte van denzelven vertoont, geheel en al uit het lighaam te trekken; doch ik weet, dat zulks onmogelyk is, want, hoe voorzigtig men ook trekke, zoo voelt de lyder nogtans aanstonds eene zekere beweeging in het lyf, en eene zoodanige jeukte, dat hy door stuiptrekkingen aangedaan word, indien men niet nalaat te trekken, en den worm affnydt. Bindt men alsdan een' zyden-draad aan denzelven; dan word de draad, ter lengte van drie ellen en meêr, in het lyf getrokken, doch zakt eindelyk wederom neder, en komt binnen korten tyd weder te voorschyn.

Hier uit kan men gedeeltelyk afneemen, waarom deeze worm zoo bezwaarlyk kan uitgedreeven worden. Deeze zwaarigheid schynt hier door te vermeerderen, om dat hy zich door de genoemde mondjes aan de darmen kan vasthegten; waar by nog komt, dat hy zich in de menschen, even gelyk in

II. DEEL.

D

vis-

visfchen en honden, met het puntige gedeelte van zyn fnalle einde, 't geen waarfchynlyk de algemeene mond is (want elk lid heeft daarenboven zynen eigen mond, ik meene de mondjes aan de zyden) zich aan de darmen zoo vaft hegt, dat men hem niet zonder groote moeite kan los maaken. WEP-
 VER *de cicuta aquatica* cap. 3. heeft aangemerkt, dat hy zich aan den darm, even als een bloedzuiger vaft hegt. Men vergelyke den brief van HER-
 RENSWAND aan VAN SWIETEN. *Comment. Tom.*
4. pag. 739. (k)

Doctor TYSON zag eenen levendigen lint-worm in eenen geöpenden hond, die, met het breede einde, in den endel-darm vry lag, doch met het fnalle zoo zeer vaft gehegt was aan den eerften kleinen darm, dat hy hem met den nagel niet zonder moeite kon los maaken. Hieruit blykt teffens, dat men niet verzekerd zyn kan, van den lint-worm verloft te zyn, voor dat het fnalle einde insgelyks onbeschadigd wechgegaan is. Blyft daarvan een gedeelte te rug; dan groeit hy fchielyk weder aan, ja, zoo 'er flechts één lid van overig is, dan kan dit zich insgelyks vermeerderen, en een lange worm worden.

Het is waarfchynlyk, dat de lint-worm zoo fterk in grootte toeneemen kan, dat hy geene plaats
 meer

(k) Met den kop fchynt hy tufchen de vliezen der darmen dikwils in te dringen, en zich dus vaft te houden: In die foort, ten minften, welke in visfchen gevonden word, heb ik dit dikwils waargenomen.

meer vindt in de darmen, maar genoodzaakt is, zich, voor een gedeelte, uit dezelve te begeeven. Somtyds zal eenig deel van hem verdorren, of sterven, en hetzelfde kan als dan, door de ontlastwordende stoffe, losgemaakt, of, door geneesmiddelen, uitgedreeven worden. Het is zeker, dat hy somtyds aan het een of ander lid beschadigt word, of verrot. Dit gebeurt mede tusſchen twee verdeelingen, alwaar hy allengskens ſmaller word, tot dat hy eindelyk afvalt. Ik hebbe opgemerkt, dat dit op tweeërleiſe wyze geſchiede; want, of de verrotting neemt aan beide de zy-randen een begin, en maakt dus als ware het twee halve maanen, die met de verheeven zyde tegen elkander ſtooten; of, de verrotting ontſtaat in de midden, en laat aan beide einden ſlegts eenige draaden te rug. Dit is dus eene zekere oorzaak, waarom dikwils ſtukken van lint-wormen te voorchyn komen, zonder dat de lyder daar toe genees-middelen gebruikt hebbe.

Thans weet men zeker, dat de lint-worm ook buiten den menſche gevonden worde: Dat dezelve in het water, en in de viſſchen te vinden zy; heb ik reeds, door het getuigenis van geloofwaardige mannen, bevestigd in de verhandelingen der Koninklyke Academie der weetenschappen voor den jaare 1747. p. 113. (1) Men heeft dezelve egter ook ge-

(1) Men zie de Geneeskundige Verhandelingen aan de Zweedſche Academie der Weetenſchappen medegedeeld I. D. pag. 177.

gevonden in de darmen van honden, katten, lammeren, hoenderen, ganzen, duiven; ja zelfs in de darmen van eenen kort te vooren geworpen hond, gelyk door den Heere Asfesor DARELIUS waargenomen is.

Dit zoude ons ligt kunnen op de gedagten brengen, dat de lint-worm ons zou kunnen aangebooren zyn, te meer, daar my een voorbeeld bekend is, dat twee Dogters, de Moeder, en Groot-moeder, den lint-worm gehad hebben; Dit word ook waarfchynelyker door de waarneemingen, van den Hr. VAN DOEVEREN in zyne *Diſf. de vermibus inteſt. hominis* p. 31. verzamelt, en door het verhaal van den Hr. DE LILLE, wiens Dogtertje elf weeken oud, wormen loofde, offchoon het nooit anders, dan het zog der moeder genoten had. BRENDEL bewaarde eene menigte kleine ronde wormen, die hy in de dunne darmen van een menſchen-vrugt gevonden had.

De vierde foort van wormen, waar mede de menſchen geplaagd worden, noemt de Heer VAN LINNE', *Aſcaris lumbricoides* (*Syſt. nat. edit. 12. T. 1. p. 1076.*) Deeze komt in allen deelen overeen met de aars-maaden, en is mede, gelyk deeze, aan beide einden puntig, doch is een vierendeel-elle, en ſomtyds, meer, lang. Deezen heeft men gemeenelyk met de aars-maaden verward (*).

De

(*) Volgens LINNÆUS *Faun. Suec. ed. 2. pag. 504.* is deeze worm ook daar door van de gewoone lange
ron-

De vyfde foort is de *Fasciola intestinalis* (LINN. *Syst. nat. ed. 12. T. 1. pag. 1078*). MONTIN, heeft dezelve by een vrouwsperfoon afgedreeven, en in de verhandelingen der Academie voor den jaare 1763. pag. 113. zeer goed beschreeven (*m*). Deeze worm is dik, en heeft aan beide zyden een lange, ingedrukte, streep, die alleen uit ingedrukte, en gerimpelde puntjes bestaat. Aan het grootste gedeelte loopt hy stomp toe, doch aan het andere word hy langzaamerhand smaller, tot aan het uiteinde, waar mede hy zich in vischen ongemeen vast houdt, op zodanig eene wyze, dat hy meestendeels altyd afgescheurt word, zoo men hem met de ingewanden van den visch uithaalen wil, ten zy men den visch in zeer koud water legd. Hy heeft aan zyne randen fyne, eenigzints scherpe, tandjes, en deeze scherpte word men gewaar, wanneer men
langs

ronde wormen onderscheiden, dat de groote ring, welke deeze hebben, daar aan ontbreekt. De drietepelagtige verhevenheden, aan het eene einde, welke VALLISNIERI reeds beschreeven en afgebeeld heeft, (Men zie CLE-
RICI *Hist. lat. lumbr. tab. 10. fig. 3.*) geeven wel het beste teken van onderscheid. Deeze heb ik by de aardwormen, hoe nauwkeurig ook onderzocht, nooit kunnen vinden (zie myne *Observat. de vermibus pag. 75. nota.*) Aan de kleine aars-maaden worden zy niet gevonden. HIORTH en FAXE hebben deezen worm. *ascaris lumbricoides*) ook in vischen gevonden. M.

(*m*) Zie de aangehaalde Geneeskundige verhandelingen III. D. pag. 135. &c.

langs dezelve heen strykt, vooral aan zulke stukken, die styf zyn, en dit is waarfchynelyk ook de reden, dat deeze worm fnydingen in het lyf verwekt, eer hy ontlafte word. Gemelde heer heeft ondervonden, dat zy, op gloeiende koolen van beuken hout gelegd, dezelve door hunne fym twee ja drie maalen uitgedoofd hebben, en in een fterk koolen vuur meer dan twee minuten leefden. Ook verhaalt hy, dat eene vrouw in Halland met een gedeelte van een braasfem een stuk van eene levendige *fufciola* in den mond kreeg, doch hetzelfde met haar tong als iets vreemds ontdekte en wechdeed.

Hier hoort ook eene zesde foort, die GORDIUS genoemd word (LINN. *Syst. nat. Ed. 12. tom. 1. pag. 1075.*) Deeze is zeer goed onderzocht door den Hr. A. R. MARTIN, en befchreeven in de verhandelingen der Zweedfche Academie voor den jaare 1771. p. 261 (n) Het lighaam heeft de gedaante van een cylinder, zynde aan beide einden puntig, doch aan het eene einde puntiger, dan aan het andere; het fpijfte einde fteekt de worm uit, als men iets kouds op hem giet, even als een priem. De kleur is wit, behalven den genoemden punt, welke bleeker is. De uitwendige huid heeft dezelfde kleur, doch het ingewant of de darm is nog bleeker, en, in brandewyn gelegd, heeft hy de gedaante van afgefneeden draaden. Hy kromt zich op

(n) Geneeskundige verhandelingen IV. D. pag. 391.

op onderscheide wyzen, en schynt met het smalle einde voort te kruipen, welke ongetwyffelt de mond is. Hy word gevonden in de lugt-blaas der vischen, alwaar hy zyne wooning schynt te hebben, en te groeijen. De grootste zyn een duim lang, en de oudste taaijer van leeven, dan de jongere. Zy weeten de lugt-blaas te doorbooren, welke egter even gespannen blyft, als voorheen; dan dringen zy door de darmen, lever, en andere deelen. In onderscheide vischen worden zy gevonden, en vertooncn zich in de hom of darmen onder de gedaante van opgerolde draaden. Te *Helsingfors* waagt het daarom nooit iemand spiering (in welke zeer dikwils deeze worm gevonden word) te eeten, voor dat men den rugge geopend en de lugt-blaas daar uitgenomen heeft.

De Hr MARTIN, die zelve van deezen gast geplagd is geweest, geeft de volgende tekenen op, waar aan men hem kan ontderkennen. Het jouken der neusgaten, vooral tegen den avond; een onverwagte en sterke toevloed van speekzel; onverwagte braakingen, sterk zweeten des nagts; onrustige slaap, pynen en trekkingen in de lever en milt, waar door winden opkomen, roodheid der wangen, somtyds meer aan de linker, dan aan de regter zyde; benauwtheid; angstvalligheid; vrees, argwaan, toorn. Het lighaam is loom, vermoeid, de armen zyn niet in staat, om opteligen 't geen men noodig heeft. De maag word opgezet en gespannen, zoo wel voor als na den afgang, men bespeurt pyn onder de ribben, geeft slym op,

meest na de afgangen, doch ook somtyds te voren. Het jeuken van de neus, en de flymerige braakingen, schynen den Hr. MARTIN de zekerste tekenen te zyn (*).

Zelden zyn alle deeze soorten te gelyk by eenen en denzelfden mensche. Een arm kind van vier jaar, dat zeer afgemarteld en zwak was, en daarom van de Moeder een weinig koorn-brandewyn tot versterking kreeg, raakte kort daar na op eenmaal kwyt eene ontzachelyke meenigte aars-maaden, vier ellen van eenen dunnen en kleinen lint-worm, en tien stuks van de tweede en vierde soort. Nadat deeze gasten vertrokken waren, herhaalde zich het kind, wierd vet, en kreeg zyne kragten weder.

Men heeft opgemerkt, dat de menschen in het eene jaar meêr met wormen geplaagd worden, dan in het ander; en als 'er dan eene ziekte begint te heerschen, dan staat men verbaast over de grootte meenigte wormen, die zoo wel van boven, als van onderen, door den lyder geloosd worden. Dit had plaats by een groot gedeelte van ons Paerden- en Voet-volk, die in den jaare 1743. van den veld-

togt

(*) De Hr. BROED zegt, dat op eene plaats, niet ver van *Marienskiadt* in *Westgothland*, in verscheide bronnen eene soort van *Gordius* is, welke, als zy door dieren of menschen met het water doorgezwolgen word, stuipen, ja zelfs den dood, veroorzaakt, ten zy dezelve door sterke purgeer-middelen, terstond uit het lighaam gedreeven worde. *Forsätting af Prov. Dock: berätt: pag. 98.*

toegt uit Finnland ziek te rug kwamen. Of dit ontstaan zy, om dat zy onzuiver water gedronken hadden, dan of een voorafgegaan zagst weder te weeg gebragt had, dat veele cijeren uitgekomen waren, of wel de wormen toen ter tyd van de eene of andere oorzaak beter hebben kunnen voortkomen, dan anders, laat zich, zonder een nauwkeurig onderzoek, niet gemakkelyk beflissen. Dit is bekend, dat men, zal zoo eene heerschende ziekte geneezen worden, zich moeite moet geeven, de lyders van zulke gasten te bevryden; want zy konnen, of zelfs eene koorts veroorzaaken, of die, waarmede de lyders aangetast zyn, vermeederen, of dezelve ongeregeld maaken, of de toevallen, waar mede men geplaagd word, vermeederen, en buik-pynen, een gezwollen lyf, raserney, stuiprekkingen, en soortgelyke ongemakken veroorzaaken (*).

De Heer VAN DOEVEREN had in den herfst van den jaare 1752. eenen sterken soldaat te bezorgen, die aan eene tuschenpoozende koorts ziek lag. By eenen aanval kreeg de soldaat eene heevige beeving, voornamentlyk in de armen, gelyk ook een wonderlyk lagchen, met eenen rasfen, doch kleinen, beevenden, en somtyds tuschenpoozenden pols. Hy gaf hem daarom een braak-middel, 't welk, nevens zeer veel slym, eenen grooten lint-worm uitwierp; waar na de toevallen ophielden, en de koorts ook kort daarna bedaarde.

De

(*) Men vergelyke VAN DEN BOSCH *Hist. constitutionis epidem. verminosæ 1769.*

De toevallen, welke de wormen veroorzaaken, komen voort

1. van derzelver grootte en meenigte. Hoe grooter en talryker zy zyn, dies te meer deelen zy het voedzel met ons. Daar uit ontstaat de groote eet-lust in hen, die wormen, voornamentlyk den lint-worm, hebben. Deeze lust is fomtyds zoo groot, dat zy in onmagt vallen, als zy niet schielyk een stuk brood krygen kunnen. Van daar is het mede, dat menschen, die alleen des middags eeten, zich des morgens niet wel bevinden, en dat zy, integendeel, beter zyn, wanneer zy zoo wel des avonds als des morgens eeten (Men zie *die Abhandl. der Königl. Akad. der Wiss.* 1747. p. 119. (*).) Daarom moet eene kraam-vrouw, die den lint-worm heeft, meer dan eene andere eeten, ten einde zy door denzelven niet geplaagd worde.

2. Ontstaan dezelve hierdoor, dat zy dikwils in een klomp, met veel slym omringd, by elkander liggen; 't geen men gemeenelyk noemt, een wormen - nest. Door zoo een nest gebeurt het, dat de darmen op eene plaats uitgezet of verstopt worden, 't geen den grond legt voor besloote winden, buik-pynen, braakingen, en de verschrikkelyke ziekte, het *miserere*, of de kronkel genoemd.

3. Brengen de uitwaasfemingen der wormen, en 't geen dezelve ontlasten, veel toe tot de ongemakken. Dus kunnen zy, als eene vreemde stoffe, die

(o) Geneeskundige Verhandelingen I. D. pag. 177.

die gemakkelyk tot verrotting overgaat, den gewoonen of rooden loop, of eene kwaadaartige koorts veroorzaaken, wanneer zy te gelyk met den Chyl door de opflorpemde- en melk-vaatjes in het bloed gebragt worden. Dezelfde ongemakken fleepen zy met zich, wanneer zy in het lighaam fterven, en niet aanftonds uitgedreeven worden.

4. Verder ontftaan veel ongemakken, wanneer de wormen door de darmen heen dringen, en in den buik vallen. Hoe dit gefchiede, weeten wy eigentlyk niet; doch dat het dikwils gebeure, getuigen veel geloofwaerdige Geneesheeren, (Men zie *Dissert. Anatom. Edit. ab HALLERO, tom. 6. p. 718.* en de *Abh. der Akad. de Wissensch. 1747. pag. 104.*) (p). Dit meent men zy
aan

(p) Eene vrouw van zestig jaar' had, in haare kindsheid, eene beitende hitte in de maag bespeurt, welke fomtyds zwaarer fomtyds minder was, egter zoo, dat dezelve haar altyd lastig viel. In den jaare 1744. nam de pyn zeer sterk toe, en duurde agt dagen lang, op welken tyd zich ook in de regter zyde eene verzwearing, zoo groot als een vuist, openbaarde, welke eene donker-roode kleur had. Deze verzwearing wierd ryp, en opende zich; doch de pyn in de maag en de verzwearing hield aen: Des zag zy zich genoodzaakt, vyf mylen ver hulp te zoeken; daar ter plaatse gekomen zynde, dronk zy versc'h bier, en eenige dagen daarna verzoonde zich in de opening van de verzwearing, een lintworm, welke, door middel van een stokje, ter lengte van drie ellen uit dezelve gehaald wierd, kruipende het overige weder in het lighaam. Geduurende den geheelen zomer

aan Herodes Agrippa wedervaaren , volgens *de Handelingen der Apostelen in het twaalfde hoofdstuk (q)*.

5. Voor-

mer en herfst liep uit de verzwearing een geel zwart-achtig vogt, en de verzwearing zelve zag lelyk uit. Eindelijk sloot zich dezelve, doch de pyn in de maag bleef; zy loofde vervolgens met den afgang, herhaalde reizen, stukken van wormen, doch voelde naderhand ook ter plaatse van de verzwearing, even als of de worm daar weder uit wilde.

(q) HEISTER opende het lyk van een kind van zeven jaaren, 't welk zedert eenigen tyd zeer heevige buik pynen had gehad, en, schoon hetzelfde zeer goeden trek tot eeten had, egter zeer vermagerde, en uitge-teerd stierf. In den buik vond hy eenige oncen van een geel vogt, en, wanneer hy dit met eene spons wechgenomen had, zeer veele ronde wormen, waarvan 'er alleen ééne leefde, schoon hy het lyk den dag na den dood opende. De dunne darmen waren vol gaatjes, en bevatten nog zeer veele wormen, die egter allen dood waren. Op zekere plaats der dunne darmen ontdekte hy een hard en rood gezwel, 't welk eenige openingen had, waar door hy daat, dat de wormen in den buik gekomen waren: *Wahrnehm. n^o. 515. pag. 869.*

Eene vrouw met buik-pynen, braakingen, en hardlyvigheid geplaagd, gebruikte veel genees-middelen te vergeefs. Door herhaalde clysteeren bragt men ontlastingen te weeg, waar door de buik-pyn, ook eenigzins bedaarde; doch de braakingen bleeven aanhouden. Op den agtsten dag braakte zy eenen ronden worm, die een duim lang was: Hier door had zy verligting in de maag, doch de buik-pynen bielden aan, hoe wel veel in heevigheid

5. Voornamentlyk egter is de beweeging, het kruipen en zuigen der wormen, schuld aan de veel-

held verminderd. Zy klaagde over een gezwel in de liefch, 't welk zoo groot als een hoender-ey was, en zy reeds agtien maanden lang gehad had: met de hand kon zy hetzelfde verschuiven, en had nooit pyn daar in gevoeld. DOUGLAS dagt, dat het een breuk was, en behandelde hetzelfde na de regelen der konst; doch vier dagen; daarna vermeerderde de pyn grootelyks, en zy gevoelde eene klopping in hetzelfde; en toen stond zy den Heelmeester toe, dat hy hetzelfde mogt beschouwen. Hy vond een zeer breed ontstooken gezwel, 't welk zich tot zweeren zette, zonder dat de klieren in de liefch gezwollen waren; door pappen bragt hy eene opening in hetzelfde, en toen kwamen omtrent vier oncen etter te voorschyn; de verzwearing wierd beter, maar na eenige dagen kwamen uit dèzelve twee wormen, en op den veertigstendag was de verzwearing geflooten; doch na eenige dagen kwam in de roof eene kleine opening, waar uit het dunne gedeelte van den drek te voorschyn kwam; welk klein ongemak zy naderhand gemakkelyk verdraagen kon; *Medical Effais. &c. tom: 1. n. 19.* Soortgelyke voorbeelden vindt men ook door andere Schryvers aangetekend; en VAN DOEVEREN verhaalt daar van eene zonderlinge waarneeming. Hy kreeg een kind van twee jaaren, om de vaten op te spuiten, doch deszelfs buik was zoo buiten-gewoon opgezet, dat hy goed vondt, dien te openen. In denzelven nam hy waar eenige oncen van een zeker vogt, welk met de stoffe uit de darmen scheen vermengd te zyn; even boven de schaam zag hy twee ronde wormen, die uit eene opening van den omgewonden darm (*Intestinum Ileum*)

hug.

le ongemakken. Zy beweegen zich sterk, wanneer zy honger hebben, of wanneer zy geprikkelt worden door spyzen, of door gencees-middelen, die zy niet verdraagen konden, en zy zich als dan ver-

hingen; een derzelve lag geheel in den buik, was zeer dun, en omtrent vyf duim' lang; de ander, die de lengte van agt duim' had, en zoodik was, als een gewoone tabaks-pyp, zat, voor een derde gedeelte, in den darm, en hong voor het overige in den buik. Het gat in den darm was zoo groot, dathy den kleinsten vinger gemakkelyk 'er insteeken kon. Veel laager in denzelfden darm was een soortgelyke worm, die met het eene einde, ter lengte van drie duim' door eene opening in den buik gedrongen was. Op eenen afstand van twee duim' van dit gat zag men een derde gat, waar door dezelfde worm met zyn ander einde in den buik hong. Eindelyk was nog een gat op het einde van den nutteren darm (*Intestinum Jejunum*), 't welk omtrent van dezelfde groote, als de drie voorgaande, was, en insgelyks eenen ronden worm bevatte, die zoo gedraaid was, dat hy eenen strik vertoonde. Daar beneeven was boven in deezen darm een kronkel, die te gelyk ontstooken was. De maag was aan de beneden- en flinker-zyde, en de darmen op verscheide plaatsen ontstooken. In twee kinderen, die aan stuipen gestorven waren, heeft PALLAS den binnensten rok der darmen aan stukken geknaagd, in de darmen verscheide gaten, en in den buik wormen, gevonden, waarvan eenigen nog voor een gedeelte in de gaten der darmen zaten; en te Berlin heeft hy in het gast-huis waargenomen, dat uit eene verzwearing in de lisch van eene vrouw een worm gekomen is.

verbergen of vasthouden willen. In het algemeen kunnen de wormen geene harde en gezoute spyzen, als gezouten visch, of zuuren wyn, spyzen met uijen, anys, drop, zuiker of meê verdraagen; maar de melk staat hen aan, en somtyds stilt dezelve de ongemakken der wormen: Doch niet zelden vermeederen deeze zich daarna; 't geen zou kunnen geschieden als dan, wanneer zy dieper in de darmen liggen, en, om in de maag schielijk te komen, kruipen moeten. De maag en darmen zyn aandoenelyk en gevoelig; daarom kan de beweeging en het zuigen der wormen, de kramp, walgingen, eenen lelyken smaak, eene witte tong, benauwtheid op de borst, beängstheid, braakingen, rommelingen der darmen, eene opzetting en zwelling des buiks, buikpynen, dan eene al te sterke ontlasting, dan eene verstopping, zuigingen in de maag, en voortgelyke ongemakken meêr, veroorzaaken.

Dewyl nu de maag en darmen met het geheele overige lighaam in een verband staan; zoo kan ook de prikkeling der wormen het geheele lighaam in wanorde brengen, wanneer de kramp zich verder verspreidt. Word de huid samengetrokken, dan worden wy huiverig; trekken zich de nieren samen, dan word de pis bleek, of geheel opgestopt. Gebeurt dit aan de keel, dan kunnen wy niet slikken. Hier uit ontstaan ook alle overige ongemakken, welke de Geneesheeren dikwils bemerken by hen, die door wormen geplaagd zyn, gelyk, by voorbeeld, eene zwakke en somtyds tuschenpoozen-

zende pols, hart-kloppingen, flauwtens, draaijngen in het hoofd, eene belemmerde spraak (Men zie de *Abb. der Akad. der Wissensch.* 1747. p. III. (r)), spraakeloosheid, blindheid, ruisfchingen der ooren, bevreesdheid, een neerslagtig gemoed, dofgeestigheid, raferny, een opspringen in den slaap, ongeruste droomen, zwaarmoedige gedagten, sterke benauwdheden, onrust in het lighaam, de hik, stuiptrekkingen (*), de vallende ziekte, en beroerte. Men heeft voorbeelden van menschen, die zeer schielyk geheel en al dol geworden zyn, doch zoo stil als een lam wierden, zoo dra men de wormen uitgedreeven had. Dikwils zyn de wormen schuld, dat de stonden by vrouws-perfoonen wechblyven. Wanneer de minnen wormen hebben, dan verdwynt het zog veeltyds te vroeg; de borsten krygen klooven, gelyk in de lippen geschiedt, en de tepels worden met eenen bleeken ring omgeeven. SPIGELIUS verhaalt van eene ongetrouwde voornaame Juffrouw, dat zy eenen

(r) Geheeskundige Verhandelingen I. D. pag. 177.

(*) Twee Broeders wierden, volkomen present zynde, met zwaare stuipen over het geheele lighaam aangedaan, en zoo dikwils, dat zy somtyds maar vier of vyf minuuten vry waren. Aanmerkelyk was het, dat de stuipen hoe zwaar die ook waren, aanstonds ophielden, wanneer iemand hen in het aangezicht biies. Daar de Hr. WAHLBOM hier van getuigen is, mag men aan het geval niet twyfelen. *Fortsättning af Prov. Doct. berättelser* p. 221. M.

nen tegenzin in de spyzen kreeg, en beluſt wierd, als eene zwangere vrouw: haar lyf zwol op, en de ſtonden bleeven geheelyk wech. Nadat haare bedroefde ouders haar hadden laaten onderzoeken, kreegen zy tot antwoord, dat ze zwanger was; men liet daarom alle genees-middelen wech. Intuſſchen viel de lyderesſe in eene uitteering, en ſtierf uit onkunde en verwaarloozing. Men opende dezelve, en vondt haar onſchuldig, want in de baarmoeder was geene vrugt, doch in de darmen ontdekten men eene meenigte ſlym en water, nevens eenen lint-worm, die zoo lang was als de darmen. Men moet daarom aan de Geneesheeren toekomen, dat 'er geene zoo zwaare en zeldzaame ziekte zy, of dezelve kan door de wormen ontſtaan. Wanneer zich derhalve eene ongewoone en byzondere ziekte allengskens en zonder eene duidelyke oorzaake openbaart; dan onderzoeken zy altyd, of men by den zieken ook tekenen van wormen beſpeurt hebbe. Deeze tekenen zal ik, voor eerſt, in het algemeen opnoemen, en daarna trachten te bepalen, volgens welke tekenen men beſluiten kan, door welke eene ſoort van wormen de lyder eigentlyk geplaagd zy.

De Kentekenen der wormen in het algemeen zyn: eene veranderlyke gezichts-keur, die dan bleek, dan rood is; een blauwe ring onder de oogen (†); jeukten in de neus; hoofd-pynen, die dik-

wils

(†) MONRO en anderen hebben opgemerkt, dat de

wils wederkomen, zoodra men heeft gegeten. Als men des morgens ontwaakt, dan heeft men den mond vol water, de kwyl loopt des nagts op het hoofd - kussen. De slaap is onrustig, en men springt in denzelven op. Men legt gaerne op den buik; knerft met de tanden; men doet in den slaap, als of men wilde slikken, regt zich geduurende denzelven op; men spreekt en roept, doch raakt aanstonds weder in slaap. Des morgens is men dorstig, en sterk geneegen tot onmagt; dikwils heeft men draajingen in het hoofd, ruisfchingen der ooren, somtyds misfelykheid, en eenen tegenzin aan de spyzen, doch af en aan, en meestentyds eenen grooten trek tot dezelve; eenen stinkenden adem. Het tandvleesch word verteerd. Daar volgen braakingen. Men heeft eene drukking op de borst, buik - pynen en krimpelingen, inzonderheid om den navel. De buik zwelt schielyk op, en is pynlyk. De winden rommelen in het lyf. Men bemerkt inwendig een zuigen, en een gevoel, als of zich iet omwentelde. Somtyds heeft men sterke ontlastingen, doch op eenen anderen tyd is men hardlyvig, 't geene ontlast word, stinkt zeer sterk. Men eet, gelyk gezegd is, meestentyds veel, en is egter mager. Men bevindt zich slimmer des morgens, voornamentlyk wanneer men, noch des avonds gegeten, noch des morgens ontbeeten heeft. Men is erger met
het

oog - appel in lyders, die wormen hebben, veel wyder, dan natuurlyk, is.

het waschen, dan met het afneemen van de maan.

In den endel - darm bemerkt men eene jeukte, die fomtyds zoo gevoelig is, dat men flauw word; dikwils heeft men ook perslingen tot afgang. Men is lusteloos, benauwd, en onbekwaam om zyne gewoone beezigheden te verrigten; fomtyds tegen gewoonte verdrietig. Men weet niet, wat men wil. Het valt moeiljk, duidelyk te spreken; fomtyds kan men geen enkel woord voortbrengen. Sommigen worden dol (*maniaci*), anderen waan - wys (*Ephem. nat. curiosor, Dec. 3. A. 3. Obs. 135.*). Eenigen worden, zonder eene merkelyke oorzaak, met stuipen aangetaft, en weeten niets daar van. Zyn dezelve gering; dan komt geen schuim voor den mond; doch het tegendeel heeft plaats, wanneer dezelve heevig zyn. Sommigen worden in het geheele lighaam styf, raaken in onmagt, doch worden wakker met geweldige stuipen; vallen daarop in eene rafernny; slaapen daarna, en worden na korten tyd met hun volkomen verstand wederom wakker, ondervindende als dan niets, behalve eene vermoeidheid. Daar zyn 'er, die dikwils drinken. Eenigen hebben eenen droogen hoeft die veel overeenkomst heeft met den kink - hoeft (*Commerc. Lit. Norimb. A. 1732. p. 46.*). Het valt hen moeiljk, zich, na eene ziekte uitgestaan te hebben, te herhaalen. Zy zyn met hartkloppingen geplaagt. ALEXANDER MONRO verzekerd, dat eene aanmerkelyke verwyding van den oogappel een der zekerste tekenen is. Men zie VAN SWIETEN *Comment. Tom. 4. pag. 721.* Een tameljk

lyk zeker teken is ook dat, als iemand schielyk misfelyk word, en dit overgaat, nadat hy een glas zeer koud water gedronken heeft. De rede daarvan zal blyken uit 't geen ik van de werking van koud water op de ronde en lint-wormen te melden heb. Doch het zekerste teken is, wanneer wormen, of gedeeltens derzelven, van hen geloosd worden (†).

Niemand moet alle deeze tekenen te gelyk by eenen en denzelfden mensche verwagten: Het is genoeg, als 'er zich veelen openbaaren. Ik besloot dus te regte, dat een meisje van tien jaar' wormen had, omdat het, schoon genoeg eetende, mager wierd, bleek uitzag, eenen blauwen kring onder de oogen had, en wegens pynen in de knien en beenen, verscheide maalen na den anderen, zoo dra de maan begon afteneemen, bedlegering wierd. Het poeder tegen de wormen, waar van ik naderhand spreken zal, gebruikte zy met vrugt. Dus bevondt ik mede, dat een kind, zonder oorzaake, mager en dikwils ziek wierd, zonder dat het ergens over klaagde: Doch wanneer het des morgens wakker wierd, bemerkte men, dat het altyd op den buik lag; daarna ontdekte men door eene soort van laxeer-pillen, die *calomel* in zich bevatten, dat

(†) Dit is het eenigste teken, waarop men zich kan verlaaten; want alle andere, hoe genaamd, zyn aar zoo veele andere ziekten gemeen, dat men uit dezelve niets met zekerheid kan besluiten.

dat het eenen dunnen en tederen lint-worm by zich had. VAN DOEVEREN spreekt van een gezond kind van twaalf jaaren, dat onvoorziens aangetast wierd door flauwtens, krampen, stuiptrekkingen, en eenen geringen trap van vallende ziekte, en daarna met eene alledaagsche koorts. Hy liet hetzelfde water drinken, waarin kwik gekookt was. Aanstonds loosde het twee groote ronde wormen, en daar door wierden de zwaare toevallen verzagt. Onze geleerde LINDESTOLPE wierd geroepen by eene Juffrouw van tien jaaren, die voornamentlyk klaagde over pyn in de *slinker* zyde; eenen droogen hoeft, eenige hitte, eenen rasfen pols. grooten dorst, droogte in den mond, en ook somtyds krimpelingen in de maag had, die ook by tyden spraakeloos wierd, en stuipen kreeg. Hy merkte dit alles aan, als eene uitwerking der wormen, en gaf daar tegen eenige poeders. Nadat zy twee van dezelve ingenomen had, kreeg zy twee dagen daarna omtrent de middag zulke sterke stuiptrekkingen, dat de voeten na den rugge getrokken wierden: dit uitgestaan hebbende, bemerkte zy verder geene ongemakken, maar sloop tot aan den avond. Wanneer nu de Moeder haar uit het bed nam, om hetzelfde optemaaken, viel een levendige en ronde worm, ter lengte van eene halve el, op den grond, en wentelde zich als eene slang. Zy had denzelven gansch droog geloosd, gedurende de sterkste stuiptrekkingen. Daar na raakte zy kwyt eenige vellen, en holle stukken van wormen, die niet ongelyk waren aan de pyp-agtige bladen van de uijen, en kreeg op deeze wy-

ze haare gezondheid weder. Men zie deszelfs boek over de wormen, bladz. 20.

Wanneer iemand eene onrustigheid en rommelingen in de ingewanden, voornamentlyk in de eene zyde, gewaar word, door winden opgezet is, eene drukking onder de borst, met eene benauwdheid en verdrietigheid, bespeurt, en de drukking, nadat hy, by voorbeeld, eene goede gifte van het extract van Alsem ingenomen heeft, altyd met eene worms- wyze beweeging verdwynt; dan kan hy zeker zyn, dat hy wormen heeft.

DELIUS *Amanitat.* pag. 349. spreekt van een' jongeling, die zwaare pijn had in de regter heup en lende, waar door hy genoodzaakt wierd, den regten voet naar binnen te keeren, en begon mank te gaan. De ouders meenden, dat hy zich verrekt had, doch de Geneesheer bedagt, dat hy een' harden buik had, dikwils over pijn in de maag klaagde, dat hem de mond somtyds vol water wierd, de neus jeukte, en de pis uitzag, als wey. Hieruit besloot hy, dat de wormen oorzaak van het ongemak waren, verdreef deeze gasten, en genas de ziekte.

Weet men nu, uit de aangehaalde toevallen, dat iemand met de wormen geplaagd is, en wil men gaerne kennen de byzondere foort, welke de lyder by zich heeft; dan schikt men zich na de volgende kentekenen:

Heeft hy den lint-worm; dan voelt hy in het lyf eene zuiging, en iet levendigs, dat eene worms- wyze beweeging heeft. In de eene zyde bemerkt hy

hy eene zwaarte, als of 'er een bal lag. Met den afgang loost hy fomtyds, voornamentlyk als hy laxeer-middelen inneemt, of te veel peen eet, of het sap uit berken-boomen drinkt, of te veel sap van pyn-boomen zuigt, iet, dat de gedaante heeft van het zaad van komkommers; het welk stukken zyn van die soort, welke met mondjes aan de randen voorzien is. LINNÆUS meent, dat zy veel meer overeenkomst hebben met het zaad der distels; gelyk hy aan de deelen van de andere soort, wanneer zy ontlast worden, eene gelykheid met gersten - korrels toeschryft: Men kan na slaan de voortreffelyke verhandeling van den Heere Du Bois over den lint-worm, in LINNÆI *Amoenit. Acad.* vol. 2. p. 66.

De byzondere tekenen, waarby men de ronde wormen kend, zyn krimpelingen, en pynen in den buik, voornamentlyk om den navel, en fomtyds eene opspringende beweeging in den buik.

Dic, welke te kennen geeven, dat de aars-maden zich in den endeldarm ophouden, bestaan in eene jeukte aan den aars, veelvuldige perssing tot den afgang, en in eene verdrietige en traage gemoeds-gesteldheid (u).

Zy

(u) Somtyds veroorzaaken zy eene verstopping, en in andere gevallen eenen al te sterken afgang. De jeukte, die dikwils ondraaglyk is, word ook in andere omlyggende deelen bemerkt, en uit dezelve ontstaan spanningen, welke maken, dat de pis ongemakkelyk of

E 4

drop-

Zy, die wormen hebben, worden niet gestaadig, maar somtyds, door dezelve verontrust; gemeenelyk worden zy door de wormen, voornamentlyk door den lint-worm, geplaagd op het einde van de volle, en met het begin van de nieuwe, maan (*).

In-

droppels - wyze geloosd word; dat de ambeijen beginnen te bloeden, of andere toevallen ontstaan.

VAN PHELSUM heeft in zyne *bist*: *ascaridum pathol.* de toevallen, welke deeze wormen verwekken, nauwkeurig beschreeven, en met veele gevallen opgehelderd.

(*) Ik verklaar dit niet uit de werking van de maan (zie HALLER *Elem. Physiol. Tom. 7. pag. 11. 152.*) doch beroep my alleen op de ondervinding. Mogelyk beweegen zy zich slechts op zekere tyden, gelyk de maas - maaden alleen des avonds doen. R.

De Schryver is zoo zeer overtuigd van de waarheid deezer aanmerkinge, dat hy in eenen brief, waarmede by my vereerd heeft, by gelegenheid liet invloeyen; dat hy dit in ontallyke kinderen waargenomen had; dat hy uit de aanvallen, als de almanak niet by der hand geweest ware, den datum zou hebben kunnen bepaalen. Geen wonder daarom, dat de Heer VAN ROSENSTEIN op deeze omstandigheid in de geneezing zoo opmerkzaam geweest zy. De Hr. ZIMMERMAN (*von der Erfahrung 2. Th. pag. 108.*, schoon anders niet veel aan den invloed van de maan toeschryvende, spreekt van eene vrouw, die zederd drie jaaren altyd, wanneer de maan afneemt, twee, agt, ja meer ellen vanden lint-worm lewyt raakt. Volgens de waarneemingen van BISSET *Essay on the medic. confit. of Great Britain pag. 332.*

zyn

Indien men niet in staat is, dezelve aanstonds aantetafen, maar alleenlyk de toevallen, die zy veroorzaaken, wil verzagten; dan kan dit op onderscheide wyzen geschieden.

1. Men laat den lyder drinken een of twee pond melk, zoo warm als dezelve van de Koe komt; want gekookte melk brengt dezelve zoo gemakke-lyk niet tot bedaaren.

2. Men geeft den lyder een zagt braak - middel (v), op die wyze, als ik tegen den kink-hoest op-

zyn aars-maaden by tedere vrouwsperfoonen, twee-maal in de maand, namentlyk by de volle maan, en wanneer dezelve afnam, lastiger dan anders geweest. De Hr. VAN PHELSUM Hist. patkol: aſcar: p. 150 heeft dit ook by de nieuwe maan waargenomen. M.

(v) De voortreffelykheid der braak-middelen, tegen alle foorten van wormen, zelfs tegen de aars-maaden, heeft de Heer RHON in eene verhandeling, in den jaare 1765. te Göttingen verdedigt. getracht te bewyzen, en door voorbeelden optehelderen. De ſterke beweging, welke de braak-middelen in de maag en darmen veroorzaaken, en waar door zoo wel de wormen, als de ſlym, waar in zy zich verbergen, los geſchud worden, word te gelyk met de kortheid des wegs, dien zy by het uildryven volgen moeten, van hem geſteld eene groote reden te zyn, waarom men braak-middelen tegen de wormen zoo hoog te ſchatten hebbe. Eer hy tot derzelver gebruik overgaat, tracht hy door middel ſlachtige zouten de ſlym te ontbinden, en beweeglyk te maaken. Hy geeft ook drie gevallen op, waar in deeze

opgegeeven hebbe; Op deeze wyze heb ik kinderen, geduurende den aanval, van flegte toevallen bevryd. Ik zal alleenlyk een voorbeeld bybrengen: In den jaare 1752. ontlafte een meisje van vier jaar' 's morgens eenen zeer grooten ronden worm; waarop zy, een en twintig dagen lang, alle avond' om zeven uren heftig fchreeuwde; 't welk tot elf uren 's avonds aanhieldt. Hier over ondervraagd wordende, wift zy geene andere reden daar van te geeven, dan dat zy pyn in den buik gevoelde. De Geneesheeren, die tegenwoordig waren, fchreeven voor de befte genees-middelen, die tegen de wormen bekend waren; doch te vergeefs. Wanneer ik om raad gevraagd wierd, liet ik haar, zoo dra het fchreeuwen begon, een poeder uit de *ipeacuanha* geeven. Zy braakte daar van twee-maal, en de toevallen verdweenen. Op de volgende dagen ontlafte zy eene meenigte vliezen van ronde wormen. Naderhand heeft zy zich bediend van verfcheide middelen tegen de wormen, voornamentlyk toen zy tot de inenting der kinderziekte; die men by haar in den jaare 1758. gelukkig verrigtte, voorbereid wierd. Zedert dien tyd heeft zich by haar, noch worm, noch eenig teken daar van geöpenbaard.

3. Heb

middelen van groot nut geweest zyn. By anderen vindt men mede aangetekend, dat zy dezelyen met vrugt gebruikt hebben.

3. Heb ik aan volwassen menschen, gedurende den aanval, in een weinig wyn of brande-wyn gegeven, dertig of veertig droppelen van D. DYRIETZ (*), dan namentlyk, als ik aan de ronde wormen de benauwdheid, flauwtens, en ligte stuip-trekkingen toeschreef.

4. Wanneer ik reden had te gelooven, dat de droefgeestigheid, benauwdheid, drukking onder de borst, en de opzetting des buiks, voortgebragt wierden door den lint-worm; dan liet ik, in wyn, een' of twee spys-lepels vol *extract* van alssem gebruiken. Dit was van die uitwerking, dat de drukking en de opzetting des buiks schielyk, en wel altyd met eene worms-wyze beweeging in de eene zyde, bedaarden (†).

Dan, deeze middelen verschaffen wel eene verzagting, maar neemen de oorzaak niet wech, of de braak-middelen moesten door de schudding, welke zy verwekken, in staat zyn, om te weeg te brengen, dat de wormen die plaatsen verlieten, waaraan zy zich vastgemaakt hadden, en dus uitgedreven

(*) Het voorschrift van deeze droppelen is als volgt:

℞. Gum. *Af. fœtid.* dr. ij.

Opii

Salis. volat: C. C. aa. dr. ʒ.

Essent. Castor unc. iij.

M. Digere & cola.

M.

(†) Zoude niet een doek, in koud water gedoopt, en over den buik gelegd, zulks kunnen stillen.

ven wierden. Dat braak-middelen dikwils wormen afdryven, heeft BROUZET reeds getoont (*).

Ik zal daarom opgeeven, hoe men de wormen dooden en uit het lighaam dryven konne.

De Aars-maaden kan men dikwils verdryven, als men rauwe peen eet, of het sap uit berken-boomen, of dat van pyn-boomen drinkt, tot dat men ontlasting krygt; als mede wanneer men een stukje versh spek, aan eenen draad gebonden, in het fondament steekt, en het zelve kort daarna weder 'er uittrekt, wanneer altoos eene groote menigte derzelven zal volgen. Doch om dezelve allen 'er uittebrengen, moet dit dikwils herhaald, en het spek telkens ververscht worden.

Men kan hen ook door clysteeren van natuurlyk-warme melk en een weinig zout, of door het water van onze gezond-bron en een weinig zout verdelgen (†): Niet minder door, vyf of zes avonden

(*) Dewyl de werkzaamheid der braak-middelen in het schielyk verzagten der toevallen, door de wormen veroorzaakt, nog niet zeer bekend zyn, is het der moeite waardig de werken van MONRO *Diseas: in Brit. military Hospitals*, en STRANDBERG *Tal om felen vid Chron sjukdomars botande*, in te zien. M. van beide werken vindt men een volleedig uittreksel in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek I. D. pag. 666. en V. D. pag. 571.

(†) De Hr. HEBERDEN *medic. Transact. vol. I.* spreekt van een' lyder, wiens toevallen daar door gestild wierden, dat men lauwe melk in den darm spoot.
De

den na den anderen, een clysteer te zetten, uit een dragme fynen zuiker, en even zoo veel rotten-keutels,

De persfingen en de slymerige afgangen hielden op, als men melk en olie inspoot. Als hy een half dragme Rhabarber met even veel cinnaber vermengt, innam, loosde hy altoos eenige slym, die als wit van ey uitzag, en deeze wierd verzeld door veele zulke wormen. Nam hy Rhabarber alleen, dan kwamen 'er nooit zoo veel te voorschyn. Somtyds zyn deeze zeer moeijelyk te verdryven. HEBERDEN maakt ook gewag van eenen zieken, die in February 1757. met zwaare pyn in de maag, walgingen, braakingen, hardlyvigheid, slaape-loosheid, aangedaan was, en geenen trek tot eeten had. Hy wierd zeer mager, en kon gaan noch staan. Zyn buik was hard en ingetrokken. De pis zag als wey uit, en had een wit grondzetzal. De stoffe, die hy ontlaste, was hart, en als kleine keutels. Zonder hulp kon hy deeze niet kwyt worden. Nadat hy vrugteloos verlerhande middelen gebruikt had, raade men hem keukenzout, in water ontbonden, te drinken. Hy liet twee pond' daar van in vier pond' water smelten, en dronk dit in een half uur uit. Hy wierd terstond walagtig, voelde eene drukking op de maag, en raakte aan het braaken. By de vierde reize raakte hy veele wormen kwyt. Sommige waren aars-maaden, andere gelyk aan die, welke men in de darmen der paarden vindt, zoo groot, als een tarwe-korrel. Na eene hardlyvigheid van veertien dagen kreeg hy zes of zeven, stinkende, en met bloed vermengde, afgangen, waar mede een groot getal soortgelyke wormen geloosd wierden. Hy herhaalde zich weder, en nam den derden dag daarna eene gelyke gifte, met dezelfde uitwerking, waardoor
by

tels, wel gewreeven, en met lauwe, maar niet gekookte, melk vermengd (*w*).

Het beste middel egter is, dat men, in een' wel toegedeekten aarden pot, twee lood kwik-zilver, met een pond water zagties kookt, hetzelve met een weinig honig vermengt, en als een clysteer laat zetten. Word dit verscheide maalen herhaald, dan kan men verzekerd zyn, van deeze gasten bevryd te zullen worden.

De ronde wormen laaten zich zoo gemakkelijk niet

hy wederom wormen ontlaste, doch die dood waren. Hierna bevondt hy zich zeer wel, doch nam, om zeker te zyn, twee of drie dagen voor de nieuwe maan een half pond zout met een pond water. Had hy kleiner gifte genomen, hy zoude zoo hevig niet aangetast zyn, en egter hetzelfde oogmerk bereikt hebben.

(*w*) Clysteeren van tabaks-rook zyn mede zeer dienstig bevonden, om de aars-maaden uit het lighaam te dryven; *Medic. Obs. vol. 2. p. 307.* en dit stemt de Hr. ROSÉN in de laatste uitgaave ook toe. Clysteeren van melk, waarin worm-kruid, uijen, water-look en andere soortgelyke middelen gekookt zyn, heeft men ook met nut voorgeschreeven. Uit de zit-plaatse deezer wormen kan men genoegzaam oordeelen, dat de inwendige middelen weinig, maar de clysteeren zeer veel kracht op hen hebben: de *Alöe*, en de middelen, welke dezelve bevatten, worden egter ook van nut bevonden. Een aftreksel van tabak in water, en op deeze wyze gebruikt, heeft meer ongemak, dan nut, aangebragt by den Geneesheer, wiens geval HEBERDEN *Medic. Transact. vol. 1. p. 45.* beschryft.

niet verdryven. Als men voorneemens is dezelve aantetaften; dan moet men het volgende waarnemen: 1. Verkieft men daar toe het afneemen van de maan; 2. geeft men de genees-middelen nугteren in, alzoo de wormen gewoon zyn, op deezē tyd voedzel te neemen, en het voorneemen is, om hen in 't lighaam te brengen zulke dingen, waar van zy moeten sterven; 3. geeft men de genees-middelen in natuurlyk-warme melk, of in slappen mee, of in kwik-zilver-water; en kort voor dat zy ontlasting verwekken, laat men een clysteer zetten van een half of heel pond natuurlyk-warme melk, om dezelve verder na onderen te lokken; 4. moet de lyder 't geene hy inneemt, niet zelve bereiden, noch ruiken; want men is in 't algemeen van gedachten, dat de worm zich als dan verberge; 5. als men dezelve door inwendige middelen zoekt te verdryven; dan moet men kort te vooren geen uitwendig middel aanleggen, alzoo zy als dan wech kruipen. Word de lyder, kort na dat hy iet tegen de wormen ingenomen heeft, overvallen door eene hevige pyn op de eene of andere plaats in den buik, en door stuipen; dan is dit een teken, dat de wormen zich derwaarts begeeven hebben, en de darmen zoeken door te booren, men moet hen derhalve aanstonds van daar verdryven. Dit geschied, wanneer men de plaats besmeert met steen-olie (*petroleum*), of als men tusſchen dun linnen legt een maatig-warm koekje, bereid uit alsem-knoppen, knoflook, rogge-meel, en versche ossen-gal. 6. Moet zich de lyder, eenige dagen voor dat men de

de middelen tegen de wormen geeft, onthouden van melk-spyzen, en in tegendeel grove, harde, gezoute spyzen, soepen met uijen, peper-wortel, postelein, aangezette spyzen, en 's avonds te voeren een stuk haring eten, zonder daar op te drinken. Het eerste doet die werking, dat de wormen afgemat worden, zich dieper na beneden begeeven, en dus gemakkelijker kunnen uitgedreeven worden; en het laatste maakt, dat zy dies te begeeriger en in grooter quantiteit de genees-middelen inzuigen. Het poeder, waarvan ik meestentyds tegen deeze foort van wormen gebruik maake, word bereid op de volgende wyze:

℞. Sal. Martis Lond. gr. iv.

Sem. Santonic. gr. x.

Rad. Jalapp.

Mell. Sincer. aa. scr j.

M. F. P. Subtil.

Het poeder van de *Jalappa* moet altyd te voeren nauwkeurig met zuiker gewreeven worden.

Deeze gifte is voor een volwasfen mensch, en word, gelyk ik reeds gemeld hebbe, des morgens ingenomen. Kan de lyder gemakkelijk genees-middelen inneemen; dan laat ik op elk poeder vallen een' droppel overgehaalden olie van worm-kruid (*oleum Tanaceti*). Is hy van eene harde natuur; dan word de gifte van de Jalappe met vyf of tien grein' vermeerderd: maar is hy al te schielijk aangedaan, dan verminderd men de gifte van gemelde wortel.

wortel. Een kind neemt daarvan, op den eersten dag eenen kleinen thée-lepel vol. Volgt daarop geene merkelyke ontlasting; dan vermeerdert men de gifte, den volgenden dag, met eenen halven of geheelén thée-lepel, naar maate van 's kinds ouderdom. Wanneer het poeder begint te werken; dan drinkt men eene soep tusfchen elke ontlasting. Men gebruikt hetzelfde, met het begin, en op het einde van de afgaande maan, drie dagen na den anderen, en daarom kan men altoos in de Apotheek zes poeders laten bereiden. Drinkt men, geduurende deeze daagen, teffens één of meêr pond' kwik-zilverwater, dan gaan de wormen dies te beter wech. Hetzelve word, of op de reeds gezegde, of op de volgende wyze bereid:

R. Rad. Gramin. dr. ij.

Flaved. Cort. Aurant. dr. p.

Cinamom. alb. gr. vj.

Aq. fontan. ℥. viij.

M.

Dit kookt men, tot dat een vierde gedeelte daarvan verkookt is. Nadat men het heeft doorgedaan, giet men het op vier lood kwik-zilver, en laat het, geduurende de nagt, in eenen wel toegedekten aarden pot, maatig warm, staan. Des morgens giet men het water af, en mengt het met wat zuiveren honig, naar de fmaak van den lyder.

De thée van Hysfop word thans tegen de wormen sterk gepreezen. Eene Moeder bediende zich

II. DEEL.

F

van

van denzelven tegen den hoeft. Het kind kreeg daar van alle morgen mede eenige kopjes, 't welk van deeze nuttigheid was, dat het eene groote quantiteit wormen loosde.

Als de zieke geen poeder neemen kan; dan ben ik gewoon de volgende pillen voorteschryven:

Rx. Extract. Tanacet.

Semin. Santon. centus. aa. gr. vj.

Sal. Mart. Lond. gr. iv.

Resin. Jalapp. c. amygd. probe trit. gr. vj.

Ol. destill. Tanac. gt. j.

M. F. Pill. gr. ij. Fol. argent. obducendæ.

Deeze pillen zyn eene gifte voor een volwasfen mensch. Een kind kan, naar maate van de jaaren, daar van drie, vier tot vyf, pillen neemen.

Zy, die zoo wel poeders als pillen verdraagen kunnen, doen het best, als zy de pillen des avonds, en de poeders des morgens, gebruiken: Doch in dit geval laat men de harst van Jalappe uit de pillen, en dan zyn dezelve alleenlyk agt in getale.

Willen de kinderen, noch de pillen, noch het poeder, inneemen; dan laat men hen naerftig het bereidzel uit het seer-zaad (*confectio seminum santonici* (*)) gebruiken, of strooit hetzelfde
op

(*) In de Zweedsche Apotheeken vindt men tweederlyke soort van worm-zaaden; het eene is het *Semen Zedoariae*, het ander het *Semen Santonici*. Dit is zeer fyn

op een boterham, of op brood met honig besmeerd, en laat hen kwik-zilver-water drinken. Daar by geeft men hen fomtyds, twee ogtenden na elkander, eenen pap-lepel vol van het *Elixir Rhabarbari*. Konnen zy in 't geheel niets inneemen; dan binde men op derzelve maag den reeds beschreeven koek, en verschaft hen ontlasting door clystereen van melk.

Wanneer de ongemakken by de volgende verandering van de maan wederkwamen, en zoo het kind iets anders zoude kunnen inneemen; dan kan men drie of vier greinen Yzer-vitriool in twee spys-lepels water doen smelten, en een weinig honig daar by doen, en dit het kind alle morgen, nugteren, laten neemen, en daarop in de laatste dagen van de afgaande maan, twee morgen na elkander, het rhabarber-elixer, of dertig droppelen van het *elixir proprietatis cum aceto* van BOERHAAVE in mee of water met honig geeven. Dat de afgang 'er dan zwart uitziet, moet niemand verschrikken, want dit komt van het yzer. Men kan ook kleine

fyn en klein; doch met kleine steeltjes en gedeeltens van bladen zoodanig vermengd, dat, in eene gifte, zeer weinig van de zaaden is: Daarom houd de Lyfartz en Ridder v. LINNÉ voor goed, dat men in deszelfs plaatse het *Semen Abrotani Campestris* zou verzamelen en gebruiken. Ik hoope, dat deeze zoo gegronde raad door onze Apothekers gewillig zal opgevolgd worden. R.

In onze Apotheken heeft men alleen het seyer-zaad (*Semen Santonici*) S.

kleine pillen laten maaken van de duivels-drek, het yzer-vitriool, en een weinig honig; van welke, behoorlyk verzilvert, men een of twee reizen 's daags, twee of drie laat gebruiken. Op den laaften dag van de afgaande maan neemt men de genoemde droppelen, om daarna te laxeeren. De darmen worden dan door den sterken reuk, welke deeze middelen van zich geeven, vervult, en den wormen word het moeijelyk gemaakt zich in dezelve opthou'en. De pillen konnen met appel-moes, of iets diergelyks, gebruikt worden. Zie VAN SWIETEN *Comment. Tom. 4. pag. 733.* Wil men, in plaatse van de droppelen, buikzuiverende poeders geeven, dan wryft men twaalf, vyftien, of twintig greinen Jalappe zeer fyn met even veel zuiker, doet daar op een droppel caneel-olie, en deelt dit in twee deelen. Hier door verschaft men eene schielijke en goede onlasting.

BISSET pryft ongemeen, voornamentlyk tegen deeze soort van wormen de bladeren van de stinkende nies-wortel (*HELLEBORUS fetidus LINNÆI, Helleboraster maximus GESNERI*). Hy geeft van de gedroogde en gestoote bladeren aan een' volwasfenen vyftien greinen, of hy maakt uit het sap met zuiker een stroop, welke hy tot een dragme, of iets meer geeft (*).

De

(*) In het Hertogdom *Cleveland* hebben zich deeze bladeren vooral beroemt gemaakt (*BISSET's Essay on the medical constitution of Great-Brittain pag. 333.*). In Zwitserland, op eenige plaatsen van Duitsland, in Engeland, en

De Hr. BROWNE heeft reeds in 1757. in zyne Natuurlyke Historie van Jamaica eene plant, welke door LINNÆUS *Spigelia* genoemd word, als een on-
 verbeeterlyk middel tegen de wormengepreezen (*).

Hy en Vrankryk, groeit dit gewas in het wild. De gemeene man in *Cleveland* geeft de bladeren versch in water gekookt, aan kinderen van vyf tot zeven jaaren, tot een dragme, gedroogt tot vyftien greinen, en herhaalt dit twee, somtyds drie morgens, na elkanderen. Eene geheele gifte verwekt meestendeels braakingen, en dikwils een' geringen loop, beneevens eene groote benauwtheid, die egter, zoodra 'er braakingen opvolgen, ophoud. De schadelyke, en doodelyke uitwerkingen waar over COOK (*Oxford's Magazine for March. 1769. pag. 99.*) klaagd, zyn aan BISSET niet voorgekomen. Hy verkieft egter de stroop, uit het sap met zuiker; tot welk oogmerk hy de gekneusde bladeren met een weinig wyn-azyn bevoigtigd, om de werking te verzagten. Een thee-lepel vol des avonds, en een oft twee 's morgens, twee of drie dagen na elkander, maakt de gifte voor een kind van twee tot zes jaaren. In het vervolg heeft hy bevonden, dat het, om den afgang te bevorderen, raadzaamer is den stroop met een gelyke quantiteit *Tinct. rhab. vinos.* te vermengen. M.

(*) De nauwkeurigste beschryving en afbeelding heeft men te danken aan LINNÆUS, die dezelve *Spigelia antbelmia* noemt (*Amœnitat. Acad. vol. 5 p. 155.*). In Zuid-America groeit dezelve in het wild, doch word in Noord-America, vooral in Jamaica, in de tuinen geplant. PATRIK BROWNE heeft dezelve 't eerst in *Gentleman's Magazine* 1751. p. 544. als een middel tegen de wormen bekend gemaakt, spreekende van de uitwerkingen, welke dezelve gehad heeft, in eenige Engelsche Colonien in America in 1748. Na hem heeft

Hy laat daarom twee handen vol met twee pond water tot op de helft kooken. Nadat dit doorge-
daan

JOHN LINNING, Geneesheer te *Charleslown* in Zuid-Carolina, in een' brief aan ROBERT WHYTT, welke gedrukt is in *Essais and Observations Physical and Literary* 1754. Tom. 1. pag. 386., daar van gesproken. De laatste spreekt slegts van den wortel, die of in poeder tot twaalf greinen, of in een aftreksel met water tot twintig greinen, aan een kind van drie jaaren, eenige daagen na den anderen 'smorgens en 's avonds gegeven word. Doch volgens het berigt van BROWNE (*Natural Historie of Jamaica* 1756. pag. 156.) word, behalven de wortel, de geheele overige plant, het zy droog, of versch, gebruikt: Men heeft daarna ook in Europa, en vooral in Engeland, proeven daar mede genomen. BROCKLESBY (*Æconomical and medical Observations* pag. 282.) heeft het kruid benevens de wortel tot een dragme op vier oncen kookend water, waar van hy drie giften tien tot veertien dagen lang geeft, met nut voorgeschreeven, en berigt te gelyk, dat HINCKLEY twee dragmen van het kruit in zes oncen water laat trekken, WHYTT (*Observat. on nervous, hypochondriac, and hysterical disorders* p. 407.) heeft ook zelve de goede uitwerkingen ondervonden, doch houdt dit kruid in Engeland zwakker, dan in Zuid-Carolina, en waarschuwt daarom, het niet te lang te laten leggen. VAN SWIETEN (*Comment. Tom. 4. pag. 737.*) houdt de *Spigelia* zeer verdagt, dewyl dezelve, volgens de verzekering van een geloofwaardig mensch, zeer geweldig naar boven en naar onderen werkt. Behalven BROWNE verzekeren LINNING en BROCKLESBY, dat dezelve, in eene al te groote gifte, als *opium*, werkt, draaijngen in het hoofd, tegennatuurlyke be-
wee-

daan is, maakt hy den drank met een weinig citroenen-sap en zuiker aangenaam. Hier van laat hy den zieken, vier, zes tot agt loot, alle zesde of twaalfde uur, drie dagen lang drinken. Vervolgens geeft hy een buikzuiverend middel, waar door de wormen dan gezegd worden, uitgedreeven te worden. BROWNE verzekerd, dat deeze drank slaap verwekt, even als het *opium*; doch dat de lyder, ontwakende, vrolyk is, en zyne oogen wel staan. In Rusland heeft een Geneesheer dit middel met vrugt gebruikt. Ik heb het den Hooggel: Hr. BERGIUS (x) hooren roemen, en de Hr. DAHL-

BERG

weegingen, slaap, en voortgelyke toevallen verwekt. M.

Breedvoerig heb ik by eene andere gelegenheid over dit middel gehandeld in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek II. D. pag. 604.

(x) De Hr BERGIUS verhaalt in zyne uitmuntende *Materia medica e Regno Vegetabili* Tom. 1. pag 95., dat hy een meisje van tien jaaren in een' zeer diepen slaap gezien heeft, door het gebruik van eene al te groote gifte van de *Spigelia*. Men had twee oncen daarvan in twee pond water tot op de helft gekookt; en van dit afkookfel had het kind eerst twee oncen, en vervolgens een once, alle zesde uur gebruikt. Na zes-en dertig uren vondt hy haar in een' zeer diepen slaap; de oogleden waren zoo verslapt, dat zy ver beneden de oog-holte hingen, konnende niet, dan met de vingers, opgeligt worden; de oog-appel was zeer verwyderd; doch deeze toevallen verdweenen van zelve, zoodra de slaap verminderde. Hy heeft geweldige stuipen door de *Spigelia* ge-

BERG pryft hêt insgelyks zeer in een' brief, daar over aan my geschreeven. Hy maakt gewag van eene vrouw, die door wormen en benauwtheden zeer geplaagd was. Door middel van de *Spigelia*, en buikzuiverende middelen, raakte zy dertien ronde wormen kwyt. Hy geeft deeze plant in poeder tot twintig greinen, twee of drie maalen 's daags, en in een aftreksel van één, twee, of drie dragmen, binnen denzelfden tyd. Op deeze wyze laat hy de zieken veertien dagen voortgaan, en geeft elken derden of vierden dag een buikzuiverend middel. Volgens zyne verzekering heeft het middel in deeze gifte noch slaap verwekt, noch eenig ander ongemak veroorzaakt. Ik heb de kinderen dikwils met groot voordeel een tinctuur uit twee loot gestooten worm-zaad, waar op een pond overgehaalde brande-wyn gegooten wierd, laten gebruiken. Nadat dit eenige dagen gestaan had, wierd het doorgedaan, en vervolgens met het geeftrykste gedeelte afgetrokken. Hier in laat ik een weinig zuiver *sal maris* doen, en geef daar van een pap-lepel vol, alle morgen, zoo lang de maan aan het afneemen is, en op de twee laatste dagen buikzuiverende middelen uit de Jalappe op de reeds aangehaalde wyze.

De Heer F. G. FISCHER roemt zeer een met water bereid extract uit onrype wal-nooten, 't welk,
 zoo

neezen gezien, schoon men niet ontdekt hebbe, dat 'er wormen ontlafst zyn. Zeer dikwils heeft hy dit middel voorgeschreeven, zonder ooit de buikzuiverende kragt, van welke sommige gewag maaken, waartneemen.

zoo hy zegt, de gemeene aard-wormen binnen twee minuuten doodt. Hy ontbind twee dragmen van dit extract in vier dragmen kaneel-water, en geeft daarvan aan een kind van twee tot drie jaar' vyftig droppelen. Na verloop van zes of agt dagen geeft hy een laxeer-middel met kwik.

De Heer DE LILLE pryft, in zyn werk over de hart-kloppingen, vooral een drankje, welk bereid word uit een scrupel van het extract uit het zwarte nies-kruid (*Extractum Hellebori nigri*) en een half scrupel van het *Vitriolum maris*, 't welk men ontbindt in twee lood *Aqua cardui benedicti*, en met een weinig, by voorbeeld een dragme, strop van vioolen of honig zoet maakt. Aan een kind mag men daar van een' thee-lepel vol op eene nugtere maag geeven.

De Knoflook is ook een goed huismiddel tegen de wormen, ten zy men daar aan gewoon is. Men kan op een nugtere maag twee of drie stukken, in de lengte doorgesneeden, gebruiken, of met een boterham eeten, of klein gesneeden in melk nemen. Verscheide kinderen zyn ook van de wormen verlost door twee, vier, of zes, spys-lepels vol pekkel van boter. Zoo zy daar mede eenige dagen na den anderen voortgegaan zyn, zyn daar door sterke afgangen verwekt, en wormen afgedreeven. Versche peen dryft de wormen ook af, als de kinderen daar van zoo veel eeten, tot dat zy aan den afgang raaken.

De wormen door een der genoemde middelen afgedreeven zynde; dan moet men verscheide-maa-

len, als de maan begint aftegaan, op de zelfde wyze voortgaan, ten einde niets van dit ongedierte, of van deszelfs eijeren, te rug blyve.

Voorts moet men ook trachten; aan de maag en darmen haar voorige kragten wedertegeeven: Met dit oogmerk laat men kinderen, eenige weeken lang, dertig, veertig, tot zestig droppelen van het Edenburgsche bittere aftreksel van Rhabarber (*Tinctura Rhei amara*), met wyn bereid, inneemen. Wanneer dit niet voldoende is; dan laat ik hen, eenige weeken lang, dezelfde gifte van den staal-wyn, volgens de Londensche Apotheek bereid (*vinum chalybeatum Lond.*), gebruiken.

Word iemand door de wormen aangetaft, terwyl hy aan eene heete ziekte ter neder ligt; dan laat ik hem kwik-zilver-water drinken, waar by gevoegt word, in plaats van honig, de stroop van citroenen (*Syrupus Acetostatis citri*), zoo veel als vereischt word, om hetzelfde smaakelyk en dorstlesschende te maaken; of ik laat hem drinken thee met citroenen-sap, of citroenen-marmelade. Men kan ook, in plaats van dit, twee deelen boomolie, een deel citroenen-sap, neevens een deel gestooten zuiker, samen roeren, en hetzelfde, vier-of-vyf-maal daags, lepels-wyze inneemen: Ik laat ook somtyds in den gewoonen drank een weinig van het aftreksel van vioolen (*Tinctura Violarum*), droppelen, zoo dat de drank eenigzins zuur daar van worde: daar en boven laat ik op de maag leggen den reeds aangepreezen koek van alfem, osfengal &c. Dewyl de wormen den campher niet verdraag

gen kunnen, en deeze, zoo wel als de azyn, in heete ziekten van nut is; zoo is, in zulke gevallen, zeer goed een drank, die een dragme campher bevat, welken men in eenen steenen mortier met vyftien droppelen brandewyn bevoegtigt, en vervolgens tot poeder wryft; 't welk daarna met vier lood fyngeftooten zuiker vermengd, en dan ontbonden word in tien oncen goeden wyn-azyn, waar van de lyder eenen spys-lepel vol, alle uur of alle twee uren, inneemt.

Het moeiljkste is, den lint-worm geheel en al afgedryven. De reden daarvan ligt, deels in deszelfs lengte, en in de veele kromtens der darmen, deels in het vermogen, welk hy, nog leevende, bezit, om zich aan de darmen met de punt van het smalle einde, en met de mondjes, die hy aan elk lid heeft, vast te hegten. Dit is de oorzaak, waarom de lyder zoo hard aangetaft word, als men beezig is, deezen worm afgedryven. Was ons een middel bekend, dat hem kon dooden, zonder de maag en darmen te beledigen; dan was het ligt gevonden; want als hy dood is, dan kan hy zich, noch met de punt, noch met de mondjes, vast-hegten, maar hy legt los, en word met den afgang geloosd: Dan, zulk een middel bezitten wy niet.

Ik heb reeds gezegd, dat hy zich in een kommetje beweegt, als men hem met warm water begiet, doch dat hy in een ogenblik op den grond valt, en als dood ligt, wanneer men koud water op hem giet. Hierdoor kwam ik tot de gedagte, dat ik hem mogelyk wel zou kunnen verdryven,
als

als ik den lyder een purgeer-middel gaf, en hem; zoodra dit zyne werking stond te verrigten, eene meenigte koud water liet drinken. Ik vermoedde, dat het koude water hem geheelyk het vermogen zou beneemen, om zyn smal einde te beweegen, en de mondjes op zyde uittefteeken, en gevolgelyk ook berooven van de kragt, om zich vast te houden; en dat hy als dan te gelyk door het purgeer-middel zou kunnen uitgedreeven worden. Deeze gedagte deelde ik mede aan den Heere *Aifesfor* DARELIUS, die toen van de Geneeskundige Faculteit te Upsala aangesteld was, om zorge te draagen voor de arme zieken, welke, op kosten van wylen den Bisschop D. KALSENIUS, by de Sättra-bron onderhouden worden; en verzocht hem, zich eene gelegenheid daartoe opdoende, te willen onderzoeken, of myne meening gegrond ware. Twee weken daarna zondt my die Heer een' geheelen lint-worm van zeventien ellen lang, waar van hy, op deeze wyze, een arm meisje verloft had. Deszelfs smalle gedeelte was nog onbeschadigd, en aan het uiteinde ontdekte men eene kleine punt met vier openingen aan de zyden, welke men toen duidelyk met het microscop van CUFF waarnam, en die nog tegeer woordig met bloote oogen konden gezien worden; want men bewaart hem nog onder de verzamelingen van het gaff-huis te Upsala. Dezelfde Heer dreef 'er nog meêr by andere zieken af, en bediende zich van geen ander purgeer-middel, dan van het poeder van Jalappe des morgens, en van het algemeen buik-openend afstreeksel (*Tindura Catholica purgans*)

gans) (*), van D. ROTHEN des namiddags. Op deze zelfde wyze heeft de Heer LINDHULT verschei-

(*) Dit algemeen buik-openend aftreksel vindt men beschreeven in des Uitvinders *Gründliche Anleitung zur Chymie 6te. Aufl: p. 136.* op de volgende wyze:

℞. Rad. Jalapp unc. iv.
Semin. Charthm. unc. ij.
Scammon. opt unc. β.
Gumm guss. dr. ij.

Dit grof gestooten zynde, giet men 'er op eene of ander halve pint brande-wyn, dien men op citroenen schillen, of op iet diergelyks, dat wel ruikt, gerectificeerd heeft. Voorts laat men het trekken; en als de brande-wyn eene roode kleur heeft aangenomen, dan giet men dien 'er af, doet 'er op nieuws by eene halve pint of meer brande-wyn, en laat het insgelyks trekken. De aftreksels giet men daarna by malkander, en haalt 'er omtrent een derde gedeelte brande-wyn wederom af. LOESEKE (*auserlesensle Arzneymittel pag. 139.*) noemt deze Tinctuur *Elixir purgans MICHAËLIS*, en geeft eene andere bereiding daar van op. Daar dezelve de *gummi gussa* bevat, en men uit nieuwe proeven de kragten van dit middel geleert heeft, mag men ook stellen, dat dit middel niet alleen als een buikzuiverend werkt. WERLHOFF maakte van deze *gummi gussa*, met goed gevolg, gebruik tegen den lint-worm. KALTSCHMIED (*Progr. de tania Nat. en Geneesk: Bibl. V. D p. 820.*) maakt melding van deszelfs kragten, en BINNET is ten aanzien van het gebruik van de *gummi gussa* zeer breedvoerig. Hy gaf dezelve aan een scheeps-

Ka-

scheiden hersteld, toen hy het opzigt by de bron had: gelyk ook de Heer SIDRE'N, die naderhand het opzigt over dezelve gehad heeft. Was het mogelijk, dat het water in de maag en darmen een half of heel uur zyne koude kon behouden; of was het doenlyk, den tyd zoo af te meeten, dat het wáter gedronken wierd, even voor dat het purgeer-middel zyne volkome werking verrigt, en het aanstonds uit de maag in de darmen liep; dan zou dit middel nooit misfen. Doch dewyl dit niet altyd geschieden kan; zoo moet men deeze genees-wyze verscheide maalen herhaalen, en men kan tamelyk veel staat maaken, dat de moeite in deezen niet te vergeefs zyn zal (y).

By

Kapitein, eerst tot vyftien grein', met het extract van de gentiaan, in drie pillen, waar van 'er twee 's avonds en een 'smorgens genomen wierden, en vervolgens, na onderseheide tuschenruimten van een, twee, ofmeêr dagen, tot twintig grein', in gelyke deelen, op dezelfde tyden. Groote stukken vanden lint-worm, en veele kauwoers-wormen wierden daardoor ontlafst. By het gebruik raad by zoo lange in het bed te blyven, tot dat 'er ontlafsting komt, dewyl anders by het opstaan of zitten ligtelyk braakingen volgen. Hy schat dezelve tegen de ronde wormen, by volwasfen menschen, ook zeer hoog. Het middel van HERRENSCHWAND bevat ook, gelyk in het vervolg blyken zal, de *gummi guttae*. M.

(y) Dit zelfde middel word ook met vrugt tegen andere wormen gebruikt, zeer dikwils heb ik daar van voortreffelyke uitwerkingen gezien. De Hr. VAN DEN BOSCH

By de bron gaat men op de volgende wyze te werk: De lyder, die den lint-worm heeft, en tot de bron komt, rust, na de reize, eenen dag, neemt daarop, volgens gewoonte, een purgeer-middel, en drinkt het mineraal-water des morgens, zegen of agt dagen lang. Wanneer hy zich dus gewend heeft, het koude water te verdraagen; dan neemt hy des morgens vroegtydig een laxeer-middel in, by voorbeeld, een half dragme of twee scrupels Jalappe, of twee tot drie lood *Sal de Scignetto*. Wanneer hy bespeurt, dat het middel begint te werken; dan drinkt hy een glas mineraal-water, en gaat daar mede voort alle drie, vier, of vyf minuten, zonder op te tellen, of hy eene, anderhalve, of twee kannen drinkt; want, vermits hetzelfde aanstonds met den afgang wederom wech gaat, zoo kan de menigte niet bezwaaren. Men moet egter niet schieliker drinken, alzo het water niet zoo ras uit de maag in de darmen zakt. Gaat de worm aldaan geheel en al wech, en bespeurt men verder geene tekenen van denzelven; dan is de geneezing volbragt. Doch word niets, of slegts een gedeelte daar van ontlast; dan gaat men den volgenden dag met hetzelfde middel, en op dezelfde wyze, voort, en neemt, zulks noodig zynde, des namiddags zestig tot honderd droppelen van

Ro-

BOSCH *Hist: constit: epidem: verm: p: 352.* bevestigt dit insgelyks, en toont, dat veele, na het gebruik van een buikzuiverend middel, met voordeel veel koud water daar op gedronken hebben.

ROTHENS genoemde aftreksel, gemengd met een' lepel - vol stroop van Rhyn-bezien (*Syrupus e Spina cervina*). Gaat de worm ook dan niet wech; 't geen egter zelden mist; dan rust de lyder een paar dagen, en drinkt alleenlyk des morgens zyne gewoone quantiteit water; doch begint wederom met dezelfde middelen, insgelyks twee ogtenden na elkander: Op deeze wyze gaat men geduurende de geheele bron-cuur voort, tot dat men geneezen is.

Zekere Juffrouw, die, uit hoofde haarer ongemakken van den lint-worm, my om raad vroeg, heeft, op myn verzoek, eene beschryving van haare toevallen opgesteld; en, dewyl dezelve deels bevestigd het geene ik reeds gemeld hebbe, deels mededeelt verscheide nuttige aanmerkingen; zoo zal ik haare eigene woorden hier inlaschen.

„ Myne ouderen hebben my verhaald, dat ik in myne kindsheid door wormen geplaagt geweest ben; doch ik weet my niet, te binnen te brengen, ziekelyk geweest te zyn voor den jaare 1749, wanneer ik twintig jaar' oud was. Gy weet, myn Heer, dat het toen ter tyd eene algemeene mode was, om bitter-water te drinken. Ik dronk het zelve ook, zonder dat ik weet waarom, of het moest geschied zyn voor de lever-vlakken. Drie of vier weeken daarna kreeg ik eene heete ziekte met sterke stuipen. De koorts hieldt op; doch de stuipen taltten my, het geheele jaar door, nu en dan aan. Op niets minder, dan op eenen lint-worm, zoude ik toen ter tyd gedacht hebben. Ik herinnere my.

my ook niet, welke genees-middelen ik gebruikte. In den jaare 1741. in de lente, schreeft gy my voor, wey met het uitgeperste sap van de water-kers (*Becabunga*) en het lepel-blad (*Cochlearia*): Ik dronk daar van vyf of zes weeken lang, en wierd merkelyk beter, ja, voor eenigen jaaren, volkomen gezond. In den jaare 1747. in den zomer, gebruikte ik de gezond-bron in de dier-gaarde, zonder daar toe door eene ziekte aangespoord te zyn geworden: Ik bekenne ook, dat ik dezelve zonder eenige orde en levenswyze gebruikt hebbe. Vier weeken daarna dronk ik, by geval, een glas moezel-wyn, die eenigzins muf en onaangenaam was. Ik bevond my daarop aanstonds niet wel, en viel, een uur daarna, in eene flauwte. De volgende nacht gevoelde ik smerten rondom den navel, en eene ysslyke pyn wat hooger onder den mond van de maag, het welk wel ophieldt, doch, by beurten, in vyf dagen wederkwam. Des besloot ik, uit eigen beweging, een laxeer-middel in te neemen; en uit hoofde van 't geene gy my van ROTHENS' algemeen buik-openend aftreksel gezegt had, nam ik hetzelfde in eene dubbelde gifte met eenen stroop vermengd, en wel op eenen dag; wanneer de aanvallen het hevigste waren. Een uur daarna werkte hetzelfde zeer sterk, en op het einde kwamen te voorschyn vyf ellen van eenen lint-worm, die de eerste was, dien ik gezien heb, en aan u overzond. Daarna hielden de pynen op, zoodat ik met rust liggen kon; doch ik gevoelde eene sterke vermoedheid. In den jaare 1748. gebruikte ik, tien weeken lang, de

Normals-bron, wanneer ik dikwils stukken van den lint-worm loosde, hoewel nooit, zonder des morgens eene gifte van het genoemde purgeer-middel ingenomen te hebben. Hetzelve veroorzaakte zekerlyk niet meer zoo veele ongemakken, als de eerstemaal, dewyl het koude water den worm waarschyndelyk eenigzins afgemat had. Wanneer ik dit, of enig ander, purgeer-middel gebruike, moet ik my zeer in acht neemen voor het braaken: Ik verhoede hetzelve hier door, wanneer ik alsdan alles koud eete en drinke. Op die dagen, wanneer ik onder de bron-cuur laxeerde, dronk ik van het mineraal-water, buiten de gewoone portie, den geheelen voormiddag, en zoo lange als het middel werkte, waarop ik my wel bevondt. In den zomer wierd ik verloft van twintig ellen van den lint-worm. Van dit zelfde purgeer-middel bediende ik my vervolgens gedurende den geheelen tyd, dat ik door den worm geplagd wierd; doch eindelyk voerde hetzelve even weinig tegen denzelven uit, als het *Pulvis Cornachinus*. Gy raadde my daarom aan, des avonds tien tot twaalf druppelen van het *Oleum animale DIPPELII*, en den volgenden morgen een laxeer-middel te neemen. Deezen raad volgde ik, nu en dan, gedurende twee jaar, met dit voordeel, dat telkens een gedeelte van den worm wech ging: maar als ik eens het *Oleum* verzuimde; dan raakte ik niets kwyt. Eindelyk stondt my deeze olie zoodanig tegen, dat ik hem niet langer gebruiken kon. In den jaare 1753. nam ik my voor, den worm met allen erut by den Normals-bron te vervolgen.

Des

Des nam ik alle avond het zeever-zaad (*Semen Cinese*), welk ik, in de eerste agt dagen, met een weinig bloem van zwavel vermengde. Dit laatste moest ik naderhand wechlaaten, alzoo hetzelve hitte en onrustigheid des nagts veroorzaakte; schoon ik waarnam, dat het tegen den worm van nut was, alzoo hy, gelyk ik ondervondt, telkens daar door verontrust wierd. Om den derden dag nam ik des morgens een laxeer-middel, dan het *Pulvis Cornachinus*, dan het *Sal de Seignette*; maar van het laatste had ik de beste werking. Ik had, door de ondervinding in de voorige jaaren, de regte gifte leeren afmeetten; want het is opmerkenswaardig, dat, als ik dezelve te groot of te dikwils nam, geen worm afgedreeven wierd. Het water had altoos twee dagen noodig, om hem af te matten, of mischien dieper in de darmen na onderen te spoelen. Om den derden dag s'morgens bediende ik my, gelyk boven gezegd is, van een laxeer-middel, en dronk kort daarop twaalf tot veertien pond' koud water. Het mislukte my nooit, een gedeelte op deeze wyze uit te dryven. Op de dagen, als ik het laxeer-middel niet gebruikte, dronk ik slegts zes pond'.

Ik zette dit vyf weeken lang voort, en wel met dit gevolg, dat ik my van tagtig ellen ontlaste. Het langste stuk, dat ik op eenmaal loosde, was van twintig ellen. Daarenboven scheen een gedeelte van den worm in slym te vergaan, alzoo ik, in het geene ik somtyds loosde, duidelyk den rand van den worm zag. Dan, deeze Cuur taste my zoo gevoe-

lig aan, dat ik, schoon vier-maal's daags eetende, egter zeer mager wierd, en zoodanig in krachten verminderde, dat ik my in langen tyd niet kon herhaalen. In den jaare 1754. bediende ik my wederom van deezen bron, en van de genoemde middelen; doch ik nam flegts eens ter weeke een purgeer-middel, waar door telkens eenige ellen van den lint-worm afgedreeven wierden, doch die ik toen ter tyd verzuimde te meeten.

Naderhand bevondt ik my eenige jaaren lang tamelyk gezond, doch naardien gy, myn Heer, my, by gelegenheid, te verftaan gegeven had, dat ik niet eerder vry zou zyn, voor dat de worm met zyn fmalle einde zoude afgedreeven zyn; zoo befloot ik in den jaare 1758. de bron weder te gebruiken. Ik reisde na het land, en dronk fontein-water, welk, volgens genoomen proeven, gelyk men verzekerde, ten aanzien van de koude, het mineraal-water van Norrmalm zeer naby was. Vermits ik daar van eene verftopping kreeg; zoo dronk ik fomtyds twee of drie glaazen bitter-water, en gebruikte mede twee maal myn voorheen genoemd purgeer-middel; doch toen loosde ik geen worm. Of het water daaraan fchuld geweest zy, dan of iks hetzelfde niet koud genoeg gedronken hebbe, of dat ik de oorzaak moet zoeken hierin, dat ik des avonds het zeever-zaad niet innam, weet ik niet. Doch in den herft begon de worm, die eenen tyd-lang zich genoegzaam ftil gehouden had, nieuwe ongemakken te verwekken. Hy plaagde my byna dagelyks, dan meerder, dan minder.

De

De ongemakken bestaan meestendeels hierin , dat ik des voormiddags, als ware het, door eene benauwdheid onder den mond van de maag, en eene knelling boven de maag, aangedaan worde, die zoo sterk de overhand neemt, dat het koude zweet langs myn aangezicht loopt, en ik in flauwte meene te vallen; waartoe het egter niet komt. Meestentijds duurt dit niet lange; maar het komt schielijk weder. Het hield egter eens in den herfit langer dan veertien dagen aan, zoo dat ik daarvan zelfs des nagts ontwaakte. Thans heb ik voorgenomen, de tyd gunstig daartoe zynde, dezelfde middelen, als in den jaare 1753., te gebruiken; en ik hoope hem daar door geheel en al te zullen kunnen overmeesteren. Op Uw verzoek voege ik hier nog by eene en andere door my bemerkte omstandigheid.

Wanneer ik des morgens uit het warme bed kome; dan moet ik my zeer in acht nemen, dat myn rug niet koud worde; anders gevoele ik aanstonds eene pijn om den navel, die my doet krommen, zoo dat ik my onmoogelyk regt op houden kan: Hier by komt nog eene grilling over den rugge. Dit een uur en langer aangehouden hebbende, dan gaat het over in den loop; en daarna houdt het gemeenelyk voor ditmaal op, doch komt somtyds meermaalen des daags weder, en is altyd hetzelfde. Somtyds verwisfelt het geduurende eenige dagen op deeze wyze: Maar ik ben gewoon, het aanstonds in den beginne, gelegenheid hebbende, hier door te stillen, dat ik my ten eersten weder na bed begeeve, wanneer de pijn gemeenlyk zonder

den loop eindigt. Ik legge in dit geval een of anderhalf uur lang, tot dat ik weder warm geworden ben, en dan ben ik bykans verzekerd, den geheelen dag vry te zullen zyn. Even eens gaat het my, als ik melk of iet zoets ecte. Des voormiddags plaagt my de worm het meeste: Ontgaa ik voor dien tyd de ongemakken, dan ben ik het overige van den dag vry. Ik heb dikwils gemeend, de oorzaak daarvan deeze geweest te zyn, om dat ik somtyds geaft had, maar ik heb my in deezen bedroogen. Als de worm lust heeft my te plaagen; dan helpt my het eeten niet: Ik heb egter meesten-tyds het vasten vermyd, omdat hy my anders door zyn zuigen bezwaarlyk valt. Op het einde van de donkere, en met het begin van de nieuwe maan, plaagt hy my het meest: Van de geenes-middelen heb ik eenerleye werking bespeurt, of ik dezelve op den eersten, dan op den laaften, tyd ingenomen had. Hy kwelt my niet minder op die tyden, die voor myn geslachte ongelegen zyn. Vleesch-spyzen bekomen my het best, voornamentlyk des avonds. Gebruike ik des avonds geen vleesch, maar andere zagte spyzen, dan worde ik te middernagt door een zoo sterk gezuig onder de borst opgewekt, dat ik dikwils denke flauw te zullen worden, en dan is het, als of ik in 't geheel niets gegeten had; ik kan egter niets gebruiken, maar verdryve de toevallen door een glas versh bier. Ik heb raadzaam gevonden, de melk te vermyden: wanneer ik, naar eene onthouding van zes jaar', dezelve by geval maar proefde, bekwam zy my altyd kwalyk. In de jaaren, wan-

neer

neer ik meende van den worm geheel vry te zyn, begon ik weder melk-spyzen te eeten, zonder ongemakken daarvan te bespeuren, tot in den jaare 1759, wanneer ik op nieuws door denzelfen veront-ruft wierd: Van dien tyd af aan heb ik my weder van de melk onthouden. Ik vreeze, dat dezelve hem eenen nieuwen wasdom, en nieuwe kragten zal gegeeven hebben. Gedroogden visch, voornamentlyk als hy in loog gelegen heeft, bekomt my kwaalyk. Somtyds ben ik door den reuk van de loog misfelyk geworden. Alle zoogenaamde magtige spyzen zyn my nadeelig, als mede zulke, die met zuiker vermengd, zoet, of ingemaakt zyn. Zoete wyn verwekt by my insgelyks eene kwalykheid, als mede zoete kock. Thé, koffy, gezoute en gerookte spyzen, zyn my; 't geen iet zeldzaams schynt te zyn; niet kwalyk bekomen, ja, zelfs geene kost met uijen; brood, in soep, koude-schaal, of thé geweekt, is my nadeelig; ik moet het altyd droog eeten.

Door het bitter-water ben ik nooit iet van den worm kwyt geraakt, schoon ik in den jaare 1750. daarvan eene groote quantiteit dronk. Die soort van wormen, welke na het zaad van komkommers gelyken, heb ik nooit zien afgaan, maar wel geheel kleine wormen met roode koppen, waarvan ik, in een jaar, eene groote meenigte waarnam. Deeze wierden niet verdreeven door laxeer-middelen, maar door een lavement. De maag zwelt by my niet, en trekt zich ook niet in, maar word hard, wanneer de worm zich boven-waarts ophoudt, en

Ik des voormiddags, door myn eigen toedoen, of anderzins, een' aanval kryge: Alsdan moet ik alles aan het lyf en de borst los hebben, ja zelfs myn hals-ciersel afneemen. Alle laxeer-middelen tasten my sterk aan, veroorzaaken heevige pynen en spanningen, die ik aan de beweging van den worm toeschryve. Gemeenelyk verwekken dezelve eene misfelykheid; doch zelden komt het tot braaken: Volgt dit egter; dan houdt het evenwel op, zoo dra het purgeer-middel begint te werken. Ik heb in deeze omstandigheid somtyds gedacht, dat de worm boven uit komen zoude; doch ben het telkens te keer gegaan door eene teuge versh water te drinken. Het worm-zaad is geenzins nadeelig; maar ik kome veel eer daar door tot rust. Misschien vlugt de worm voor hetzelve, en begeeft zich verder na beneden. Gy begeert mede te weten, myn Heer, hoe het met my gesteld is, wanneer de worm afgaat. Zonder hulpe van een laxeer-middel heb ik nooit eenen geloofd: Hetzelve ingenoomen hebbende, bemerkte ik, hoe de worm zich boven aan den mond van de maag, of naby denzelfven ophoudt, en dan ondervinde ik de reeds gemelde knelling. Komt het naderhand 'er toe, dat hy staat afgedreeven te worden; dan kruipt hy nederwaarts; en hoe verder hy afzakt, dies te meer neemen de pynen in den buik, en de koude in den rugge beneden-waerts, toe. Het schynt my mede toe, bemerkte te hebben, hoe hy als ware het tegenstand biedt, en niet wech wil, zelfs zoo, dat hy schynt zich vast te houden; 't geen veel gemak-

makken veroorzaakt. Dan niet minder groot is de verligting, wanneer hy te voorschyn komt, alsdan gevoele ik eene koude in den endel-darm. Het gedeelte van den worm, dat 't eerst te voorschyn komt, is niet glad, maar ziet uit, als of het aangebeeten ware, en is nooit zoo gaaf, als het einde, dat naderhand afgescheurd word, 't welk gemeenelyk regt aan eene geleeding geschiedt. Met het gedeelte, dat zich 't eerst vertoont, moet, van het overige, uitgetrokken worden, zo veel als mogelijk is, en daar by blyft het voor ditmaal; want, by de andere ontlastingen op dien dag, komt verder niets te voorschyn. Grypt men den worm niet aanstonds, en haalt men hem niet voorzichtig voor den dag; dan trekt hy zich weder te rug. Als men verder niets uittrekken kan, dan gevoele ik in den rugge eene soort van tegenstand en beweeging, wanneer hy afgebrooken word ”.

De besluiten, hieruit te trekken, volgen van zelve: Des zal ik alleenlyk herinneren, dat deeze worm geweest zy van die soort, welke mondjes aan de zyden heeft, en dat hy de breedste is, dien ik ooit gezien hebbe.

Hoe meer en grooter stukken men kwyt raakt; des te minder ongemakken bespeurt men van het geen in het lighaam blyft, en zy, die veele ellen op eens kwytraaken, hebben dikwils jaaren lang geen ongemak bespeurt.

Heeft men geene gelegenheid, het opgegeeven middel te gebruiken; dan moet men het zoo bestu-

ren, dat de worm in de darmen zich verder nederwaerts begeeve, en tragten hem af te matten. Het eerste maakt, dat de weg, om hem af te dryven, korter word. Het laatste vermindert zyn vermogen, om zich vast te houden.

Ik weet door ondervindinge, dat deeze worm geen gezouten of gerookt vleeſch, ham, gerookte ſalm, zuur-kool, ſpyzen met uijen, of peper-wortel, zoete-koek, of zuuren wyn, verdraagen kan. Ook zyn hem tegen, uijen, duivels-drek, het zee-ver-zaad, bloem van zwavel, middelen, uit yzer bereid, het extract van Alſem, en hy begeeft zich daarvan verder na beneden in de darmen. Eet en drinkt men, geduurende eenige dagen, niet anders, dan ſoortgelyke dingen; dan moet hy mede door den honger afgemat worden. Neemt men dan teſſens middelen in, die hy niet verdraagen kan, en daarop een purgeer-middel, waardoor hy, of in eene ſterke beweeging gebragt, of genoodzaakt word, zich met alle magt vast te houden, dan moet hy vermoeid worden. En dit is de reden, waarom men, twee dagen na elkander, laxeer-middelen inneemen moet, wanneer hy zal afgedreeven worden, want op den eerſten dag is hy nog in ſtaat zich vast te houden, doch op den tweeden is hy door den arbeid verzwakt, en moet gevolglyk mede geeven. Kon de lyder het uithouden, een purgeer-middel des morgens, en een ander des middags te neemen; dan was het zoo veel te beeter, alzo de worm alſdan geen tyd hebben zou, zich te herhaalen.

Hy,

Hy, die zich na deeze regelen wil laaten helpen, verkieft

1. daartoe het afneemen van de maan.
2. Gebruikt, twee dagen lang, geen ander eeten noch drinken, dan 't geene boven gemeld is.
3. Bedient zich op denzelfden dag, alle twee of drie uren, van tien stuks van de volgende pillen:

Rx. Extract. Tanacet.

Asse fetida.

Sem. Santon. aa. dr. ʒ. ʒ. gr. vj.

Vitriol. Martis. gr. xij.

Mell. sincer. q. ʒ.

M. F. Pilul. pond. gr. j. fol. argent. obd.

D.

Met deeze pillen gaat men voort, tot dat men eene verligting onder de borst, en, daarentegen pyn in den buik, en eene geringe koude in den rugge, bespeurt: Want dit is een teken, dat de worm zich na onderen begeeven heeft. Alsdan en

4. moet men hem aanstonds zoeken afgedryven, 't welk geschieden kan door de Jalappe.

Aan een kind van agt of negen jaaren geeft men twaalf, vyftien tot twintig grein', op eens, naar maate van deszelfs kragten. Dezelve moet zorgvuldig met zuiker gewreeven worden. Den volgende dag geeft men dezelfde gifte, en, zoo dezelve dan te zwak geweest is, kan men dezelve vermeerderen. Tusschen elke ontlasting drinkt men een

een glas koud water. Een volwassene verdraagt eene dubbele gifte.

Het poeder van HERRENSCHWAND is, veele jaaren lang, als een zeker middel tegen den lint-worm, aangezien. Zelden mislukt het ook. De bereiding is onbekent geweest. Thans heeft hy dezelve ontdekt, en men weet, dat het zwakker en sterker kan gemaakt worden. Het word bereid uit vyftien, twintig, tot dertig greinen Vaaren-kruid (*Filix*), een tot vyf greinen *gummi gutta*, en vyf tot twaalf greinen *gratiola* (*). Drie zulke poeders moeten 'er gereed zyn. Daags, voor dat zy gebruikt worden, geeft hy den *mercurius dulcis* en *diagrydium sulphuratum*, van elk tien greinen. Den volgenden dag neemt men 's morgens een poeder, welk doorgaans braakingen verwekt, en te gelyk afgangen. Twee uren daarna het tweede, welk een sterke afgang veroorzaakt, en daar mede komt de

(*) Waarschynelyk is deeze bereiding overgenomen uit ANDRÉE Diff. de tania Groningæ 1769 (Nat en Geneesk. Bibl. VI. D. pag. 554,) HERRENSCHWAND zelve heeft, wanneer hy door Göttingen reisde, aan een Geneesheer, thans reeds overleden, gezegd, dat zyn poeder uit tien tot vyftien greinen *gummi gutta*, en vyftien tot twintig greinen gecrystalliseert zout van Alfembestondt. Dit was eene gifte voor een volwasenen, welke doorgaans braakingen en afgangen verwekte. Alle twee uren wierd eene gifte gegeven, tot dat de worm onlast wierd. VOGEL zegt (*Prælect. de cogn. & cur. morbis* pag. 652.) dat hierby nog houts-koolen komen. M.

de worm doorgaans geheel en al te voorschyn. Doch gebeurt dit niet, dan neemt men, wederom, na verloop van twee uren, het derde poeder. Soms gebeurt het, dat de worm eerst den volgenden dag ontlast word. Tusschen elke ontlasting, laat hy den lyder een dunne soep drinken. De eerste soort heeft hy altyd geheel kunnen afdryven, de andere (*species secunda Plateri*) slegts by stukken. Hy heeft my geschreeven, dat hy niemand deeze poeders laat gebruiken, eer hy onderzocht heeft, of de worm nog in het lighaam zy, dit bespeurt hy, wanneer in de afgangene kleine witte korreltjes gevonden worden, nadat de lyder een of meer loot van den *syrupus florum persicorum* gebruikt heeft. Elk kan ondervinden, dat dit middel goed is. De wortel van het Vaaren-kruid is, ten allen tyde, tegen den lint-worm gepreezen. Dood dezelve den worm, dankomt de *gummi gutta* en *gratiola* te pas, om denzelven afdryven, want beide deeze middelen verwekken schielyk sterke afgangene. Het geen daags te vooren gegeven word, en de poeders, die op een' dag, na elkander, genomen worden, moeten den worm afmatten, zoodat, als het tweede of derde poeder genomen word; hy niet in staat is, zich vast te houden.

Neemt men zulke omstandigheden in acht, dan zal het om het even zyn, welk purgeer-middel men daar toe gebruikt, zoo het maar schielyk en sterk werkt. Dus kon ook de Hr. NITERT agt-tien lint-wormen van eene vrouw afdryven, wanneer hy vyf pillen uit twaalf greinen *scammonium verum*, zes greinen *resina*

Sina Falappæ, en twee greinen *turpethum minerale* gaf. Drie daarvan wierden den 10. Sept. des morgens, en de overige een uur daarna genomen. Zy dreeven op den zelfden dag zeven levendige lint-wormen uit, den volgenden dag negen, en 's avonds kwam 'er nog een doode. Dewyl de vrouw nog niet gezond was, gaf hy haar den vierden October dezelfde pillen, doch vermeerderde dezelve met een half grein *turpethum minerale*. Den 6. Oct. raakte zy 'er wederom een kwyt. Daar zy egter nog niet volkomen hersteld was, liet hy haar, meermaalen, dezelfde pillen gebruiken, en daardoor wierden doode kawoers-wormen, benevens veele levendige ronde wormen uitgedreeven, zoodat hy eindelyk de geneezing kon eindigen.

Soortgelyke pillen had, voorheen, VAN SWIETEN aan een jong mensch voorgeschreeven, doch met een geheel ander oogmerk, namentlyk tegen de venus-ziekte. Zy dreeven eenen geheelen lint-worm uit. Naderhand heeft hy dikwils het zelfde middel met vrugt gebruikt, doch dewyl het den lyder sterk aantast, geeft hy het maar twee maal 's maands. Word het driemaal gebruikt, dan gaat de worm doorgaans wech. *Comment. Tom. 4. pag. 737.*

HASSELQUIST spreekt in zyne reis naar het Heilige Land, dat de lint-worm in Ægypten zeer gemeen is, en dat in Cairo het vierde gedeelte der inwoners, voornamentlyk de Joden en de gemeene man, daar mede geplaagd worden. Het beste middel, om denzelven te verdryven, word het *Petroleum* gerekend, welk zy tot twintig, of dertig, drop-

druppelen , op eens , in water , drie dagen na elkander , als de maan afgaat , geeven , en daarop den vierden dag eene buikzuivering gebruiken. Komt de worm dan niet te voorschyn , dan wagten zy , tot dat de volgende maan wederom aan het afneemen is , en dan stellen zy dezelfde geneezing in het werk. Mogelyk zal dit aan den Schryver van den Land-artz gelegenheid gegeven hebben , om eene geneeswyze voorteslaan , welke hy zeer goed keurd. Hy meldt , namentlyk , dat hy veertien weeken lang , aan een man , die met deezen worm geplaagd was , allerhande middelen voorgeschreeven heeft. 'Er kwamen wel stukken te voorschyn , doch de geheele worm vertoonde zich niet. Eindelyk schreef hy hem voor *petroleum* en therebinthyn-olie , van elk een half dragme , en liet hem dit in drie deelen inneemen. De zieke , die verdriet in het gebruik van genees-middelen had , kwam dit zeer weinig voor ; hy nam dus alles op eens in , met dat gevolg , dat de worm geheel uitgedreeven wierd. Naderhand schreef hy aan eene vrouw , die hetzelfde ongemak had , dit middel voor. Hy raadde haar daar van vyf- en dertig druppelen 'smorgens , en , zoo de worm zich niet vertoonde , veertig druppelen tegen den middag te neemen. Zy wierd verlost van negen ellen van een' dooden worm.

Wanneer nu een gedeelte van den worm te voorschyn komt ; dan trekt men voorzigtig daaraan , tot dat men eenen tegenstand gewaar word : Alsdan legt men zich neder op een smal bed , en laat aan den worm binden een gewigt , zwaar genoeg , om

om denzelven eenigzins uittetrekken , zonder hem af te scheuren. Dit hangt men buiten het bed , en de lyder ligt op de regter zyde : zoo hy dan geduld heeft , dan zal hy , of van den geheelen worm , of ten minsten van een groot gedeelte van denzelven , verlost worden , voornamentlyk wanneer hy den worm laat gaan door een , uit hout gedraaid , pypje , dat eerst met olie besmeert , en daarna voor een gedeelte in den aars gestooken word ; want dit belet , dat de sluit - spier van den aars (*sphincter ani*) den worm klemt , 't geen anders ligt zou kunnen geschieden.

Ik vernam onlangs , dat zeker man in Calmar zoodanig door den lint-worm zy aangetast geworden , dat hy verscheide maalen , in de benauwdheid , zich zelve van het leven heeft willen berooven ; doch dat men hem zoo wel bewaard hebbe , dat dit belet geworden is. Men gaf hem eindelyk drie poeders , welke eenen lint-worm uitdreeven , en daar mede verdweenen alle zyne ongemakken. Door eene kleine somme gelds kocht ik de beschryving van dit poeder , die ik hier zal mededeelen.

Men neemt eene gestoote en gezifte steen-kool , fyn , doch ongestamp , bus - kruid , van elk anderhalf dragme , en zeven wel gestooten peper-korrels.

Dit alles mengt men , en verdeelt het in drie deelen , waarvan een deel ingenomen word in een weinig Zweedsche Brande-wyn , drie ogtenden na den anderen , als de worm den lyder plaagt. Terstond daarop neemt men , telkens een' of twee spys-lepels vol brande-wyn , zonder iet daarop

te

te drinken. Veroorzaaken deeze poeders geene byzondere beweeging in den buik ; dan vermeerdert men de volgende gifte. Gaat de worm alsdan noch niet wech ; dan neemt men , op den vierden en vyfden dag 's morgens , in water veertig grein' gestooten jalappe (*).

Ik zal hier nog byvoegen eene andere geneeswyze , volgens welke zeker voornaam man van eenen lint-worm verlost wierd , behoorende tot die soort , welke mondjcs aan de zyden heeft ; zoo dat hy sedert den jaare 1748. niet het minste van hem heeft vernomen.

De geneezing bestond hierin , dat hy 1. op eene nugtere maag twee of drie stukjes knoflook , tweedrie- of vier - maal ter weeke innam , die hy , dan met thee , dan met koud water , doorflikte ; 2. zich , door te paard te ryden , twee-maal ter weeke eene sterke beweeging maakte , of zich op eene lange reize begaf ; 3. verscheide maalen het zooge-

(*) De gemeene man in *Biornborg* verdryft den lint-worm door therebinthyn-olie in eene groote gifte , en in *Wesl-Bothnien* door een mengsel uit gelyke deelen theer en melk , waar van hy een spys-lepel vol , alle morgen , zeven dagen na elkander neemt. Door dit laatste middel word de lyder in den beginne sterk aangetaft , zoo zelfs , dat 'er niet zelden stuipen ontstaan , die egter ophouden , zoodra de worm uitgedreeven word. (*Fortfätt. af Prov. Doff. berätt. p. 166. 263.*) M.

II. DEEL.

H

genaamde *Hiärnische Testament* (*) telkens tot de
 quantiteit van een glaasje , met even zoo veel Fran-
 schen wyn , gebruikte. Het eigen berigt van den
 lyder vind men in de Verhandelingen der Koning-
 lyke Academie der Weetenschappen voor den jaa-
 re

(*) Dit middel word gemeenelyk op de volgende
 wyze gemaakt :

R. Aloës bepat. unc. $\frac{1}{2}$.
 Croc. Oriental. dr. β .
 Rbei Alex.
 Tberiac. Venet. aa. dr. $\frac{1}{2}$.
 Agaric.
 Zedoar. aa. dr. $\frac{1}{2}$.
 Gent. rubr.
 Gumm. Myrrh. aa. unc. β .

*M. F. Species , quibus infunde Spiritus vini Gallici
 non rectificati Biiij. Digerantur loco calido per ali-
 quot dies, & postea filtrentur. S. Elixir Amarum
 HIÄRNERI.*

Voor het overige is de compositie van dit middel zoo
 verscheiden , dat byna elk huisgezin zyne eigene heeft ,
 en somtyds uit drie , vier , of zes ingredienten meer
 bestaat , doch die meest-al geen kwaad doen : In allen
 vindt men egter eene groote quantiteit Aloë.

Dus heeft de Hr. MURRAY in de eerste uitgaave
 zyner vertalinge van dit werk opgegeeven , in de der-
 de heeft hy het volgende geplaatst.

DARE

re 1760., en verdient insgelyks hier geplaatst te worden (z).

„ Wanneer ik in den jaare 1747. in den herfst het vier- en veertigste jaar bereikt had, bespeurde ik by my zelven eene onrustigheid en rommeling in de ingewanden, voornamentlyk in de linker zyde en vermits myn buik daar door opgezet wierd, en ik eene drukking op de borst gevoelde; zoo was altoos eene benauwdheid, verdrietigheid, en lusteloosheid daar mede vergezeld. Ik schreef dit toe aan eene bedorven maag, en zocht in den beginne my door het extract van alsen te herstellen, 't welk ik deels met wyn, deels met brandewyn, zeer sterk maakte. Dit deed eene goede werking, zoo dat de drukking en opzetting des buiks verdweenen, en wel telkens met eene beweeging in de

DARELIUS geeft de volgende bereiding op. *Sockert; Apothek. pag. 34.*

*R. Rad. gent. rubr.
As. fetid. vel myrrh.
Camphor.
Cort. Aurant. sicc.
Castor.
Extr. Aloës. aa. dr. j.
Croc. scr. j.*

*Consus. grosso modo stent. c. sp. vini Wj. vel Vini
Portug. Wj. p. vj. vel vij. dies in digestion. Col.
D.*

(z) Zie de Geneesk. Verhandel. II. Deel. pag. 326.

de linker zyde, die ik in den beginne voor winden hieldt. Doch ik nam toen ter tyd in de afgangen waar, kleine witte deelen, niet ongelyk aan het zaad van komkommers, maar ik wist niet, of daar uit iet te besluiten ware. In den jaare 1748. kreeg ik, ik weet niet uit welke oorzaak, eenen sterken loop. Toen kwam de lint-worm voor 't eerst te voorschyn. Ik verschrikte, meenende, dat het een gedeelte van de darmen was: Des niet tegenstaande trok ik zeer voorzigtig daar aan, en dewyl ik daarvan geene pyn, maar eene verzagting bespeurde, zoo ging ik daarmede zoo lange voort, tot dat hy stuitte en afbrak: By deeze geleegenheid raakte ik twee ellen kwyt. Dit stuk leefde en bewoog zich nog, als ik het nauwkeurig onderzocht. Ik liet het daarby beruften, bevondt my beter, behieldt altyd goeden trek tot eeten, en was van gedagten, dat ik geen worm meer by my had: Doch ik ondervondt het tegendeel, wanneer ik naar eenigen tyd, sterk te paard gereeden hebbende, wederom van een lang stuk van den worm verlost wierd, 't welk ik insgelyks voorzigtig uittrok, tot dat het afbrak. Dit stuk was ook levendig, en maakte, als ik het in lauw water afspoelde, verscheide beweegingen. Toen begon ik voor 't eerst te overdenken, hoe en op wat wyze ik my van deezen onaangenaamen gast zou kunnen bevryden, die my gestaadig, ten minsten eenige dagen in de maand, plaagde. Van myn' kant gebruikte ik het extract van alliem, en genoot, noch melk, noch iet zoets, alzoo ik bemerkte, dat zulke spyzen

zen my verontrufften, en veel beweeging in de linker zyde verwekten. In deezen zelfden jaare 1748. raadde my een vriend, des morgens op eene nugtere maag knoflook te gebruiken. Ik maakte daar mede aanstonds in den zomer een begin, en nam daar van, twee- drie- of vier-maal in de week, twee of drie stukken, klein gefneeden, dezelve doorflikkende, of met thée, of met koud water. Om ontlastingen te weeg te brengen, gebruikte ik het *Hiärnifche Testament*, waar van ik nu en dan een half glaasje met witten franschen wyn innam, 't geen my twee of drie afgangen verschaftte. In den herfst reisde ik, in September, amptshalve na Jämteland, en bediende my op de reize van den knoflook, en fomtyds van het genoemde *Elixir*, 't welk van die uitwerking was, dat ik, na eenen afgang, een stuk van eenen lint-worm loosde, zonder hetzelve af te scheuren. Dit stuk onderzocht ik zeer nauwkeurig, en nam by hetzelve niet de geringste beweeging waar. Geduurende myn verblyf in Jämteland, en by myne terugreize en wederkeering na Stockholm in den beginne van October, bevond ik my wel. Met November was ik wederom amps-halve genoodzaakt na Gothenburg te reizen. Onder weg, na dat ik des morgens wel ontbeeten, en daarop myne reize voor een groot gedeelte vervorderd had, bespeurde ik eene heevige drukking in den buik, waarop eene zeer sterke ontlasting volgde, en met deeze ging een groot stuk van eenen lint-worm wech, waaraan ik, naar alle mogelyke proeven, niet het min-

ste teken van 'beweeging of leven kon ontdekken, Zedert dien tyd heb ik verder geene tekenen van den lint-worm , of van eenig toeval, dat hy veroorzaakte , waargenomen. Gedurende den tyd, dat ik den worm had, wierd ik niet mager; ik had altyd grooten trek tot eeten, en als het eens by geval over den tyd van hetzelfde was, dan bespeurde ik eene buitengewoone zuiging in de maag, en een gekruip in de linker zyde''.

In dezelfde verhandelingen, voor den jaare 1747, is opgegeeven, van welk eene voortreffelyke uitwerking het genoemde *Elixir* tegen den lint-worm geweest zy in eenen jongen binnen Abo (a).

Dat

(a) Gelyk de waarneemingen van den Heere ROSÉN door hem nuttig geoordeeld zyn in het werk te laschen, alzoo zal het mede niet ondienstig zyn, die van den Heere SPÖRING hier te plaatsen.

Een Koopman in Abo had eenen leer-jongen, die zeer bleek uitzag, en in al zyn doen zeer dom en traag was, en zich daarom veele slagen op den hals haalde. Dees kreeg eenige aanvallen van eene tuschenpoozende koorts. Zyn heer nam toevlugt tot zyn gewoon huis-middel, het *Hiärnische Testament*, goot daar van een groot gedeelte in een glas, en daar op zoo veel sterken brande-wyn, tot dat het glas vol was; hy liet dit den jongen uitdrinken, en belaste hem na bed te gaan, ten einde aan het zweeten te geraaken, en dus de koorts te verdryven. Deezen raad volgde de jongen, en leide, om zoo veel te beter te zweeten, eenen goeden pels op zyn lighaam. Na verloop van een uur, moest hy ter bedde gaan, met dit gevolg, dat hy eenen zeer grooten
lint-

Dat de knoflook een treffelyk middel tegen den lint-worm zy, en denzelven eindelyk, na een aanhoudend gebruik, doode, heb ik, door de ontdeeking, in de zoo even aangehaalde verhandelingen der Koninglyke Academie der Weetenſchappen, voor den jaare 1760. getragt te bewyzen (*b*). Dezelve verdient niet minder hier geplaatſt te worden.

Eene Dame, in de twintig jaaren oud, die ge-
duur-

lint-worm loosde. Zyn Heer was grootelyks bekommerd, begaf zich na SPÖRING, en verzogt zyne hulpe, dewyl hy dacht, dat de jongen alle zyne darmen zoude kwyt raaken. Deeze, by den jongeling komende, bevondt, dat de varkens en honden een groot gedeelte van den worm verteerd hadden, doch dat het geene nog overig was, nauwelyks plaats vinden kon in den bol van een' hoed. De worm had nog eenige beweeging, was van kleur, als ſchoon-gewasſchen darmen, had veele afdeelingen, en op zyde eenen donkeren rand. Daar hy het breedſte was, kwam de breedte overeen met die van eenen vinger, doch na het einde toe nam hy in breedte af: ook eindigde hy niet in eene punt, maar was even als afgeſneeden, 't geen mogelyk door de gemelde dieren geſchied was. De jongen purgeerde den geheelen dag zeer ſterk; men gaf hem niet anders, dan een afkookſel van haver met zoete melk. Den volgenden morgen bevond hy zich gezond, doch wat vermoeid, en kreeg van dien dag af aan eene gezonde kleur, werd vrolyker, ſprak zeer wel, en was in alles veel vlugger en bekwaamer, dan te vooren. Zie de Geneesk. Verhandel. I. D. pag. 173.

(*b*) Geneesk. Verhandel. II. D. pag. 523.

duurende het geheele jaar 1755. door eene benauwdheid, met eene soort van wanhoop, van aanhoudend weenen, stuiptrekkingen, en flauwtens, die zich dikwils openbaarden, geplaagd was, kreeg eindelyk verligting, na dat zy spaa-waater uit de bron van Pouhon gedronken had, en wierd allengskens tamelyk gezond; niet tegenstaande zy mager en zeer bleek was. Zy dronk in 't vervolg alle jaar' dit water, en, gelyk het scheen, met voordeel. In den jaare 1759. wierd zy weder zieke-lyk, en gebruikte, ter plaatse daar zy zich ophieldt, verscheide middelen met verligting en voordeel, zoo dat zich een stuk van den lint-worm openbaarde, van die soort, welke mondjes op zyde heeft. Zy wierd egter somtyds door gemelde ongemakken aangetast.

In den beginne van den jaare 1760. vroeg zy my om raad. Ik bewoog haar, alle morgen twee of drie stukjes knoflook te eten, en den volgenden zoomer weder Spaa-water te drinken. Zy ging alle morgen met den knoflook voort tot in de maand van July, wanneer zy het genoemde water begon te drinken. Hetzelve tien dagen lang gebruikt hebbende, reisde zy vyftien mylen ver, ruste eenen dag na de reize uit, en vervolgde daarna het water alle morgen te drinken, schoon het haar veel moeite kostte, om het binnen te houden. Hier at deeze Dame alle avond' aard-beijen, die den volgenden dag altyd eene ontlasting te weeg bragten. Den derden morgen, na dat zy het water wederom had beginnen te drinken, of den vierden na de reize,

ze,

ze , kreeg zy sterke stuipen met buik- en heevige hoofd-pynen , en , eer zy haare vles uitgedronkenhad , loosde zy den lint-worm in eenen klomp geheel en al te gelyk met het smalle einde. Hetzelve had een foortgelyke punt , als ik te vooren beschreeven heb ; doch de vier gemelde gaaten kon ik niet zien , alzoo ik geen vergroot-glas by der hand had. De geledingen van deezen worm waren zeer dicht. De Dame bragt daarna haare bron-cuur ten einde , had verder geene ongemakken , en dronk het water zonder moeite. De lust tot eeten , die haar gedurende al dien tyd ontbrooken had , kwam allengskens weder , en veertien dagen daarna , wanneer ik de eere had haar te bezoeken , kreeg zy wederom eene gezonde kleur , en schein ook vet te worden.

Des hoope ik , dat zy verder geen worm meer by zich hebben , en voor het toekomende eene bestendige gezondheid genieten moge. Kort na dat zy van denzelven verlost was , liet ik hem in een kommetje met lauw water leggen ; doch niets bewoog zich meer aan hem , dan het smalle gedeelte , en omtrent een half-vierden-deel eener elle in de midden. Ik begoot hem met eenigzins warmer water , en dezelfde deelen kroopen wel , maar het overige was dood. Daarop goot ik 'er koud water by , en toen verlooren de genoemde deelen mede alle beweeging ; die zy egter op nieuws wederkreegen , als ik den worm wederom met warm water begoot.

Ik besloot gevolgelyk hier uit , dat deszelfs grootste gedeelte dood was , en hebbe , uit hoofde van

een ander geval, reden te gelooven, dat de knoflook hem gedood hebbe. Ik begaa daarom geenen mislag, wanneer ik vaststelde, dat hy geheel en al door knoflook kan gedood worden, indien men daar mede lange aanhoudt. Deeze Dame bediende zich van denzelven zes maanden lang, en doodde daarmede het grootste gedeelte van zeventien ellen; want zoo lang was dat stuk. Men heeft reden te vertrouwen, dat het overige, na een aanhoudend gebruik van zes maanden, insgelyks zou gedood zyn geworden, als het noodig geweest, en de worm niet te vooren wechgegaan ware, schoon men zelfs aan het smalle gedeelte van den worm een veel sterker en taayer leven wilde toeschryven, dan aan deszelfs overig gedeelte. De schokking op de reize zal hem waarschynelyk in eenen klomp samengepakt hebben, Als dit geschied, dan raakt hy de darmen in eene kleinere plaats aan, dan wanneer hy in de lengte legt; gevolgelyk kan hy zich alleen met een klein gedeelte zyner mondjes vast hegten, en is dus gemakkelyker af te dryven. Hier wierd het afdryven te meêr verligt, doordien zoo een groot gedeelte van hem dood was. De aard-beijen zyn altyd gewoon, onder de bron-cuur des voormiddags te doen laxeren, als men die 's avondste vooren eet, zelfs somtyds zoo heevig, en met zulke zwaare buik-pynen, dat men dezelve door wat cancelbrande-wyn moet doen bedaaren. Hier strekten zy tot een laxeer-middel, en dreeven den worm uit; terwyl intusschen het nog levendig gedeelte, door het koude water, als ware het, beroofd wierd

van

van zyn leven, en van de kragt, om zich vast te houden.

De Rhabarber-droppelen, waar op ik my zoo dikwils heb beroepen, worden bereid op de zelfde wyze, als de Heer Asfesfor DARELIUS in zyne Land-Apotheek, p. 333. opgegeeven heeft (*); doch als men dezelve tegen de wormen gebruikt; dan is de volgende compositie aan te pryzen;

℞. Rad. Rhei Alex. unc. iij.
 Pasful. major. exacinat. unc. j.
 Flaved. Cort. Aurant. unc. β.
 Rad. Liquirit. dr. ij.
 Cardamom. min. scr. iv.
 Hydromel. vet. ℥ij.
 Concisf. contusf. Mixt. Digere per quatrimum
 Col. expressf. adde
 Extr. Tanaceri unc. s.
 Sacchar. alb. unc. iij.
 D.

Ey

(*) Namentlyk.

℞. Rhei Alexandr. unc. ij.
 Uvar. pass. unc. j.
 Cort. citr.
 Rad. Liquirit. aa unc. β.
 Cardamom min. dr. ij
 Vin. Portugall. ℥ij.
 M. Diger. p. biduum. col. expressf. adde
 Extr. Enul. unc. β.
 Sacchar. alb. unc. iij.
 m.
 M.



By de eerste uitgaave van myne Vertaling, oordeelde ik het niet ondienstig te zyn, hier ter plaats gewag te maaken van eenige middelen, die van veelen tegen de wormen aangepreezen worden, en waarvan de Heer ROSE'N weinig of geen melding maakte; schoon nu gemelde Heer in de laatste uitgaave breedvoeriger omtrent sommige middelen geweest is, agt ik het egter noodig, het kort ver- toog, by myne eerste uitgaave gevoegd, hier we- derom in te laschen, zynde hier en daar ook ver- meerderd.

Men bevordert de geneezing, vooreerst, wan- neer men de nesten der wormen vernietigt, door zulke middelen, welke de darmen versterken, en de taaije slym, waarin de wormen zich ophouden, verdeelen, en uit het lighaam dryven; hiertoe be- hooren de bittere, zeepachtige, prikkelende, ont- bindende, versterkende, en te gelyk buik-openen- de, en zachte kwik-middelen, hoedanige voorschrif- ten men aan de hand gegeven vindt door BOER- HAAVE, in *Materie Medica*. Men moet egter in het verkiezen derzelven zeer omzigtig te werk gaan, en zich schikken na de jaaren en kragten der lyders. Kinderen willen dezelve doorgaans niet gebruiken, en daarom kan men by deezen zich van soortgelyke uitwendige middelen bedienen: Het *Un- guentum Agrippæ* en *Arthanita* schikt zich zeer wel daartoe; men neemt van elke zalf eene gelyke quantiteit, en smeert dezelve op den buik. In zeer klei-

kleine kinderen kan dezelve eene al te sterke ontlasting verwekken, en daarom moet men by deeze slegts eene zeer geringe quantiteit teffens gebruiken, en, zoodra zy beginnen over buik-pynen te klaagen, daarmede ophouden. Volgt eene sterke ontlasting; dan eischt de voorzigtigheid, dat men met zeep-zopden navel en de omliggende deelen van den buik schoon afwasche.

Het tweede oogmerk in de geneezing is, de wormen te dooden door zulke middelen, die aan de maag of darmen geene schaade toebrengen. Het eerste, welk daartoe aangepreezen word, is de honig, die, in eene groote quantiteit gebruikt wordende, somtyds voor de wormen nadeelig is, doch in de meeste gevallen geen nut aanbrengt. Het zelfde heeft plaats met den olie, die, in eene groote gifte en by aanhoudentheid gegeven, gezegd word, veele wormen uitgedreeven te hebben; doch deeze middelen dienen meer, om de darmen somtyds te verzagten, en het lighaam in staat te stellen, dat hetzelve sterker middelen zou kunnen gebruiken.

De zouten zyn mede, voornamentlyk wanneer zy in eene groote quantiteit gebruikt worden, den wormen schaadelyk, doch dewyl men deeze niet geeven kan, dan in eene zeer maatige quantiteit, zullen zy aan de darmen geen ongemak toebrengen; zoo blykt het teffens, dat men, in deeze ziekte, zich niet veel voordeel daarvan belooven konne: Wanneer dezelve egter te gelyk eene purgeerende kragt hebben, zoo als het *Sai sedlicensis*,

sis, *Ebshamensis*, en andere soortgelyke, dan zyn zy van meer nut.

Voor al heeft men getragt in het lighaam te brengen zulke middelen, die van de wormen niet zouden kunnen verteerd worden, of hen op eenige andere wyze schaadelyk zyn.

Men kan de voornaamste middelen, tot deeze soort behorende, verdeelen in drie clasfen. De eerste clasfe bevat zulke middelen, welke fcherp en ruuw zyn, en die, door de worms-wyze beweging der darmen gedrukt wordende, de wormen, gelyk men beweert, zouden vernietigen, of ten minften zeer benadeelen; zoodat zy, of dood, of zeer verzwakt, uit het lighaam zouden kunnen verdreeven worden. Onder de tweede clasfe zyn begreepen die middelen, welke eenen onaangenaamen en doordringenden ftank door de darmen verspreiden: En de derde clasfe bevat zoodanige middelen, die, fchoon zy op geene der beide voorgaande wyzen aan de wormen schaadelyk zyn, egter door de ondervinding bevonden zyn, aan dezelve zeer veel nadeel toetebrengen.

Tot de eerste clasfe brengt men het middel van den beroemden MEAD, bestaande uit gelyke deelen gefchraapt tin en rood coraal, welke tot een zeer fyn poeder gewreeven wierden, en waarvan hy een dragme met de conferf van alfem (*Conferva ab-sinthii maritimi*), tot een' flikbrok gemaakt, tweemaal daags liet gebruiken. ALSTON fchreef het tin in eene veel grootere quantiteit voor: nadat hy den lyder een purgeer-middel had laaten gebruiken,

gaf

gaf hy, den volgenden morgen, op eene nugtere maag, twee oncen van het poeder van tin, 't welk hy, door eene zeer fyne zeef gezeift, en met agt oncen gemeenen zwarten stroop vermengd had; den morgen daarop gaf hy eene once tin met vier oncen stroop, en den derden dag een half once tin in twee oncen stroop: Op den vierden dag schreef hy een purgeer-middel voor, uit zene-bladen (*Folia Sennæ*) en *Manna* bereid, 't welk ook den dag, voor dat hy het tin gegeven had, gebruikt was. Met groot voordeel, zegt hy, de genoemde quantiteit in volwasfenen gebruikt te hebben: doch in kinderen schikte hy die na de jaaren; *Medical Essays vol. 5. part. 1. n. 7. p. 77.* BROCKLESBY verkieft versch vyfjel van tin, en geeft hetzelfde aan kinderen tot een half once voor drie dagen na elkander, en een once of meêr aan volwasfenen. Op den vierden dag acht hy het noodig, een sterck purgeer-middel uit de *Falappa* en *Mercurius dulcis* te geeven; waarop hy wederom het vyfjel van tin laat gebruiken, en op denzelfden tyd een purgeer-middel herhaalt. Hy oordeelt, dit middel veel kragtiger te zyn, wanneer hetzelfde gevyld, dan tot een poeder gemaakt, gegeven word. Wanneer men hetzelfde agt of tien dagen lang gebruikt heeft; dan raakt de lyder, zoo hy zegt, eene meenigte doode en leevendige wormen kwyt.

De Heer ROSE'N heeft dit middel mede dikwils gebruikt, fomtyds met een goed gevolg, doch in andere gevallen zonder nut, gelyk hy zegt in *Abhandl.*

handl. der Schwedischen Academie der Wissenschaften, 9. Band, p. 136. Zie Geneesk. Verhandel. I. D. pag. 187.

Volgens het voorschrift van MEAD, heb ik het poeder van tin zeer lange laten gebruiken door een vrouws - persoon; dat eenen lint-worm had, en waar tegen dit middel vooral aangepreezen wordt; en op den vierden dag een purgeer-middel voorgeschreeven uit de *Jalappa* en *Mercurius dulcis*: in den beginne deedt het tin niet de minste uitwerking. en het purgeer-middel verwekte geene ontlastingen: ik bleef egter met dit middel aanhouden, liet haar 's daags, tot drie dragmen toe, van het tin gebruiken, en schreef, in plaats van het genoemde purgeer-middel, voor een aftreksel uit *Tamarinden*, *Manna*, zene-bladen en andere soortgelyke zagte buik-openende middelen, welke by lyders, sterk van ingewanden, veel eer ontlasting te weeg brengen, dan alle andere heevige purgeer-middelen, die, door hunne sterke prikkeling, de darmen doen samentrekken en veeltyds veroorzaaken, dat de stofse, die ontlast moest worden, in het ligchaam te rug blyft. Op deeze wyze raakte zy in den beginne verscheide stukken van den lint-worm kwyt; doch in vervolg van tyd bragt dit middel wel eenenige afgangten te weeg, maar dreef nooit iet van den worm uit: Ik gaf haar dan, om den worm dies te meêr nadeel toe te brengen, op den vierden dag eenige greinen harst van *Jalappe* (*Resina Jalappæ*), welke, schoon tot vyftien greinen toe op eenmaal

eenmaal gegeven zynde, nooit eenige ontlasting veroorzaakte, maar waar door de lyderesse eene zeer sterke beweging in den buik ontwaar wierd, die die haar somtyds flauw maakte, en eenige uren daarna ophield; en wanneer zy als dan het bovengenoemde aftreksel gebruikte, loosde zy eene ongelooflyke quantiteit doode stukken van den worm. Op deeze wyze voortgaande, is zy zeer veel kwyt geraakt, heeft veel in haare gezondheid toegenomen, maar is van den worm nog niet geheel en al verlost (c).

Vylfel van staal (*Limatura Martis*) word van veelen ook sterk aangepreezen, en is in sommige gevallen van nut bevonden; doch in andere vrugtloos gebruikt. Deszelfs werking schynt met die van het tin overeen te komen.

De tweede clasfe bevat de middelen, die, door hunnen stank aan de wormen nadeelig zyn, en tot dezelve is betreklyk, voor eerst, de knofflook (*Allium*), welks doordringende reuk aan allen bekend, en voor veelen ondraaglyk is. Dezelve schynt niet alleen door den reuk schaadelyk te zyn, maar ook, door de beweging der darmen te vermeerderen, te weeg te brengen, dat de wormen zich minder aan de darmen kunnen vasthouden, en dus veel gemakkelijker konnen uitgedreeven worden. De werking van dit middel is veel grooter in hen

(c) In deezen staatis zy gebleeven, tot dat ik naar de Academie te Leyden in 1770. geroepen wierd; en na dien tyd heb ik nauwelyks iets van haar vernomen.

II. DEEL,

I

hen, die aan hetzelfde niet gewoon zyn; en deeze kunnen eenige stukjes eens 's daags eeten. Uit 't geen de Heer ROSE'N omtrent dit middel zegt, blykt deszelfs voortreffelykheid.

De Duivels-drek (*Asa fetida*) word tot hetzelfde oogmerk aangepreezen, schynt wegens deszelfs verschrikkelyken stank, die, wanneer dezelve verscht uit Asia gebragt is, byna onverdraaglyk is, tot dit oogmerk dienstig, en is daarom by veelen in gebruik. Ook brengt men tot deeze clasfe den dooden kop, welke overblyft van de hertshoorn, wanneer door een sterk vuur alle vlugge deelen uit dezelve zyn uitgedreeven; den zwavel, wiens bloem met zuiker gewreeven aan VAN DOEVEREN verzekerd is, zeer voordeelig geweest te zyn, en de wortel van de gemeene valeriaan (*Valeriana Sylvestris*), welke, tegen de vallende ziekte zoo beroemd, met een goed gevolg, by de purgeer- en andere middelen door STÖRCK gevoegd is, om de wormen uit te dryven.

Onder de derde clasfe, bevattende de middelen, welke, schoon geene der voorgemelde eigenschappen bezittende, egter aan de wormen schaadelyk bevonden zyn, word gebragt, het aftreksel van de bloemen en jonge bladen der Persikke-boomen, 't welk BOULDUC pryft, als een der beste middelen, om de wormen in kinderen te verdryven. De wortel der vaaren (*Radix Filicis*) word verzeekerd een zeker middel tegen alle soorten van wormen te zyn, en waarschyglyk komt dezelve in het geheim van ANDRY: Van deeze wortel geeft men aan eenen

vol-

volwasfenen een of meêr dragmen in honig of wyn, en laat hem den volgenden dag een purgeer-middel gebruiken. Veelen oordeelen, dat de wortel van den moerbeijen-boom met die der vaaren zoude overeen komen, en laaten daarom twee of vier dragmen daarvan in water kooken; welken drank zy in tweeën verdeelen, en des morgens en 's avonds laaten gebruiken. BROUZEZ egter heeft dit middel dikwils zonder vrugt gebruikt. Een poeder van water-look (*Scordium*) zou, volgens het getuigenis van BARRERE, tegen de wormen mede zeer voordeelig bevonden zyn.

Bittere en specery-agtige middelen, die tegen dezelven zeer sterk gepreezen worden, versterken wel de ingewanden en verbeeteren de kwaade ligthaams-gesteldheid; maar men kan met geene zekerheid zeggen, dat dezelve voor de wormen schaadelyk zyn, daar de ondervinding geleerd heeft, dat dezelve in de allerbitterste afkooksels in 't leven gebleeven zyn. Van den koorts-bast is het egter bekend, dat dezelve tegen de wormen dikwils met vrugt gebruikt zy.

Zeer voordeelig heeft men den levendigen kwik geoordeeld, om de wormen te dooden; zelfs verzekert men, dat men aan kinderen eenige greinen kwik met een zeer goed gevolg gegeven heeft; doch van eene kleine gifte schynen de wormen niet gedood te kunnen worden; en men kan dezelve met geene zekerheid in kinderen herhaalen; Ook is het nog zoo zeker niet, dat de kwik voor de wormen zoo nadeelig zyn zoude: SCORQLI immers

heeft nergens meer wormen gevonden dan omtrent de kwik-mynen, zoo zelfs, dat byna niemand van dezelveu bevryd is; en egter leeven deeze menschen in eene lugt, die bezwangerd is met den kwik, door het vuur vlug gemaakt; ook loopt daarenboven de kwik zeer schielijk weder uit het lighaam. Anderen zyn van gedagten, dat water, met kwik gekookt, eene zonderlinge kragt tegen de wormen verkryge, zoo dat zy daar door gedood worden: veelen raaden daarom, gelyk de Heer ROSEN, aan, hetzelfde tot dit oogmerk te gebruiken; ook vind men zeer goede uitwerkingen daarvan aangetekend. Verscheide middelen uit den kwik bereid, worden, met vrugt gebruikt, om de wormen uit het lighaam te dryven; vooral wanneer die by purgeer-middelen gevoegd worden.

Het is bekend, dat scherpe en bytende zuuren schaadelyk voor de wormen zyn; de Azyn schynt aan dezelveu nadeelig te zyn, en te weeg te brengen, dat zy de darmen loslaaten, en uitgedreeven kunnen worden. BOERHAAVE nam *Aluë*, saffraan, en *Myrrha*, goot daarop twintig-maal zoo veel sterken overgehaalden wyn-azyn, in een groot phiool-glas, dit kookte hy twaalf uren lang, en goot vervolgens den azyn: 'er af, die met de kragt der genoemde deelen bezwangert was; op het overschot goot hy de helft der eerstgenoemde quantiteit, kookte dezelve als vooren; vermengde beide deeze aftreksels, en verdikte die, tot dat een derde gedeelte daarvan overig bleef, dus had hy zeer sterken azyn, die de kragt der genoemde middelen bezat,

bezat, en dien hy onder anderen aanprijft tegen de wormen. Hy gaf dit middel van een tot drie dragmen in meê (*Hydromel*), of in zoeten wyn.

Het Yzer-vitriool (*Vitriolum martis*) doodt de wormen in de maag ſchielyk, en zeker, welke dan gemeenelyk kort daarna uitgebraakt worden. VAN DOEVEREN heeft van hetzelfde zeer goede uitwerkingen gezien. Men ontbindt, voor een volwasfen mensch, een dragme in een pond water, laat hetzelfde nugteren drinken, en den lyder daarop eene kleine wandeling doen. Voor kinderen ſchikt men de giste na de jaaren, ook kan men den lelyken ſmaak door den eenen of anderen ſtroop verbeteren: BOERHAAVE heeft door het *Vitriolum martis* met honig ingegeven, een' voornaamen Rus van eenen lint-worm, die drie-honderd ellen lang was, verloſt. Het ſtaal, vooral de ſtaal-wateren; als ook het *vitriolum martis ad albedinem calcinatum* met de *Jalappa*, worden mede van anderen gepreezen.

Het koper, of 't geene uit hetzelfde bereid, en tot dit oogmerk aangepreezen word, is gecnzins een veilig middel, maar moet met veel omzigtigheid gebruikt worden; ja, zelfs is het beter geheel daarvan af te zien, ſchoon hetzelfde door eene kundige hand beſtierd, ſomtyds van nut geweeſt zy. De gemeene man prijft meê, op kopere duiten te gieten, en denzelven daarna te gebruiken: doch ook dit is een zeer onzeker middel, en kan ſomtyds gevaarlyke toevallen veroorzaaken.

VAN DOEVEREN heeft, in het dooden der wormen,

men , verwonderlyke uitwerkingen gezien van den Jenever, die egter, volgens de gedagten van VAN SWIETEN, van de Jenever-bessen niet schynen af te hangen, alzoo TORTI door de ondervinding geleerd heeft, dat dezelve in zuiveren brande-wyn mede zeer schielyk gedood worden , en uit alle zyne proeven besluit, dat in den wyn, en vooral in deszelfs geeftryke gedeelte , iet zy, dat aan de wormen schaade toebrengt. Dewyl nu kinderen niet, dan eene zeer geringe quantiteit wyn , of brande-wyn, kunnen verdraagen; zoo spreekt het van zelve, dat men fomtyds, alleen in volwasfenen, eenig voordeel van dit middel te verwagten hebbe, welk voordeel, volgens de proef van onzen Schryver, die eenen worm in brande-wyn eenen dag in 't leven gehouden heeft, mogelyk niet groot zyn zal.

Men weet by ondervindinge, dat de wormen door ys of ys-koud water schielyk sterven, en daarom hebben sommigen aangeraaden, veel koud water tegen dezelve te drinken. Veelen achten dit middel gevaarlyk, doch de proeven van onzen Schryver schynen te bevestigen, dat men zich met zekerheid op hetzelfde verlaaten konne. In het algemeen egter kan men van dit en alle andere middelen, om de wormen te dooden, aanmerken, dat tot nog toe geen een zeker middel bekend zy, en dat het eene middel in den eenen, en het ander in eenen anderen lyder voordeelig bevonden zy.

De sterke purgeer-middelen werken fomtyds het meeste uit; en daarom heeft men aan dezelve altyd

tyd de eerste plaats onder de middelen tegen de wormen gegeven: De *Aloë*, het *pulvis Cornachinus*, de *Scammoneum*, *gummi gutta*; en meer anderen, doch vooral de *Jalap*, worden in dit geval gepreezen. VAN SWIETEN wierd geraadpleegd door eenen jongeling, die eenen kwaadaartigen druipert had, en wiens pis-buis met zeer veele wratten (*verrucae*) bezet was. Hy schreef hem voor een sterk purgeer-middel uit *Turbinaria*, *Scammoneum*, *Resina Jalap*: De jongeling had zeer sterke ontlastingen, de druipert wierd beter, en hy was te gelyk kwyt geraakt eenen geheelen lint-worm, waar tegen hy zeide te vooren allerhande middelen vrugtloos gebruikt te hebben. Naderhand heeft VAN SWIETEN dit middel dikwils met voordeel gebruikt, en hetzelfde, alzoo het 't lighaam zeer sterk aantast, twee-maal in de maand gegeven; zelden is het driemaal gebruikt, of de worm was geheel uitgedreeven.

BOERHAAVE raadt aan, twee greinen van het *Argentum Hydragogum* BOYLEI, vel ANGELI SALÆ te neemen, dezelve met zes greinen brood-zuiker in een' glaazen mortier te wryven, en met tien grein' kruim van brood, tot pillen te maaken. Deeze laat hy van een' volwasfen mensch nugteren gebruiken, en daarop drinken vier of zes oncen water met honig. Dit middel veroorzaakt ontlastingen, doodt alle soorten van wormen; doch men moet zich wagten, hetzelfde dikwils, of in eene te groote quantiteit, te gebruiken, alzoo het een knaagend middel is, 't welk de maag zeer verzwakt; welk

ongemak men egter door geley van Jenever-besfen wech neemt.

Deeze en soortgelyke middelen moeten altyd met de grootste omzigtigheid gebruikt worden, en hebben nooit plaats by kinderen. Men heeft egter ook veel zagter purgeer-middelen, die mede kragtig genoeg zyn: Zoo een middel is de *Falappa*. Het poeder van dezelve is altyd veiliger, dan de harst; ook is het goed, hetzelfde lang met zuiker te laten wryven, ten einde de taayheid der harstagtige deelen gebrooken worde. Somtyds is het zeer voordeelig geweest, de darmen te vullen met den reuk van middelen, die voor de wormen nadeelig zyn, by voorbeeld, van duivels-dreck, en daarop een purgeer-middel te geeven.

Welke uitwerkingen men kortlings aan de braak-middelen heeft toegeschreeven, heb ik hier vooren reeds getoond.

Met vrugt voegt men de worm-doodende by buik-openende middelen. DE LILLE heeft gewenschte gevolgen gezien van het *Extractum Hellebori nigri* met het *Virriolum Martis*. STÖRCK heeft van het volgende middel, insgelyks met eenen gewenschten uitslag, vier-maal des daags aan een volwassen mensch een half once, en aan kinderen een of meer dragmen, gegeven:

℞. *Sal. Polychr.*

Pulv. rad. Falapp.

———— *Valerian. five plu. aa. dr, j.*

Oxym. Scillit. unc. iv.

Ln

Aan kinderen heb ik veeltyds foortgelyk middel, als de Hr. STÖRCK voorschryft, met een zeer gewenscht gevolg gegeven, en doorgaans *Pulv. rad. Jalapp. Valerian. aa. dr. j.* laten mengen, onder drie oncen zuiveren witten honig, beveelende daarvan alle uur of alle twee uren een eyer-lepeltje te geeven; zeer veele wormen zyn daardoor uitgedreeven, en onder anderen heb ik van een meisje van agt jaaren, welk eenen zeer opgezwollen, harden, buik, uitpuilenden navel, zeer verwyde oog-appel had, zeer sterk at, en ongedaan uitzag, binnen een uur, zes-en dertig ronde wormen daar door zien ontlasten.

In onze Apotheeken heeft men worm-koekjes (*Tabellæ ad Vermes*), welke uit beide de genoemde middelen bestaan, en dikwils met vrugt gebruikt worden. Men geeft, naar maate van de jaaren, een half, een of meer van dezelve.

De Heer NOUFFER, een Zwitzers Geneesheer, heeft veele jaaren met het gewenscht gevolg, een middel tegen den Lint-worm gebruikt, 't welk, na zyn' dood in handen der Weduwe gekomen zynde, door den Koning van Vrankryk gekogt, en op zyn bevel onderzocht, en vervolgens waereldkundig gemaakt is. Hetzelve bestaat in de wortel van het mannelyk vaaren-kruid, welk gegeven word, na dat de darmen zoo door eene soort van sop, als door een lavement, glad en glibberig gemaakt zyn, en waarop de lyder een purgeer-middel uit den *mor-ourius dulcis* verscheiden maalen gefublimeert, *refi-*


na: *Scammonei*, en *gummi gutta* gebruikt (*d*).

Eindelyk vindt men ook verscheide uitwendige middelen aangepreezen. Dat men zalven tot dit oogmerk gebruiken konne, is voorheen reeds gezegd. Zet-pillen uit bittere, en andere, zaaken, worden mede sterk aangepreezen, vooral tegen de aars-maaden; doch men merkt gemeenelyk op, dat deeze wormen alsdan van plaats veranderen en hooger op in de darmen kruipen. De clysteeren hebben alleen deeze nuttigheid, dat men zich in kinderen gemakkelyker daarvan bedienen kan, dan van andere middelen; en dat men hetzelfde oogmerk kan bereiken, wanneer men drie-maal zoo veel neemt, als men inwendig zou voorschryven. Men zoekt ook door dezelve te weeg te brengen, dat de wormen van plaats zouden veranderen, en dus gemakkelyker uitgedreeven kunnen worden; tot dit oogmerk laat men den lyder bittere middelen gebruiken, en spuit melk in de darmen.

Zyn nu de wormen gedood en uit het lighaam gedreeven; dan moet men ook alle ongemakken, welke door dezelve veroorzaakt zyn, en dikwils
nog

(*d*) Zy, die dit middel zonden willen beproeven, kunnen daar omtrent nadere opheldering bekomen in eene Verhandeling over den Lint-worm, mitsgaders de geneeswyze, welke men te *Morat* in Zwitserland, dies aangaande in het werk gesteld heeft, te *Parys*, op last des Konings, onderzocht, en openlyk bekend gemaakt, welke in 1776 te *Amsterdam* in het licht gegeven is.

nog langen tyd den lyder plaagen, zoeken te geneezen, door middelen, welke daartoe het dienstigst geoordeeld worden. Zeer moeilĳk is het ſomtyds, de ſtuipen, of vallende ziekte, door dezelven verwekt, en die dikwils nog lange waargenomen worden, volkomen te geneezen; door verſterkende middelen, en voornamentlyk door den koorts-baſt, berykt men egter ſomtyds dit oogmerk. De voorzigtigheid eiſcht ook, dat men, de ziekte, door de wormen veroorzaakt, geneezen zynde; den lyder eenigen tyd laate gebruiken middelen tegen de wormen; gevoegd by verſterkende, buik-openende, of andere middelen, ten einde de doode of levendige wormen, die in de darmen mogten te rug gebleeven zyn, ook uit het lighaam zouden gedreeven worden.



XXIV. HOOFDSTUK.

Van de Engeliſche Ziekte.

WANNEER men een kind ziet, welk een groot hoofd, een vol, bleek, opgezet aangezicht met groote aderen aan den hals heeft, doch aan het lighaam mager is, eene ſlappe huid, opgezette maag, voornamentlyk na de regter zyde, heeft, en welks beenderen aan de geledingen dik zyn; dan zegt men, dat het reeds eenen ſterken aanval van de Engeliſche ziekte (*Rachitis incompleta*) hebbe. Vindt men by hetzelfde alleenlyk eenige der genoemde tekenen, by voorbeeld, een gezwel
der

der beenderen aan de geledingen; dan heeft het een begin van deeze ziekte: Doch als teffens het vleesch zoo slap word, dat het kind niet gaan kan; dan is deeze ziekte op het hoogst, en word genoemd, de Engelsche Ziekte (*Rachitis completa*).

Het is waarschynlyk, dat ook deeze ziekte nieuw zy. Zy heeft zich 't eerst geopenbaard in Engeland in de Graafschappen Dorset en Sommerfet, tusssen de jaaren 1612. en 1620. en wierd 't eerst in den jaare 1650. door eenen Engelschen Geneesheer, met naame GLISSON, beschreeven. In de dooden-lyten der Engelschen treft men dezelve niet aan voor den jaare 1634. Van Engeland kwam zy na Vrankryk, en eenigen tyd daarna in Holland (e). Wanneer zy 't eerst na Zweeden gekomen zy, is onbekend. Zy heeft nog geenen Zweedschen naam gekreegen, ten ware dat zy aan sommige plaatsen *Riset* genoemd wierd, hoewel op andere plaatsen daardoor de uitteering der kinderen (*atrophia infantum*) verstaan worde. In sommige

(e) REUSNERUS, die in den Jaare 1582. te Bazel een werkje uitgegeeven heeft over de uitteering der kinderen, verzekert, dat in dien tyd, in Zwitserland en Holland, onder de kinderen gemeen was eene ziekte, waar door het vleesch zoo vermaagerde, dat hetzelfde nauwelyks de beenderen kon vasthouden, schoon de kinderen zeer graag in het eeten bleeven; en dat by deeze ziekte kwamen, verstoppingen en kromme beenen. Om deeze en meêr andere redenen beweerden veele, dat deeze ziekte bekend geweest zy, lange voor dat die door GLISSON beschreeven wierd.

ge plaatsen noemt de gemeene man zulke kinderen, ondergestookenen, alzoo hy in de dwaaze verbeelding is, dat zyne egte kinderen verwisseld zouden zyn, door eenen zoo genaamden Bosch-God, die in zyne hersenen huisvest. De Engelschen noemen deeze ziekte *the Rickets*; de Fransche *Nouveau*, en zoodanige kinderen *Enfans noués*. In Duitsehland word dezelve, gelyk by ons, de Engelsche ziekte genoemd.

Tegenwoordig is misfchien geene plaats in Europa, alwaar deeze ziekte zich niet openbaare; te meest nogtans gaat zy in zwang op plaatsen, die laag, moerasfig en vogtig zyn; vandaar vindt men meer van deeze ongelukkige kinderen in Engeland, Holland, Parys en Straatsburg, dan aan andere plaatsen; doch voornamentlyk zyn derzelven eene groote meenigte in de Citadel by Straatsburg, welke moerasfiger legt, dan de Stad zelve; zoo dat zich de Heer Doctor J. P. BUCHNER daar over verwonderde, en, behalve meer anderen, in één huis elf zoo broederen als zusteren vondt, die allen door deeze ziekte min of meer aangetast waren. Dit gaf hem gelegenheid, aangaande deeze ziekte zoo veel nuttige en merkwaerdige waarneemingen te maaken, waarvan ik, als van zulken, waarop men zich verlaaten kan, een goed gebruik zal zoeken te maaken.

Het is onzeker, of een kind met deeze ziekte konne gebooren worden (f). Ik heb wel een arm

boe-

(f) In *Novis Act. Acad. Cas. Nas. Curios*, Tom.

1,

boeren-kind gezien, welks ouders beweerden, dat hetzelfde de ziekte mede ter waereld zou gebragt hebben, maar men kan zich nooit verlaaten op berigten van menschen, die der zaake niet kundig-zyn. Het geloofwaardigst is, dat de ziekte zich 't eerst openbaare, wanneer de tanden voor den dag komen.

Indien het kind alsdan begint aan het lighaam mager te worden, eene slappe huid, eenen opgezeten buik, voornamentlyk na de regter zyde, een groot hoofd, een vol, doch bleek en opgezet, aangezicht, met groote aderen aan den hals, krygt, en de beenderen aan de geleedingen zwellen; dan heeft het reeds een groot begin van deeze ziekte. Wordt dezelve alsdan niet spoedig met alle bedenkelijke zorgvuldigheid te keer gegaan; dan neemen deeze toevallen daagelyks toe. Het voorhoofds-been begint uittepuilen; de beenderen van het hoofd, die door naaden vereenigd zyn, scheiden zich van elkander. De huid word dik en rimpelig, voornamentlyk in de vlakke van de hand. De tanden worden geel, zwart, en vallen stukswyze uit; de nieuwen komen langzaam en met moeite in derzelver plaats, en ondergaan hetzelfde lot, byaldien men de ziekte niet schielijk te keer gaat. De borst word

I. p. 146. heeft L. G. KLEIN een geval van een kind, met deeze ziekte gebooren, waereldkundig gemaakt; welk geval ook door deszelfs Zoon J. H. KLEIN in een stryd-schrift te Straatsburg in 1763. is voorgedraagen geworden.

aan de zyden insgelyks samengedrukt, en het borst-been puilt na vooren uit, somtyds meer na de eene, dan na de andere zyde; de ribben worden breed, en krygen verhevenheden, voornamentlyk ter plaatse, daar zy de kraak-beenderen aanraaken, welke na het borst-been gaan. De sleutel-beenderen worden zeer krom, doch inzonderheid de rugge-graat, die, of grootere, of kleinere, buigingen, dan voorwaerts, dan agterwaerts, dan na de eene dan na de anders zyde, maakt. Sommige beenderen worden op zyde plat en krom, namentlyk de dey-scheen- en knit-beenderen, als mede het speeken elle-been. De beenderen, het bekken uitmakende, worden insgelyks ingedrukt en scheef, waardoor het bekken zelve zich vernaauwt. Sommige beenderen krygen haare behoorlyke grootte niet; en het zeldzaamste is, dat ze wederom week en buigzaam worden, schoon zy te vooren hard geweest zyn; Daarom heeft men voorbeelden, dat kinderen veel korter geworden zyn, dan zy te vooren waren; of zy worden bros, zoo dat zy door de geringste beweeging breeken; of, zy worden op de eene plaats week, en op de andere bros; waarvan de Geneesheeren eenige, hoewel zeer weinige, gevallen gezien hebben. De spieren worden van tyd tot tyd zoo slap en zwak, dat de lyder; noch staan, noch gaan kan. Hy krygt ook een kleine uitteerende koorts, die vooral des nagts bespeurd word, en het weinige vet der huid, dat noch overig is, verteert. Sommigen hebben een gereutel op de borst, en eenen vogtigen hoest; doch

zy stikken den slym, dien zy opgeeven, wederom door. Anderen, integendeel, gelyk by voorbeeld het kind van TH. MOORE, hebben in het begin der ziekte, eenen droogen hoeft. Daar komt mede by eene aamborstigheid, die eindelyk zoodanig toeneemt, dat zy gevaar loopen van te stikken, zoo ze niet in het bed op de armen leunen kunnen. Somtyds zwellen de kinderen zeer schielyk op, als of lugt tusfchen het vet en de huid ware. Het water begint zich dropswyze te ontlasten, of de oogen traanen, en het gezicht neemt af. Eindelyk krygen zy stuiptrekkingen, die van hunne elende een gewenscht einde maaken.

Het is merkwaerdig, dat derzelver lighaamen na den dood niet aanstonds koud, noch styf worden. Hun bloed is zeer slymerig, en waterachtig, en te gelyk fcherp. Men kan de byzondere soort van fcherpte juist wel niet bepaalen; doch zy is genoegzaam uit haare oorzaaken en werkingen te kennen. De ingewanden, voornamentlyk de lever en blaas, zyn zeer groot, en de klieren in het darmfcheil groot en hard. In de gal-blaas vindt men geene gal; zy hebben eene veel groovere stem, dan zy na hunne jaaren zouden moeten hebben.

Eenigen zyn fchrander, en voor den tyd ryp; anderen, in tegendeel, zyn zeer dom. Van de laatste soort heeft Doctor BUCHNER, zegt hy, meer gezien, dan van de eerst-genoemde. De dommen verdraagen zeer sterke genees-middelen, doch niet de fchrander. Deezer hersenen zyn vast, doch van de anderen week en waterig. Gemeenelyk zyn

zy

zy zeer slaaperig , en moeten genoegzaam alleen door den mond adem haalen ; meestentyds hebben zy grooten trek tot eeten. Zy zyn zeer onderworpen aan bloedstortingen , stuiptrekkingen en de vallende ziekte. De Heer BUCHNER beweert , dat zy meer dan eens de natuurlyke pokjes zouden gekreegen hebben ; het welk door my nooit waargenomen is , en ik twyfel , of het wel telkens de waare pokjes zullen geweest zyn. Weinigen worden volwasfen ; ik heb egter twee perfoonen gekend , die tamelyk lang geworden zyn , en geenen krommen rug hadden. Van zoetigheden , als zuiker , rozynen , appelen , peeren enz : bevinden zy zich gemeenelyk kwalyk. Zy worden aangetaft door huiveringen , hitte , herhaalde braakingen , die fomtyds drie of vier dagen lang aanhouden. Meestentyds zyn zy met wormen geplaagd : deeze worden waarfchynelyk door zoete dingen in beweging gebragt , en veroorzaaken de genoemde toevallen. Het is nog niet beweezen of de jongetjes , dan wel de meisjes , door deeze ziekte meer aangedaan worden. By volwasfenen word dezelve zelden waargenomen ; egter brengen DU VERNEY en BURGGRAV voorbeelden daar van by. Het is een geluk , dat dezelve niet befmettende , en ook niet , voor zoo veel men tot hier toe weet , van de ouderen op de kinderen erfelyk is. Vrouws-perfoonen , die deeze ziekte , of nog , of reeds overwonnen hebben , moeten het wel overleggen , eer zy trouwen. Is het bekken by haar te nauw geworden ; dan is de verlossing moeiljelyk , en zy brengen meestentyds doode kinderen ter waereld , of fterven zelve in het kraambedde.

Allen krygen deeze ziekte niet in zulk eenen hoogen trap. Eenigen hebben slegts een beginfel daarvan; doch anderen worden meer of minder sterk van dezelve aangedaan; en byaldien zy hunne levens-wyze verbeteren, of van woon-plaatsen veranderen, of bekwaame genees-middelen gebruiken; dan kunnen zy lange in tamelyke, ja, zelfs in goede gezondheid leeven, schoon derzelver lighaam meestentyds behoude de gebreken, die het gekreegen heeft.

Onder de oorzaaken, die in kinderen deeze ziekte ligt te weegbrengen kunnen, moet begrepen worden, al het geene in staat is de vaste deelen van het lighaam zeer te verslappen en week te maaken; als 1. wanneer zy gebooren worden van zwakke of ziekelyke onderen, of van zulken, die in luiheid en overdaad leeven, thee, zuiker, of vette spyzen misbruiken; of die venus-ziekten gehad hebben, en daarvan, of niet geneezen, of door de kwyling uitgemergeld zyn geworden: zulke ouders hebben het ongeluk, dat de Moeder dikwils eenen miskraam krygt, of doode kinderen, of zulke, die de Engelsche ziekte in eenen meerderen of minderen trap krygen, ter waereld brengt. 2. Als zy van onderen gebooren worden, die, wegens armoede, te zwakke voedzels genieten: Daarom neemt men deeze ziekte waar in de wooningen der ryken en armen, doch zelden by hen die een middelmatig vermoogen hebben. 3. Wanneer de kinderen van bejaarde onderen gebooren worden. 4. Als zy opgevoed worden aan eene laege, vogtige en moerasfige plaats. 5. Indien dezelve gezoogd wor-

worden door eene Moeder of Minne, welker zog te oud is, of die te veel of te dik zog heeft, waaruit het kind geen goed bloed maaken kan; of die te weinig of te slap zog heeft, zoo dat het kind, of te weinig voedzel krygt, of te vroeg vastespyzen nuttigen moet, die het niet kan verteeren; gelyk ook, als de Moeder of Minne door eene heete ziekte, of door eene sterke tuschenpoozende koorts, verzwakt geworden is. Welke oorzaak het ook zy, het gevolg is, dat het kind zwak word, het zuur, nevens eene gesteltheid tot de Engelsche ziekte krygt. 6. Als zy gevoed worden door eene Minne, die de venus-ziekte gehad heeft, en niet wel geneezen is, of die den scheurbuik, een scropholeus of kankeragtig gezwel heeft; of die innerlyk bekommerd, of zwanger is, of den drank bemint. BOERHAAVE verhaalt, dat eene Moeder, die agt gezonde kinderen zelve gezoogd had, het negende aan eene Minne toevertrouwde, doch het verdriet had, dat hetzelfde door de Engelsche ziekte aange tast wierd. 7. Als men de kinderen gestaadig in een vogtig vertrek houdt, aldaar vuil goed wascht, of droogt, de kinderen nat laat liggen, dezelve niet aanstonds ontwagtelt, als zy zich bepist, of bevuild hebben, met bloote knien en lendenen lange in den nacht-stoel laat zitten, altyd op de armen draagt, of op den schoot houdt, aan dezelve altoos dunne spyzen, veel zoet, of dunne melk-pap, vrugten, en des nagts bier geeft, dat by 't vuur gestaan heeft en zuur geworden is. Dit alles belet de noodige uitwaasfening van het lighaam, ver-

meerdere de vogten, die door de openingen der huid opgeslorpt worden, baart het zuur, en maakt het lighaam slap. 8. Wanneer men door sineersels de schurft na binnen dryft, en de kinderen lange met den kink-hoeft, of de tuschenpoozende koorts laat worstelen, en niet by tyds hulpe daar tegen verschaft.

Hoe meer van deeze oorzaaken zich in een kind vereenigen, dies te meer is het aan de Engelsche ziekte onderworpen; en hoe langer deeze oorzaaken duuren, dies te moeilijker is het voor hetzelfde, om de ziekte te ontgaan.

Hier uit kan men te vooren weeten, of men by zyn kind deeze ziekte te vreezen hebbe, dan niet, en gevolgelyk in tyds zulke maatregelen neemen, die dezelve kunnen voorkomen. By voorbeeld, wanneer een Vader weet, dat hy lange aan de venus-ziekte gezukkeld heeft, en daar tegen, gelyk gemeenelyk geschiedt, zonder orde en levens-wyze, gebruikt heeft verscheide middelen, die niet in staat waren de ziekte te gencezen, en hy eindelyk twee- of drie-maal heeft moeten kwylen; wanneer hy, zeg ik, trouwt, en eene zickelyke Vrouw krygt, die eindelyk een levendig kind ter waereld brengt, dat men over geeft aan eene Minne, die met den scheurbuik geplaagd is, en oud zog heeft; dan kan hy te vooren weeten, dat zyn kind of sterven, of de Engelsche ziekte krygen zal. Hy moet zich daarom moeite geeven, om aan zyn kind eene uitgezogte Minne te bezorgen, en om voorts uit den weg te ruimen alle de oorzaaken, die eenigzins tot deeze ziekte zouden kunnen medewerken, en

tef

teffens het kind laten gebruiken alle mogelyke middelen , om dezelve voor te komen. De Engelschen zyn voor dezelve bevreesd , wanneer hunne kinderen eerder spreken , dan gaan kunnen : Doch men moet hierby teffens in gedachten houden , dat een kind hoe meêr men aan hetzelfde voorpraat , en daarmede spreekt , dies te eêr zal leeren spreken ; en hoe minder men hetzelfde draagt en op den schoot houdt , en hoe meêr men het op den grond laat liggen en kruipen , dies te eêr zal leeren gaan. Hoe laater by een kind de tanden te voorschyn komen , dies te meêr vreeft men , dat het de Engelsche ziekte zal krygen : En schoon het te vooren vrolyk en gezond geweest zy , gegaan en gestaan hebbe ; zoo heeft men nogtans reden daar omtrent bekommerd te zyn , ten tyde dat de tanden , het zy met of zonder stuipen , uitkomen , wanneer men bevindt , dat de huid zeer slap , de maag opgezet is , en de borst eenigzins uitpuilt ; waar op men voornamentlyk heeft acht te geeven , van den ouderdom van negen maanden af , tot twee jaaren toe.

De verandering , welke het lighaam van een kind ondergaat , wanneer hetzelfde tanden krygt , maakt , dat de ziekte als dan uitbreekt. De rug-gaad word niet eerder krom , voor dat het kind begint te gaan. Het hoofd word , na evenredigheid van het overige lighaam , groot , alzoo de naaden van het hoofd slap zyn , en mede geeven. De zwaarte van het hoofd , en de zwakheid der spieren maakt , dat het kind hetzelfde niet regt op houden kan. De huid van het lighaam is rimpelig , door dien het vet

verteert, en het vleesch slap is. Het vleesch is bleek, en niet rood, gelyk by gezonde menschen, dewyl het bloed dun en waterachtig is. De buik is groot, hoog en opgezet, om dat de ingewanden, naar evenredigheid der andere deelen, te groot, en de maag en darmen daarenboven van winden opgezet zyn.

Derzelver aamborstigheid spruit hier uit voort, om dat de plaats, waar in de long legt, te nauw is. Deeze nauwte ontstaat deels, dewyl de borst aan de zyden ingedrukt is, deels ook, om dat de grootte der buik-ingewanden het middenrif belet, by de ademhaaling, zoo laag te kunnen zakken, als noodig is. Doch de voornaamste oorzaak zal wel toe te sehryven zyn aan de slap- en zwakheid dier spieren, die de ribben moeten opligten; en eindelijk zou ook nog water in de borst, of in het harte-zakje, kunnen vergaderen, en het zyne tot deeze aamborstigheid bybrengen. Is dit, by voorbeeld, in de regter zyde van de borst; dan kunnen de kinderen niet op de linker zyde liggen. Is het in het harte-zakje; dan hellen zy gemeenelyk voor over.

De circulatie des bloeds, van het hoofd en aangezicht na beneden, word door de moeijelyke ademhaaling, welke de zieke vergezelt, belet, en dit is de oorzaak, dat de aderen aan den hals groot zyn, en het aangezicht opgezet is. Derzelver grooten trek tot eeten komt voort uit een zuur in de maag, en dit zuur ontstaat door het gebrek aan galle. Deeze nu ontbreekt daarom, om dat zy, voornament-
lyk

lyk in het net, geen vet hebben. Dat 'er wezentlyk zuur tegenwoordig zy, kan men genoeg afnemen uit den zuuren adem, de zuure oprispingen, en het gebrek aan galle. Het zuur is ook ongetwyfeld de oorzaak, dat de beenderen week worden; te meêr, daar men uit verscheide proeven weet, dat dezelve niet alleen door mineraal-zuuren, maar ook door azyn, en door wey, die met stremsel gemaakt is, week en ontbonden worden. De bogchel op den rugge ontstaat hier door, om dat de rug krom-agtig is, en aldaar uitpuilt; van daar schynt de hals korter te zyn, en het hoofd tusssen de schouderen te staan. Als de rug-graad krom is dan word het lyf kort, en van daar schynt het, als of de armen en beenen langer waren, dan zy zyn moeten. Het lighaam is scheef, wanneer de rug-graad naar de zyde geboogen is. De lendenen en beenen zyn krommer, dan de armen, omdat de eerst-genoemden het gewigt van het lighaam draagen moeten. Dat de magerheid niet hier uit afteleiden zy, om dat de zenuwen, uit het rug-merg voortkomende, gelyk sommige denken, gedrukt worden, blykt genoegzaam uit de waarnemingen, welke VALSALVA, HALLER en J. H. BRUNN ons medegedeeld hebben. Aan de zwakheid der spieren is het wel voornamentlyk toeteschryven, dat zulke lyders gaerne zitten en liggen; de gemakkelijke ademhaaling, die zy alsdan hebben, spoort, hen mede daar toe aan; want de buik-spieren zyn alsdan niet gespannen, en geeven gevolglyk meêr mede, wanneer wy de lugt inademen; vandaar

kan de long zich beter uitzetten: wegens dezelfde oorzaak leggen zy ook krom met de beenen.

Als deeze ziekte pas begint; dan kan men haar nog gemeenelyk te keer gaan; doch het kind heeft als dan eene ongemeen-zorgvuldige oppassing noodig, en al 't geene de ziekte zou konnen onderhouden, moet uit den weg geruimd worden. Indien de ouderen in deezen nalaatig zyn, oft tot geen spoedig besluit komen, en zy, die het kind oppassen, niet gewillig, gehoorzaam, en achtgeevend zyn; het huis in 't algemeen onrein, en het jaar-tiiden zeer regenachtig is; als mede 's kinds omstandigheden van dien aart zyn, dat het niet kan gebragt worden na eene hooge en drooge plaats; dan valt het moeijelyk aan hetzelfde hulp te verschaffen.

Indien de ziekte reeds toegenomen heeft, en het kind niet meer in staat is, om te staan of te gaan; dan is het zelden te geneezen. Zy, die geduurende deeze ziekte de schurft krygen, zyn gemakkelijker te geneezen, dan anderen. Wanneer iemand eenigzins door deeze ziekte aangetast is, en het ongeluk heeft, zich te stooten, te vallen, of een been te breeken; dan loopt hy groot gevaar, dat zy zich daarna vermeerdere, of schielyk haare hoogte bereike. Het zevende en vyftiende jaar is voor deeze ziekte van veel gewigt: want in dezelve overwint men haar, of zy verslimmert.

De zomer is voor zulke zieken een gewenschte tyd, voornamentlyk als dezelve warm en droog is; integendeel zyn de herft en winter zeer nadeelig. Zy, die zich als dan in het bed houden, beginnen dik-

dikwils , als de zomer nadert , voor den dag te kruipen , en te gaan. Dit hebben zy gemeen met uitgeleefde menschen; en zulken, die eene beroerte gehad hebben. Het bloeden uit de neus strekt hen even weinig tot voordeel als eenige andere bloedstorting. Wanneer zy bloed spoegen , of door den hoest opgeeven , dan is zelden eenig vat daar by geborsten : het bloed komt uit de verslakte uitwaasfemende vaten (*vasa rorifera*) , als het somtyds door een ander ziekelyk toeval derwaarts gedreeven geworden is.

Dat derzelver lighaam somtyds zeer schielijk zwelt , betekent geene verandering; want na eene braaking verdwynt dikwils de zwellung binnen een paar dagen : Doch zoo dezelve niet wechgaat , maar van langen duur word , en zich van de eene zyde na de andere begeeft , by voorbeeld , van den linker arm en voet na den regter , het oog , aan de gezwollen zyde , traant , min of meer koorts daar mede verknogt is , het gezicht invalt en rim-pelig word , de persing tot afgang , of andere krampachtige toevallen vermeerderen ; dan nadert derzelver verlossing , en de dood alleen bevrydt hen spoedig van hunne menigvuldige ongemakken.

Wanneer hunne natuur zich zeer verandert , zoo dat , by voorbeeld , zy , die voorheen loslyvig waren , thans eene verstopping krygen ; als mede , die het water te vooren ongehinderd loosden , hetzelfde tegenwoordig niet meer konnen kwyt raaken , dan verwacht men het einde van hun elendig leven. Valt het gezicht merkelyk te samen ; dan hebben zy niet veel boven de veertien dagen te leven.

Worden de oogen duister, en verliezen de voeten hun gevoel; dan blyven zy niet boven drie of vier dagen in t leven. Hetzelfde heeft plaats, als de adem zeer stinkend word.

Dat men deeze ziekte by kinderen op het land vinde, heb ik dikwils bemerkt; doch het zou der moeite waardig zyn te onderzoeken, of zy zich alleen openbaare aan zulke plaatsen, die naby de landwegen, of Heeren-wooningen liggen, werwaarts het vergift der venus-ziekte gemakkelyk komen kan.

Met de geneezing gaat het langzaam voort, duurende somtyds jaaren lang. Het is ook geen wonder, alzoo de ziekte zich lange vergadert, en de levenswyze ruim zoo veel, als de genees-middelen, in deeze uitvoeren moet. Het valt ligt, een sterk lighaam zwak te maaken; maar aan een zwak en ziekelyk lighaam krachten by te zetten, is moeijelyk, en vereischt tyd.

Zy, die niet veel aan hunne kinderen te kosten kunnen leggen, moeten zich vergenoegen met tweederlei genees-middelen: Het eene verdryft het zuur, en word gemaakt uit een lood goede potasch, welke men smelt in een pond zuiver bronwater, en in eene fles bewaart. Hier van geeft men aan het kind alle morgen, naar maate van de jaaren, van twintig tot tagtig, of honderd droppelen, in een glas water. Met het gebruik van dit middel gaat men niet steeds voort, maar geeft hetzelfde drie of vier dagen lang na den anderen, en dan houdt men daar mede even zoo veele dagen weder op. Het ander middel vermindert insgelyks het zuur; doch bevordert voornamentlyk de spys-verteering.

teering, maakt, dat uit het voedsel eene Chyl bereid word, waar uit goed bloed ontstaat, houdt de openingen der opslorpande en melk-vaten in de darmen open, belet den slym, ontbindt de taaye vogten, en de verstopping in het darm-scheil, en onderhoudt door zyne zachte prikkeling de worms-wyze beweging der darmen, en de ontlasting. Men maakt dit gereed uit tien grein' venetiaansche zeep, een grein gekookte osfen-gal, en vyf grein' wortel van kalfs-voet (*arum*), waar uit men agt pillen maakt, elke van een grein, welke men verzilvert, of, dat nog beter is, met een weinig fyn-geftooten en geziften caneel bestrooit. Hier van neemt men vier in by de middag-maaltyd, en vier by de avond-maaltyd. Het oogmerk is, dat zy dezelve werkingen zullen doen, als de natuurlyke gal. Men laat uit de Apotheek van dezelve, voor drie maanden lang, haalen, en bewaart haar, in een wel-toestopt glas, in de kelder.

De Engelschen laten hunne kinderen in koud water baaden, of hetzelfde, door eenen tregter, van eene hoogte op hen vallen: Van beide deeze genees-wyzen bedient men zich ook by ons, hoewel zelden. Een Vrouws-perfoon gebruikte foortgelyke baden tegen deeze ziekte geduurende drie zomers na den anderen, en wierd volkomen hersteld. By onze mineraal-bronnen geschieden zulke geneezingen, en in den jaare 1760. wierd by Loka (*g*), door

(*g*) Wie iet uitvoerigs begeert te leezen van de eigenschappen der bronnen te Loka, en van derzelver voor-

door middel van het druij-bad (*Douche*), eene zeer merkwaerdige in 't werk gesteld, aan een kind, dat de Engelsche ziekte had, noch staan noch gaan kon, en binnen veertien dagen zoodanig in kragten toenam, dat het in staat was, om te springen en te dansen. De koude van den slyk by Loka zal misfehien veel tot deeze geneezingen toegebracht hebben. Niets geeft aan de verslapte spieren zoo schielijk de kragten weder, dan koud water, het zy dat hetzelfde als een gewoon, of als een druij-bad, gebruikt worde. Wien dit niet aanstaat, die kan zich alle avond, eer hy na bed gaat, het lighaam laten waschen met eene spons, in koud water gedoopt.

De levens-wyze kan van armer lieden kinderen niet in acht genomen worden. De ouders moeten egter het vertrek zuiver en genoegzaam wam houden, en dikwils met harst van Jenever-boomen be-rooken, het kind, by vogtig weêr, in de kamer houden, daarop letten, dat deszelfs kleederendroog zyn, aan hetzelfde geen zuur bier of zuure melk geeven, en het lighaam eenige reizen daags, zoo sterk

voortreffelyke uitwerkingen, die kan zulks vinden in het geleerde werk van den Heere PIETER JONAS BERGIUS: *Tal om kalla bad i g-men, och Loka badningar i Synnerhet.* Stockholm 1764. 8. welk werk in den jaare 1766 te Stettin in het Hoogduitsch vertaald, en met aanmerkingen, als ook met eene voorreden over het nut van het baden in 't algemeen, en inzonderheid van de koude baden, vermeerderd, door J. J. RHODES uitgegeven is.

sterk, als het zulks verdraagen kan, met een' wollen lap wryven, dien men telkens te vooren met harst van jenever-boomen beroekt.

Zeker Fransch Geneesheer (b) roemt, tegen deeze ziekte, zeer den wortel van de Mee-krap (*Rubia Tinctorum*), en deeze geneezing is niet kostbaar. Men neemt van deezen wortel een half lood, mengt denzelven met tien grein' gedroogde oranje-schillen, en vyftien grein' gestooten venkel-zaad, snydt het alles klein, en kookt het in een' verglaasden

(b) Namentlyk LODEWYK JOHANNES BAPTISTA COSNIER: dees, ten minsten, heeft in den jaare 1758, te Parys uitgegeeven eene *Quaestio Medica: An Rachitidi rubia tinctorum?* en daarin de nuttigheid van dit middel aangetoond. S.

LEVRET (*l'art des Accouchemens* 1766 p 277.) roemt ook deezen wortel tegen de Engelsche ziekte, en beroept zich op eene ondervinding van twaalf tot vyftien jaaren, hoewel hy nog meer proeven noodig oordeelt, eer hy deeze plant voor volkomen beproefd voorstellen kan. Wanneer hy merkt, dat de beenderen beginnen week te worden, zonder dat 'er andere toevallen by komen, laat hy de minne of het kind een afkooksel met honig drinken. Zoo 'er andere toevallen by komen, als hardlyvigheid, de loop, een opgezette buik, wormen, voegt hy 'er andere middelen by. Tot deeze geneezing worden verscheide maanden vereischt. Doch het dourt niet lang, eer de lyder beterschap bespeurt, en regt op gaat. De groote beenderen reeds krom geworden, hebben daar door haare regtheid wedergekregen. M.

den aarden pot met zes pond' versh water, tog dat twee pond' daarvan verkookt zyn. Dit vogt koud en klaar geworden zynde, dan giet men het klare daar af, en bewaart het in glaazen vlessen tot een dagelyks gebruik. Dewyl gemelde Geneesheer zich in deezen op veele ondervindingen beroept; zoo zal het niet noodig zyn aan te haalen de aanmerkingen, die de Hooggel. Heer BOEHMER nopens deezen wortel gemaakt heeft, noch ook die, welke in de *Encyclopedie*, Tom. 7. p. 479. gevonden worden.

Het is waarschynlyk, dat de wortel van de *Herba Brittannica* (*) zeer goed tegen deeze ziekte zyn zou, wanneer die bereid en gebruikt wierd op dezelfde wyze, als ik van de meê-krap gezegd hebbe.

Gegoede lieden konnen verder gaan, en dus meêr hoope hebben, van deeze ziekte spoedig te zullen geneezen: Deeze moeten

1. tragten het zuur te verdryven, door droppe-
len, gemaakt uit een lood zout van wyn-steen (*Sal Tartari*), dat in een pond versh en goed bron-
water gesmokten, en in eene vles bewaard word.
Daarvan geeft men aan het kind, insgelyks naar des-
zelfs

(*) Men schat dit kruid (*Rumex aquaticus* L.) in
Zweeden zeer hoog, wegens deszelfs nuttigheid in den
Scheurbuik, en tegen kwaadaartige verzweeringen, zoo
wel uit- als in-wendig gebruikt. Van het poeder be-
diend men zich ter bevestiging en zuivering der tanden.
M.

zelfs jaaren, twintig tot honderd droppelen in een glas water, des morgens, en 's namiddags, gedurende drie of vier dagen na den anderen, wanneer men wederom even zoo veele dagen daar mede op houdt. Op deeze wyze gaat men voort, tot dat men merkt, dat het kind verder geen teken van zuur, als, eenen zuuren adem, en een zuur-riekend zweet van zich geeft (i).

2. Indien deeze droppelen geen open lyf verwekken; 't geen egter dikwils geschiedt, wanneer het loog-zout zich met het zuur vereenigt; dan geeft men aan het kind een- of meer-maalen de tinctuur van Rhabarber, in de Apotheek genoemd, *Anima Rhei*, en laat hetzelfde daarvan na deszelfs jaaren en natuur, een', twee, of drie pap-lepels vol telkens neemen.

3. Op het einde van elke middag- en avond-maal-

(i) Zuur-breekende middelen zyn, buiten tegenspraake, in deeze ziekte van de uiterste noodzaakelykheid. DE HAËN zegt, niet genoeg te kunnen aanpryzen de Oester-schulpen, alzoo hy bevonden heeft, dat, wanneer men twee- of drie-maal 's daags aan de kinderen twintig grein' van een poeder uit dezelveu gaf, en zy op het land, in eene zuivere lugt, leefden, dagelyks en dikwils in een wagentje gereeden wierden, hun bed en kamer zeer droog was, en zy gezond voedsel genooten, de geneezing zeer schielyk volbragt was. Kinderen, die de meeste der opgenoemde hulp-middelen moesten ontbeeren, heeft hy alleen door het poeder, en door de beweeging geneezen; doch dan werd langer tyd vereischt.

maaltyd geeft men vyf of zes pillen van twee grein'; bereid uit negen grein' dik-gemaakte *Offa Helmon-tiana*, een grein gedroogde osfen-gal, en zoo veel wortel van kalfs-voet (*), als vereischt word, om daarvan een' deeg, en naderhand pillen te maaken, die men verzilvert, en in een wel-geslooten glas bewaart. Men laat zich daarvan zoo veel geeven, als voor een' of twee maanden noodig is. Deeze pillen komen, van weegens de genoemde *Offa*, het meest overeen met de gal der menschen, alzo zy bestaan uit eenen fyne olie, en een vlug-loog-zout.

4. Wanneer men bevindt, dat de droppelen (N^o. 1.) niet zoo dikwils noodig zyn; dan begint men, den kinde dagelyks te geeven de Kina, het liefst in poeder, tottwintig, dertig of veertig grein' 'sdaags. Men bevogtigt de kina met water, dat zy als een deeg worde, waarvan men in een ouwel zoo veel geeft, als het kind gemakkelyk kan doorslikken. Indien men eenige ogtenden na den anderen, aan het kind laat zien, hoe men een weinig gestooten zuiker in een ouwel doet, en dit aan hetzelfde laat doorslikken; dan zal het naderhand, gelyk ik dikwils bemerkt hebbe, de kina, of wat men wil, zonder zwaarigheid, op dezelfde wyze inneemen. Het *Sal essentielle* van de kina is ten deezen opzigte ins-

(*) Deeze moet niet eerder tot poeder gemaakt worden, dan wanneer men hetzelfde noodig heeft, want, lang bewaart zynde, heeft het geene krachten meer.

insgelyks nuttig. Ik liet een kind, dat tamelyk sterk door deeze ziekte aangetaft was, daarvan, in pillen, dagelyks tien grein', negen maanden lang, gebruiken; liet hetzelfde mede alle morgen en avond met een' wollen lap, met *maslix* berookt, sterk wryven, en maakte, dat het alle dag in eenen kleinen wagen door de kamer gerold wierd. Dit alles was van die uitwerking, dat het kind begon te gaan, en naderhand verder niets van zyne voorrige ziekte bemerkte.

Staat de kina tegen (*k*); dan kan men het kind dikwils Spa-water uit de Pouhon-bron laten drinken; doch dit niet te krygen zynde, dan kan men het door de konst bereiden, namentlyk, op de wyze, door den Hooggel. Heer MONRO (*) voorgesteld,

(*k*) Aan kinderen, die eene geschiktheid tot de Engelsche ziekte hebben, en de kina niet kunnen gebruiken, heeft WHYTT een weinig rooden wyn, eens of tweemaal 's daags, op eene ledige maag geven, en bevonden, dit het beste versterkende middel te zyn.

(*) De uitvinding komt hierop neder, dat men eene ontbinding van yzer-vitriool in gemeen water giete, in zulk eene quantiteit, dat hetzelfde even veel yzer bevatte, als het ware mineraal-water. Dit weet men door eene proef met het aftrekfel van gal-nooten: Men droppelt, namentlyk, daar van zoo veele droppels in eene zekere quantiteit mineraal-water, tot dat de kleur van hetzelfde niet meer verandert word. Voorts droppelt men even veel van dit aftrekfel in eene gelyke quantiteit gemeen water, en giet daarna zoo veele droppelen van de ontbinding van vitriool 'er by, tot dat de-

II. DEEL.

L

zelve

steld, of, men laat hetzelfde *Globuli Martiales* (l) gebruiken. Deeze naait men in netel-doeck, en hangt ze aan eenen draad alle morgen in een half pond bron-water, tot dat het de kleur van thee-boe heeft. Dit drinkt het kind alle voormiddag uit, en de *Globuli Martiales* hangt men aan het venster tot op den volgenden dag (m).

5. Kan men teffens des avonds het kind uitwendig koud water op een der genoemde wyzen laten
ge-

zelfde kleur gebooren worde, die het mineraal-water heeft. Wanneer men op deeze wyze eens de quantiteit van het yzer ontdekt heeft, dan kan men naderhand gemakkelyk de regte quantiteit in het groot bepaalen. *Mé-dicat Essais and Observations*, vol. 2. p. 50. M.

(l) *GLOBULI MARTIALES* Pbarm. Wittenb.

℞. *Limaturæ Martis in alcohol tritæ libram semis.*
Tartari albi pulverisati libram unam.

Misce, inde cucurbitæ, vel alii vasi vitreo, affunde
Spiritus Vini libram semis vel uncias octo;

Masfam vel solis, vel fornacis, vel balnei calori
expone, ut digeratur, & leniter exsiccetur. Cui
deinde denuo tritæ

Spiritus vini eandem quantitatem affunde;

Digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec
masfa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos
efforma, ad ovi columbini magnitudinem.

(m) Men kan ook zulk water bereiden, het welk dezelfde kragt bezit, wanneer men een yzer gloeiend maakt, en dan in water steekt. In de Apotheeken heeft men verscheide *Tincturen*, uit staal bereid, die mede met vrugt gebruikt worden.

gebruiken; dan heeft men de kragtigste middelen, welke gemeenelyk deeze ziekte geneezen.

Komt cene geregde levens-wyze nog daar by; dan heeft men niets verzuimt. By deeze neemt men het volgende in acht: 1. moet het kind; is het mogelyk, van de vogtige, moerasfige en laege, plaats gebragt worden na eene hooge, en die niet digt by het water is. Kan het zyn, dan moet het in geen beneden, maar in een boven-vertrek woenen. Daarenboven moet men hetzelfde in de kamer houden als het weêr vogtig is, en dezelve alsdan met *mastix*, harst van jenever-boomen, of iets diergelyks, berooken.

Het vertrek moet zuiver, en maatig warm gehouden, ja, zelfs des zomers, een klein vuur in hetzelfde aangelegd worden, op dat de lugt droog, zuiver, en niet aangevuld zy met de uitwaasfemin-gen der menschen, die zich daarin bevinden. Wanneer de kamer moet geschrobt of geveegd worden; dan brengt men het kind in eene andere, tot dat ze wederom volkomen droog is. 2. Moet het kind dikwils in een' kleinen wagen, waarin het vast kan zitten, gereeden worden, het zy in de kamer, of in de open lugt, nadat het weêr is; als medever-scheide-maalen 's daags over het geheele lighaam sterk gewreeven worden met een' wollen lap, dien men telkens te vooren met *mastix* berookt (r).

3. Als

(n) Tot deeze berooking zyn de *Benzoe*, *Succinum*, *Olibanum*, *Thus*, en soortgelyke middelen, welke afzonderlyk, of allen te gelyk, gebruikt kunnen worden, ook van veelnut.

g. Als het kind zeer slaaperig is, dan houdt men het van te veel slaapen af. het vertrek moet daarom helder, en digt by andere menschen zyn, zoo dat derzelver geruifch kan vernomen worden. Het moet ook hard, niet op vederen, maar op eene matras van stroo liggen (o). 4. Moet men 's kinds klederen, voornamentlyk het hemd en de kousen, dikwils veranderen, en dezelve dagelyks stryken, opdat zy droog genoeg zyn zouden. De kleur der klederen moet rood of wit zyn, als het die verdraagen kan. By het eene meisje, waarvan Doctor BUCHNER spreekt, was het iet byzonders, dat het telkens de vallende ziekte kreeg, als het iet van eene roode kleur zag. 5. Moet het kind, zoo veel als mogelyk is, droog voedsel nuttigen, en niet eeten, zoo veel als het wel zou willen eeten: Ook moet men aan hetzelfde geen' théé, of warm water,

(o) By ons is men gewoon voor de kinderen bedden van Vaaren te maaken; ook kan men, tot hetzelfde oogmerk, verscheide andere kruiden en bloemen gebruiken, als de *Majorana*, *Melissa*, *Mentha*, *Flores Meliloti*, *Trifolii odorati*, *Sambuci*, *Rosarum*, welke gedroogd, tot poeder gewreeven, en met eens zoo veel kaf van gerst vermengd, tot beddetjes gemaakt worden. BOERHAAVE nam drie pond' mannetjes vaaren, twee handen vol van de drie genoemde kruiden, en twee oncen van elke der gezegde bloemen. Op foortgelyke bedden kan men, met het grootste vrugt, de kinderen van de geboorte af aan laten leggen, en daar door komt men veel al de Engelsche ziekte voor, mits men egter lette op de regelen, in dit hoofdstuk voorgeschreeven,

ter, water-soepen, melk-spyzen of grutten, noch warm of week brood, geeven. Al wat vet, of zuur is, of ligt zuur word, is voor zulk een kind nadeelig: Daarom moet het geen vet vleesch, geene vette soep, kaas, boter, geene spyze met olie, zoetigheden, geene vrugten, noch melk, of daaruit bereide wey, nuttigen. Gekookten visch en gekookt vleesch mogen zulke kinderen insgelyks niet eeten. 6. 's Kinds drank moet bestaan in water met wat wyn, die niet zuur is, of in goed dun bier, dat veel hop bevat (*p*); en goed en lugtig beschuit moet deszelfs brood zyn. Voor het overige mag het vleesch-soepen eeten, waarvan het vet afgeschept is, ook wanneer eyeren daarin geroerd zyn, bier-soepen met eyeren, of met brood, dun-gekookte eyeren, gebrade vogelen, gebraden lamskalfs- en rund-vleesch, gebrade vischen, hachée, geley van kalfs-pooten, gebrade lever van vischen, kalveren, hoenderen, duiven, eenden, ganzen, en van andere gemeste vogelen, by de koks genoemd *Foies gras*. Op de spyze moet altyd de eene of an-

(*p*) Goede roode Fransche wyn, Hippocras, Bruns-
wyksche mom, Engelsche *Ale*, en Hollandsch bier van
twaalf gulden, worden door BOERHAAVE hiertoe aange-
preezen. Des zomers liet hy deeze dranken vermengen
met eene gelyke quantiteit van het een of ander *Aqua*
fermentata, of Spa-water. Den wyn liet hy drie- of
vier-maal daags tot een, en den Hippocras tot een half
once, gebruiken.

andere specery, als kaneel, noote-muscaat, of foe-
lic gestrooid worden (q).



XXV. H O O F D S T U K.

Van het Water-hoofd.

DE kinderen bevinden zich in een' elendigen
toestand, wanneer hun hoofd grooter is,
dan, ten aanzien van de overige deelen van het
lighaam vereischt word, en hetzelfde van tyd tot
tyd in grootte toeneemt, terwyl de groeiing der
overige deelen bykans stilstaat, ja deeze zelfs ver-
minderen. Men noemt deeze ziekte een Water-hoofd.

Naardien deeze droevige ziekte zelden in ons
Land

(q) By het beschuit liet BOERHAAVE gebruiken een
weinig saffiaan, muscaat-nooten, cardamom, caneel,
of soortgelyke aangenaame en versterkende speceryen:
hy prees mager, en een weinig gebraden, vleesch
van duiven, hoenders, koneynen, schaapen, bokken,
kalveren, klein gesneden, en gemengd met beschuit,
zout, een weinig pieterfelie, thym, noote-muscaat,
of iet diergelyks. Ryft, gierst, gerst, met water en
rozynen gekookt, en vervolgens met een weinig wyn
en eenige speceryen vermengt, vondt hy ook dienstig.
De gebrade levers van vischen, kalveren, &c. Door
den Hr. ROSÉN toegestaan, schynen minder voordeelig
te zyn.

Land waargenomen word, zoude ik haar met stil-zwygen hebben kunnen voorbygaan, had ik niet begreepen, dezelve insgelyks tot myn bestek te behooren, als mede, dat veelen ten minsten dezelve gaerne zullen willen kennen, alzoo zy zich, ongelukkig, te eeniger tyd zou kunnen openbaaren; want 'er is geen twyfel, of verscheide kinderen, welke gezegd worden aan onbekende ziekten te sterven, worden wechgerukt in en met den beginne van dezze ziekte, gelyk nog onlangs in een voornaam huis gebeurd is.

Worden de kinderen met dit ongemak geboren; dan is hetzelfde waarschyglyk voortgesprooten, of van eenige uitwendige belediging (*), door welke het hoofd 't meest aangedaan word, en welke ligt kan plaats hebben, deels, wanneer eene vrouw, die zwanger is, zich zwaar tegen den buik stoot; of, als het kind lange geklemd ligt, 't geen zou kunnen veroorzaakt worden, wanneer de Moeder zich zeer nauw kleedt, lange, in eene en dezelfde houding, stil zit, en in langen tyd geene ontlasting heeft; deels ook van verborgen oorzaken, voornament-

(*) Dat deeze oorzaak niet slegts eene gissing zy, ziet men uit de beschryving van een Water-hoofd, waarby de bovenste beenderen van het hoofd, in water tuschen het dikke hersen- en been-vlies vergaderd, los even als zwommen. De oorzaak was een ontydige byslaap agt dagen voor de geboorte van dit kind. KLINKOSCH *progr. de Hydrocephalo fetus rariori. Prage 1773.*

mentlyk van diep ingewortelde verborgen ziekten by Vader of Moeder. Hoe onmooglyk het ook zy, in deezen eenige zekerheid te hebben; zoo noeme ik nogtans alle deeze omftandigheden op, dewyl zy in 't algemeen de behoorlyke groeiing van het kind beletten, en eene Moeder zich voor dezelve met alle zorgvuldigheid in acht neemen moet. Een fchielyke fchrik van iet onaangenaams, dat onverwagt gezien of gehoord word; hoe fchadelyk dezelve ook voor het kind wezentlyk zy; fchynt egter niets te konnen bybrengen tot een ongemak, gelyk dit is. Is de bovengenoemde tegennatuurlyke gefteeldheid van het hoofd reeds in het lighaam der Moeder tot eenen hoogen trap gekomen; dan moet de verlosfing moeiljelyk worden; en daarvan heeft de Heer JACOB HIDËEN, Stads-Doctor in *Norrköping*, in zyn berigt aan het Koninglyk Genees-kundig Collegie, in den Jaare 1765. een merkwaerdig geval bygepragt (r). Heeft de ziekte een zoo fchielyk begin gehad;

(r) Hy wierd, namentlyk, geroepen by eene vrouw, welke reeds eenen dag in arbeid was geweest; de weën hielden op, de teeldeelen waren gezwollen, de pols was klein, fchielyk en zwak, ende vrouw kragtloos. Het kind lag op den rugge, zynde het hoofd zeer groot, nedergezakt, en valt geflooten tufchen het fchaam- en heilig-been, zoo dat hetzelfde niet kon te rug gebragt worden, welke poogingen de Heer HIDËEN daartoe aanwendde. Het eenigft middel was, het hoofd, inde pyl-naad, te openen met de fchaar van SMELLIE. Geen bloed, maar eene groote quantiteit water kwam uit hetzelfde, het hoofd wierd kleiner, en de verlosfing gefchiedde,

ghad; dan is zy te minder beklaaglyk, dewyl dezelve door eenen schielyken dood gevolgd word.

In de meeste aangetekende gevallen heeft men egter dit ongemak niet eerder ontdekt, dan eenige weeken of maanden na de geboorte. Men kan met veel zekerheid stellen, dat meesten-tyds de oorzaak der ziekte reeds tegenwoordig geweest zy, ten tyde der formeeringe van de vrugt in de baarmoeder: ook kan dezelve haar beginsel neemen onder de geboorte, als 's kinds hoofd langer, of sterker, in een nauwen weg, geklemd word; 't geen het eene kind zonder ongemak kan verdraagen, doch het ander niet, naar maate dat hetzelfde geplaatst is, of eene lighaams-gestalte heeft. Nog andere omstandigheden komen dikwils daarby, die, op haar zelve zeer gevaarlyk zynde, aangemerkt konnen worden, als zulke toevallen, welke den grond tot deeze ziekte gelegd hebben; en wel met eene genoegzaame waarschyndykheid, wanneer dezelve zich naderhand eerst openbaart. Eene koude, op het hoofd gevat, en de na binnen gedreeven schurft, zyn daarom aangegeeven, als oorzaaken deezer ziekte; schoon deeze laatste toevallen zeer dikwils waargenomen worden, zonder juist zulk een gevolg te

schiedde, zonder moeite. Het kind kreeg op den derden dag na de geboorte stuipen, en stierf den volgenden dag. De Moeder wierd door eene sterke koorts aangetast, doch kreeg binnen drie weeken haare gezondheid weder. Zie *Berättelser Inlämnade til Kongl. Collegium Medicum &c. pag. 302.*

te hebben. Somtyds heeft men, in meer bejaarde kinderen, deeze ziekte toegescreven aan een uitwendig ongemak, door eenen val veroorzaakt, en in andere gevallen, aan voorafgaande hevige koortsen. By deeze omstandigheden zyn de kinderen gemeenlyk schielijk gestorven; doch eenigen hebben, tot de grootste verwonderinge en droefheid, met deeze ziekte, drie, vier, tien, ja vyftien jaaren lang geworsteld; zelfs verzekert men, dat één ouder dan twintig jaar' geworden zy; en in een Dorp, dicht by Upsala, is, voor eenige jaaren, eene vrouw gestorven, in den ouderdom van vyf en veertig jaaren, die, reeds van de zesde maand haares levens af, met een verschrikkelyk groot hoofd, en alle daardoor veroorzaakte toevallen, bedlegerig was geweest; waarvan de Heer EKMAN eene breedvoerige beschryving gegeven heeft (s).

Indien het hoofd op eene zoo ongewoone wyze in grootte toeneemt; dan verwydt zich gemeenelyk het bekkeneel; en de beenderen kan men gemakkelijk voelen onder de huid, welke, gedrukt worden-

de,

(s) Deeze leezenswaardige beschryving vindt men ook medegedeeld in eene aanmerking in de *Natuur- en Genees-kundige Bibliotheek*, III. D. 3. st. pag. 521., en dezelve word ook gevonden in *Thesaur. Dissert. vol. 2. pag. 325.* C. G. BUTTNER beschryft een Water-hoofd, waar mede eene Vrouw tot in haar een en dertigste jaar gesukkelt heeft, in eene byzondere verhandeling, welke in de Hoogduitsche taal te Königsbergen in 1773. is in het licht gegeven.

de, niet medegeeft. Het gebeurt ook bykans altyd, dat het bekkeneel zich in zyne geheele wydte uitzet, hoewel 't meest na vooren, en na boven, alwaar geen uitwendige tegenftand is, waarom het voorhoofd breed, en voornamentlyk hoog word, uitpuilende over de oogen, en het overige gedeelte van het aangezicht, het welk daarom smaller en korter fchynt te zyn. In den beginne, wanneer de beenderen van het bekkeneel nog niet famengevoegd, en de zoogenoemde naaden niet gemaakt zyn, worden zy van elkander gefcheiden, zoodat de plaats, welke tufchen beiden blyft, langs zoo breeder word, en zeer gemakkelyk kan gevoeld worden, even als de fontanel. Maar indien het kind, onaan gezien dit ongemak, eenige jaaren in 't leeven blyft; dan breiden zich de beenderen niet minder, in alle hunne uitgeftektheid, en na alle kanten, uit, tot dat zy eindelyk elkander allen aanraaken, of, door middel der kleine beentjes, welke zich naderhand in de naaden vertoonen en groeijen, zoodaanig aan een gevoegd worden, dat geene openingen meer overig blyven: en by de zieken, die deezen tyd overleefd hebben, heeft men niet bemerkt, dat het hoofd naderhand fterk toegenoomen hebbe. Daaruit nu volgt, dat het kenteken deezer ziekte, hetwelk genoomen word uit den afftand der beenderen van het bekkeneel, van elkander, alleenlyk plaats hebbe in de jonge jaaren. Hetzelve verdient egter alle opmerkzaamheid, dewyl de ziekte juist in dien ouderdom begint, en aanftonds moet worden in acht genomen, zal men eenige hoope hebben,

hebben, om dezelve te geneezen. Meestendeels neemt het bekkeneel toe in dikte en sterkte, schoon men een voorbeeld beschreeven vinde, waarin de inwendige gesteldheid van het hoofd, door het been, het zy tegen den dag, of tegen het licht, kon gezien worden (1).

Zodra dit ongemak begint, kan het kind niet regt op gehouden worden, maar word zoo dan aanstonds ongeduldig, krygt eenen hoeft, braakingen, benauwtheid; welke toevallen allen bedaan, als hetzelve word nedergelegd. Schoon het te voren uren lang kon wakker gehouden worden, zoo is het thans altyd slaaperig. Zulke toevallen verdienen eene nauwkeurige oplettendheid, zelfs by kinderen, die wat ouder zyn. By tedere kinderen moet men, zoodra dezelve zich openbaaren, zorgvuldig onderzoeken den toestand van het bekkeneel, voornamentlyk de fontanel, of dezelve zich verwyde en langer worde. Neemt de ziekte toe, dan groeit het overig lighaam, gelyk reeds gezegd is, zeer langzaam, de leden worden klein, teer en mager. Binnen korten tyd kan het kind zyn zwaar hoofd niet meêr ophouden, veel minder het geheele lighaam opregten; het kan zich nauwblyks verroeren, en loopt zelfs gevaar, geheel en al lam te worden; en dit is de reden, dat hetzelve, altyd stil liggende, meêr of min wanfchappen word.

Zy,

(1) Ook dit geval kan men in het aangehaalde stuk van de *Natuur- en Genees-kundige Bibliotheek* nagaan.

Zy, die langer in 't leven gebleeven zyn, hebben zelden volkomen leeren spreken, zelden een ryp verstand getoond (*), en dikwils gebreeken aan de uitwendige zin-tuigen gehad; zy zyn altoos genegen geweest tot braakingen; sommigen hebben zwaare stuipen gehad; met een woord, hun leven is elendig geweest. 'Er is weinig hoope, deeze ziekte draaglyker te kunnen maaken, schoon zulks somtyds gebeurd zy in het een of ander geval, waarin eenige van gemelde toevallen gezegd worden afweezig of draaglyker geweest te zyn. Het hoofd niet te kunnen beweegen, is alleen eene groote elende.

Uit het openen der lyken van hen, die vroeger of laater aan deeze ziekte gestorven zyn, heeft men voldoende geleerd, dat het bekkeneel, van het water, welk zich binnen in hetzelfde, van de jonge jaaren af, langs zoo meêr versamelt, zoo lang uitgezet worde, tot dat de sterkte der beenderen zulks belet. Men noemt daarom deeze ziekte te regte, het inwendig water-hoofd (*Hydrocephalus internus*). Het water heeft zich gemeenelyk onthouden in de holligheden der hersenen (*Ventriculi Cere-*

(*) Des te merkwaardiger is daarom het geval, door D. MONRO beschreeven in *medical transactions* Tom. 2. pag. 358. van een kind van agt jaaren; welk een zoo groot water-hoofd had, dat de omtrek daarvan twee voet' en vier duim' bedroeg. Het was zoo verstandig, als andere kinderen van deezen ouderdom, had een goed geheugen, en leerde gaan. M.

Cerebri), dat is, op die plaatsfen, alwaar het merg (*medulla*) der hersenen natuurlyker wyze van een gefcheiden is, zoo dat het bovenfte gedeelte van het onderfte, en de zydeleyke deelen van elkander gefcheiden zyn (*v*).

Als

(*v*) Van die foort van een inwendig Water-hoofd, by welke het water in de holligheden der hersenen verfaamd is, heeft WHYTT in een werkje, welk na zyn dood in het licht gegeven is (*observations on the drop/s in the brain*), zeer goed gehandeld, en van dit werk heb ik een omftandig uittrekzel gegeven in de Natuur- en Geneesk. Bibliothek V. D. pag. 779. S.

FOTHERGILL en WATSON (*medic. observ. and inquir. Tom. 4. pag. 20 78. 321.*) hebben ook zeer veel toegebracht tot de kennis van deeze foort van Waterzugt. Zy stemmen daarin overeen, dat de toevallen overeen komen met die, welke door wormen veroorzaakt worden. Zelden heeft FOTHERGILL dit ongemak voor het derde jaar waargenomen, mees- tentyds van het vyfde tot het tiende, en eens tusfchen het zeventiende en negentiende, twee drie, vier, oncen water zyn onder het *corpus callosum* gevonden. Kinderen, die in alle opzigten fcheenen gezond te zyn, zyn op onderscheide wyzen daardoor aangerast, en hebben binnen veertien dagen het leven daarby ingefchoten. Pyn in het een of ander deel, zwaare, en aanhoudende, hoofdpyn, een kwaade maag, zyn de zekerfte voorboden van dit ongemak geweest. HUCK en WATSON hebben hetzelfde op onderscheide wyzen by volwasfenen waargenomen. Ook by deeze is niet al- tyd eene uitwendige oorzaak voor handen geweest. Eens heeft WATSON het ongemak geneezen. M.

Als iets zeldzaams vindt men aangetekend, dat het water in de hersenen beslooten geweeft zy in afgescheide blaazen (*w*). Somtyds heeft men hetzelfde gevonden boven op de hersenen, somtyds tusfchen dezelve en het dunne hersenvlies, somtyds tusfchen dit en het dikke vlies, hetwelk insgelyks gezegd word gevonden te zyn afgescheiden van de binnen-kant van het bekkeneel, en dus plaats voor het water gemaakt te hebben: maar in deeze zeer zeldzaame gevallen heeft het water zich tefens opgehouden in de holligheden der hersenen, zoodat men, met veel waarfchynlykheid, ftellen kan, dat hetzelfde eerft in dezelve vergadert, en naderhand eenen uitgang uit dezelve gevonden hebbe. Meest-al is het water helder, fomtyds met bloed, of op den grond met etter vermengd, of ook ftinkende, geweeft. Hetzelve is gevonden, van een tot agt ponden, ja, men verzekert, hetzelfde in een klein kind waargenomen te hebben, tot de quantiteit van vier- en twintig ponden; en, in 't algemeen, is het water by kinderen in grooter quantiteit gevonden, dan by zieken van meêr jaaren. Hoe gering de quantiteit van het water zy, zoo is dezelve genoegzaam, om de hersenen geweld

aan

(*w*) Verfcheide zulke voorbeelden vindt men in de aangehaalde *Biblotheek* pag. 522., in eene aanmerking op de Verhandeling van den Heer GAUDRIUS over het Water-hoofd, verzameld. Welke Verhandeling verdient ingezien te worden, en die om deszelfs nuttigheid ook herdrukt is in *Theſaur. Diſſert. vol. 2. pag. 337.*

aan te doen, als ook de zenuwen, die uit het onderste gedeelte derzelven voortkomen, te drukken tegen het bekkeneel, welk hen van alle kanten omringt. Het bovenste gedeelte der hersenen, gewoonelyk twee of drie vingeren dik, is daardoor zoo dun geworden, als de rug van een tafel-mes, ja, als ordinair papier, zonder eenig overblyffel van de gewoone darms-wyze bogten. Als het water boven op de hersenen gestaan heeft; dan zyn dezelve in eene zeer kleine ruimte samengedrukt, en te gelyk hard geworden. Somtyds zyn zy zeer week geworden, of verteerd tot aan het bovenste gedeelte van het rugge-merg.

Het gebeurt somtyds, dat het water zich niet eerder in het hoofd verzamelt, voor dat het kind twee of drie jaaren oud is; dat het alsdan langzaamerhand vermeerdert, tot op eenen zekeren tyd, na welken het ophoudt zich te vergaderen. In zoo een geval word het hoofd eenigzins tegen de natuur aan verwydt, en sommige der bovengenoemde toevallen openbaaren zich, zonder dat men de ziekte aanstonds aanziet voor een water-hoofd. Dit gebeurt by veele kinderen, die de Engelsche ziekte hebben; deeze zyn dikwils dom, opgezet, en waterzugtig, gelykende, in veele omstandigheden, na kinderen met een water-hoofd; ja somtyds krygen zy dit ongemak ook werkelyk. Het gebrek egter, welk by zoodanige kinderen in het ligchaam omtrent het voedzel der beenderen plaats heeft, brengt ook veel toe tot de grootte van het hoofd, dewyl het beenachtig gedeelte zich mede even als uitzet.

By

By volwassenen verzamelt zich mede dikwils veel water in de hersenen; doch zonder dat het bekkeneel daardoor verwydt worde, welks grootte sterkte zulks geheel en al belet; waarom het water by hen ook nooit in eene zoo groote menigte gevonden wordt; doch des niet te min zyn de gevolgen even gevaarlyk, dewyl het water alle de hersenen en zenuwen drukt; de lyders worden slaaperig, simpel; lam; krygen eene beroerte, en sterfen schielyk (*).

Met eene soortgelyke vergaaring van water in de hersenen zyn verbonden twee andere zwaare, doch zeldzaame, gebreken, welke eerstgebooren kinderen mede ter waereld konnen brengen. Het bestaat in een week gezwel, dat somtyds overeenkomt met een' uitwas, en geplaatst is, dan aan de eene zyde van het hoofd, dan in den nek, zynde van eene verscheidende grootte, somtyds als een ey, somtyds zoo groot, ja, zelfs grooter, dan het geheele hoofd. Zulk een gezwel heeft men bevonden te bevatten een grooter of kleiner gedeelte der hersenen, in de

(*) ZIMMERMANN verhaalt, dat een zyner landslieden, die uit hoofde van zyne geleerdheid als een wonder aangezien wierd, eindelyk, even als een dier, zoodom wierd, alleenlyk daardoor, dat'er zich tuschen de hersenen en vliezen een pond water verzamelt had. De Heer Dr. ITH, die de oorzaak terstond bemerkte, herstelde zyn verstand twee-maalen door middelen, die het water afdreeven; doch eindelyk luisterde de natu'r niet meer na de genees-middelen. *Von der Erfahrung. 2. Tb. pag. 543.*

H. DEEL.

M

de gedaante van eenen zak, in wiens holligheid, welke gemeenschap had met eene der holligheden van de hersenen (*Ventriculi cerebri*), door eene, meer of min groote, opening in het teder bekkeneel, waarby het gezwel gezeeten had, het water opgeslooten was. De opening van dit gezwel, wel verre van te helpen, heeft den dood bevordert (*). Uit dit alles blykt duidelyk, dat het water, welk zich in de holligheden der hersenen begint te verzamelen, een gedeelte der hersenen persé, door de eene of andere zwakke plaats in de brosse vliezen, waarin naderhand de beenderen van het bekkeneel geformeerd worden. Dit ongemak heeft dikwils van het leven een schielyk einde gemaakt; doch is, nog niet zeer in grootte toegenomen hebbende, een- en ander-maal, volgens de gelukkige proeven van den beroemden Franschen Heel-meester **LE DRAN**, volkomen geneezen geworden, en daarom heeft men eene goede aanleiding te hoopen, van te kunnen geneezen een inwendig water-hoofd, welk zich overal even eens uitgezet heeft, wanneer het, namentlyk, nog in zyn begin is.

Het ander gebrek is, volgens zyne eigentlyke natuur, niet onderscheiden van het voorgaande, dan alleen door de plaats, welke hetzelfde inneemt. Op de

(*) **SIEBOLD** heeft in *Collect. Observat. medic. chir.* art. 1. zoodanig een gezwel, welk men *Hernia cerebri* noemt, beschreeven. Dit was grooter, dan de andere, tot hier toe waargenomen. Het kind leefde egter daar mede zes- en twintig dagen. M.

de eene of andere plaats van den rugge-graat (*), voornamentlyk op de lendenen, fomtyds digter aan het fundament, zelden op andere plaatsen van den rugge, openbaart zich een gezwel, welk, medegeevende, wanneer men 'er op drukt, daardoor duidelyk toont, water te bevatten, en daarby vergezeld gaat met eene verlamming der deelen beneden het gezwel; in welk geval de beenen meestendeels krom zyn, of kwalyk groeijen.

Gaat dit toeval vergezeld met een wanschappen, groot, hoofd; dan word het hoofd kleiner, zoodra het gezwel op den rugge geöpend is, en vergroot zich wederom, wanneer de opening van het gezwel geslooten word. Het openen veroorzaakt mede eenen schielyken dood. Een zoo klaarblykelyke samenhang is door de Ontleed-kunde in een helder dagligt gesteld. Het water, welk in de bovenste, of zydeleyke, holligheden der hersenen 't eerst verzameld is geweest, is, door de gewoone opene wegen, gedrongen in den rugge-graat, rondom het ruggemerg, en heeft het dikke vlies uitgezet, daar, waar het gezwel stondt: op den zelfden tyd zyn de naaste werel-beenderen, meer of min, van een gescheiden,

ter

(*) Zie voorbeelden hiervan bygebragt door Prof. ACREL, in de Verhandelingen van de Koninglyke Academie der Wetenschappen, vanden jaare 1748. HEUERMANN, *Bemerkungen und untersuchungen*, 1: Th. pag. 304. Nov. art. Acad. Nat. cur. T. 3. obs. 34. pag. 141. HENCKEL *Medic. und Chir. wahrnehm.* 1. Samml. th. 1. *Journal de medecine* Tom. 20. pag. 140 &c. M.

ter plaatse, daar de doorn-agtige uitsteekfels (*Spinae*) in eenen volwasfenen worden waargenomen, welke in vrugten, of eerst-gebooren kinderen, niet anders zyn, dan kraak-been, of zelfs ontbreken, zoo dat, of het water alleen het vermogen gehad heeft, om zulks te verrigten, of daarenboven ook een gebrek gewceft is in het been, waardoor het water zoo veel te gemakkelyker deszelfs groeiing heeft kunnen beletten. Vandaar heeft dit ongemak den naam gekreegen, van gespleeten rugge-graat (*Spina bifida*); en is van dien aart, dat, wanneer het zich in eenen geringen trap openbaart, en geplaatst heeft dicht by het fondament, alwaar geene regte wervelbeenderen zyn, hetzelve even zoo wel schynt te kunnen geholpen worden, als het voorgaande; doch niet zoo ligt, wanneer het gezwel zich geplaatst heeft in de lendenen; alzoö eene eenvoudige drukking het gebrek in de beenderen niet kan te regt brengen. Het zou mogelyk kunnen zyn, dat het water zich 't eerst verzamelde in de laatstgenoemde plaats, en daarna hooger opklom.

In alle genoemde gevallen heeft het ongemak zyn oorsprong en eigentlyke zit-plaats gehad in het bekkeneel: Maar men heeft ook een uitwendig water-hoofd, wanneer zich een waterachtig vogt verzameld tussehen het bekkeneel en deszelfs uitwendige bekleedselen; dewyl nu derzelven veele zyn, liggende het een op het ander, zoo kan het water zich ook op verscheide plaatsen verzamelen. In die water-zugt, welke ook by volwasfenen zich onder de huid van het geheele lighaam uitbrydt, zwelt me-

mede het aangezicht; de roos op het hoofd word vergezeld door eene soortgelyke wateragtige zwelling; hetzelfde heeft plaats by de pokjes, en dikwils by tand-pyn, vekoudheid, en andere zinkingen in het hoofd; doch in de meesten van deeze gevallen zwelt de huid, of het hairig gedeelte van het hoofd, niet zoo merkelyk; en als deeze door het water uitgezet is, dan noemt men de ziekte een uitwendig water-hoofd. Het water houdt zich alsdan op tusschen het pees-agtig uitspanfel boven het bekkeneel en het been-vlies; of tusschen dit en het bekkeneel; in welk geval de zwelling noodzakelyk laeger zyn moet, en minder medegeeven kan. Verscheide ervaaren en bejaarde Genees-heeren hebben deeze soort van water-hoofd nooit gezien, waaruit men met genoegzaame zekerheid kan besluiten, dat dezelve zelden voorkome. In sommige gevallen heeft men deeze ziekte gepaard gevonden met het inwendig water-hoofd, en dan was deeze duidelyk een gevolg daarvan. De weinige voorbeelden, welke van een uitwendig water-hoofd alleen aangeteekend gevonden worden, toonen egter genoegzaam, dat bejaarde menschen zoo wel voor hetzelfde te vreezen hebben, als kinderen.

Het water komt in het hoofd op dezelfde wyze, als op eenige andere plaats van het ligchaam. De holigheden der hersenen, gelyk alle andere holigheden tusschen de vaste deelen van het ligchaam, het zy zy groot of klein zyn, worden belet samen te groeijen, en voor droogte bewaard, door eenen fynen waterachtigen waassem, die geduurig uit de

bloed-vaten waasfemt. Men begrypt ligt, dat, hoe fyn en onmerkelyk deeze waasfem ook zy, dezelve egter, geduurig te rug gehouden wordende daar, waar hy onophoudelyk uitwaasfemt, binnen weinige dagen of maanden moet uitmaaken eene groote menigte, en, in nog langer tyd, de geheele plaats vervullen. Om een zoo groot ongemak voor te komen, heeft de alwyze Schepper eene groote menigte opflorpemde vaten gegeven, die deezen waasfem weder tot zich trekken, zoodra dezelve uitwaasfemt, en wederom tot in 't bloed brengen; zoodat hy niets meer kan doen, dan de deelen, volgens derzelve eifch, altyd vogtig te houden. Alle de overtollige of bedorven vogten worden uit het lighaam gebragt door de wegen, daartoe gefchikt. Word nu alle deeze waasfem niet weder wech gevoerd; dan word hy klaarblykelyk tot water, zynde dit de algemeene oorzaak der water-zugt, in welke plaats dezelve ook zyn moge. De naafte oorzaak kan zyn, zoo wel in de uitwaasfemende vaten; en in de veelheid, en gefeldheid van den waasfem zelve, als in de opflorpemde vaten; doch het flimft van allen is, als het gebrek in beiden gevonden word; dat gemeenelyk gebeurt, wanneer de water-zugt eenigen tyd duurt. De waasfem kan al te overvloedig zyn, als de inwendige uitwaasfemende vaten verflapt of verwydt zyn, zoodat zy meer doorlaaten, dan zy behoorden te doen; voornamentlyk indien het bloed teffens dun is; 't welk van verfchillende oorzaaken kan afhangen, als de uitwaasfeming op de oppervlakte van het

het lighaam langen tyd belet is; indien veele vogten door het lighaam worden opgeslorpt, de lugt vogtig zynde; gelyk ook van veele waterachtige spyzen en dranken, en voornamentlyk van beide omftandigheden; en by vrugten is waarfchynelyk geene andere oorzaak, dan dat de bloed-vaten gedrukt worden, zoodat het bloed te langzaam door dezelve loopt, ja, bykans ftil ftaat, waardoor niet alleen de pooren der bloed-vaten verwydt worden; maar aan het bloed in het lighaam ook hetzelfde gebeurt, als wanneer hetzelfde, na eene aderlating, op een bord ftil ftaat, dat het, namentlyk, in water verandert. De waasfem kan ook te taay en te dik zyn, zoodat hy door de zeer fyne mondjes der opflorpande vaten niet kan worden opgenomen. Deeze vaten kunnen mede de kragten verlooren hebben, om op te florpen, toegedrukt worden, ja zelfs bersten; welk laafte egter zelden gebeurt, daar de eerftgenoemde ongemakken zich zoo veel te meêr openbaaren, en zoo lange duuren, als de uitgezette deelen, veel van hunne kragten ontbreken; want zoo lange, noch de huid, noch gevolgelyk de inwendige deelen, zich fluiten in eene eenigzins gelyke digtheid, vaft aan elkander, blyven de mondjes der vaten open, of naderen niet genoeg tot den waasfem, welke opgeslorpt moet worden; behalven dat de waasfem alsdan eene ledige plaats heeft, waarin hy zich kan verfamelen; weshalven deeze omftandigheden, in alle foorten van water-zugt, in acht genomen moeten worden.

Ter geneezing van de water-zugt word in het

algemeen vereifcht , vooreerst , dat men , zoodra mogelyk is , uit het lighaam het vergaderde water uildryve ; ten anderen , dat men alle mogelyke oorzaken , waardoor hetzelfde zich op nieuws zou kunnen verzamelen , uit den weg ruime. Het eerste geschiedt gemeenelyk door middelen , welke de ontlasting van den afgang of de pis vermeerderen , en dus het oervloedige water , door eenen zekeeren omweg , uit het lighaam brengen ; doch in sommige gevallen door spaansche vliegen , dienstige insnydingen , of andere openingen , welke aanstonds uit de plaats zelve zulk water wechvoeren. Het laatste vereifcht groote oplettenheid , en word voornamentlyk te weeg gebragt door middelen , welke de deelen , die al te zeer uitgezet zyn , famentrekken , of versterken.

Volgens deeze algemeene genees-wyze moet men ook trachten te helpen de kinderen , welke op de reeds beschreeven wyze , beginnen een waterhoofd te krygen. Dikwils moet men hen geeven het *Electuarium de Manna* met Rhabarber of Jalappe , of het *Electuarium Lenitivum* , vermengd met den *Syrupus rosarum solutivus* , tot dat het de dikte van een stroopje gekreegen hebbe ; Ook kunnen zy daarenboven , door het zog van de moeder of Minne , ontlasting krygen , wanneer dezelve laxeer-middelen ingenoomen hebben. Is het kind ouder , dan kunnen onder gemelde middelen gemengd worden eenige weinige greinen van den zee-aaijn , die meer , dan eenig ander middel , het water schielyk uit het lighaam dryft , dan met de pis , dan

Man met den afgang; fomtyds door beide deeze wegen, Men heeft egter zorge te draagen, dat het kind niet geplaagd worde door braakingen; welke door den zee-ajuin ligt verwekt worden, en, in andere gevallen, van veel nut zyn kunnen; zelfs ook in dit geval, wanneer dezelve gering zyn; Doch als zy zeer zwaar en van langen duur zyn; dan brengen zy veele ongemakken te weeg; doordien de hersenen reeds door de drukking lyden; en deeze, buiten twyfel, door het geweld en de langduurigheid van het braaken vermeerderd word.

Als het water zich buiten het bekkeneel onthoudt; het welk onder de zeldzaame gevallen te rekenen is; dan wordt hetzelfde op de spoedigste en bekwaamste wyze ontlast, door eenige langwerpige insnydingen van onderen in den nek, welke open gehouden worden, zoo lange als noodig is, door plukfel met eene etter-maakende zalf; terwyl het hoofd naerftig gebaad word met kalk-water, vermengd met een weinig wyn; brande-wyn, of campher-brande-wyn; ook kunnen de spaansche vlieg-pleisters in dit geval nut doen.

Maar heeft het water zich binnen in het hoofd verzameld; dan verhaaften de insnydingen, of andere openingen van de plaats, waarin het water zich ophoudt, den dood, en moeten daarom nooit gedaan worden. De spaansche vliegen worden egter, ook in dit geval, gepreezen, voornamentlyk van den Heere VAN SWIETEN, die veel voordeel van dezelve gezien heeft in gevallen, welke hy dagt met een inwendig water-hoofd overeen te komen.

men. Onder negen deelen van het *Emplastrum de Meliloto* heeft hy laten mengen een deel spaansche vlieg-pleister, en daar mede 's kinds hoofd bedekt, na dat men het haar had afgesneeden: twee- of drie-maal daags wierd de pleister afgenomen, om het hoofd te wryven, en daardoor geraakte hetzelfde aan het uitwaassamen; zoodat de na binnengedreeven uitslag, waardoor de oogen, borst, en het geheele zenuw-gestel reeds aangedaan waren, aanstonds weder uitgekomen is.

Ondertusschen heeft men teffens en vooral zorg te draagen, dat het hoofd zich samentrekke in dezelfde evenredigheid, als het water verminderd word; 't geen, gelyk klaar blykt, veel moeilijker is, dan in weeke deelen, wanneer die door water uitgezet zyn; deeze verliezen niet zoo schielyk haare eigene samentrekkende kragt; maar de beenderen van het bekkeneel, uitgezet wordende, worden ook langs zoo meêr hard, en kunnen zich niet in eene kleinere ruimte samentrekken, dan de vliezen tusschen de beenderen in de eerste jaaren kunnen toelaaten. Indien derhalven het hoofd zich zoo zeer verwydt heeft, dat de beenderen, zelfs wanneer zy elkander aanraaken, een grooter ruimte open laten, als de hersenen vereischen; dan is alle moeite vergeefs; 'er blyft alsdan altoos eene ledige plaats over, voor het water, hetwelk, schoon het zich zelfs niet vermeerdere, nogtans de hersenen moet drukken en schadelyk zyn. Men kan ook niet hoopen, dat, de ziekte tot zulk eenen trap geklommen zynde, inwendige middelen het water

zoo volkomen zullen wech voeren, dat de hersentenen in dezelfde evenredigheid in grootte zullen toeneemen, en door hunne eigen kragten helpen, om het stilstaande water uit te dryven. Alleen in den beginne der ziekte heeft dit laatste en wezentlyke gedeelte der geneezinge plaats; en men kan daarvan alsdan het gewenschte gevolg hebben, wanneer men gebruikt de middelen, door welke een uitwendig water-hoofd, hetzelfde klein geweest zynde, hersteld is, namentlyk, veele dubbelde linnen compresen, bevoogtigd met brande-wyn, kalk-water en brande-wyn, of soortgelyk vogt, welke op het gezwel gelegd, en daarop gehouden worden, door de gewoone muts van het kind, die wel moet sluiten, en eene maatige drukking maaken. Het geen de Heer VOGEL in dezen heeft aangemerkt, verdient opmerking, dat, namentlyk, de kinderen gevallen zyn in eenen diepen slaap, die vier en twintig uren lang geduurd heeft: Nogtans heeft hem dit niet afschrikt, om voort te gaan met het gene hy begonnen had; maar hy heeft alle drie uren door prikkelende middelen de kinderen aangespoord, om zelfs onder den slaap te zuigen, en daarenboven het lyf door lavementen laten open houden; waarna de kinderen volkomen geneezen zyn. Dit schynt met eene goede hoope opgevolgd te kunnen worden, niet alleen by aangebooren water-gezwellen op den rugge-graat, wanneer zy niet groot, en dicht aan het fundament geplaatst zyn; maar ook by eene uitzetting van het gheele bekken, door een inwendig water-hoofd. Het komt egter,

egter; gelyk reeds gezegd is, en niet genoeg kan herhaald worden, hier op aan, dat de ziekte in haar begin zy; waarom vooral vereischt word, op de volgende tekenen wel acht te geeven, namentlyk, op de ongerustigheid van het kind, wanneer het regt opgehouden word; deszelfs ongewoone slaaperigheid, en de ruimte der naaden tusschen de beenderen van het bekkeneel. Het zou kunnen gebeuren, als 'er veel acht op gegeeven wierd, dat men ontdekte, deeze ziekte niet zoo zeldzaam te zyn, als de gevallen, waarin dezelve, zonder den dood schielijk te weeg te brengen, tot eenen zoo beklaglyken trap opklimt.



XXVI. HOOFDSTUK.

Van eene byzondere soort van Keel-ziekte.

DIKWILS word 'er gezegt, dat de kinderen aan onbekende ongemakken gestorven zyn. Een van deeze zal ongetwyfeld eene soort van Keel-ziekte zyn, die over het algemeen by ons zoo onbekend geweest is, en nog is, dat zy in onze taal geenen byzonderen naam gekreegen heeft. Ook weet ik niet, dat zy in andere Landen een' naam heeft, Schotland uitgezonderd, alwaar zy CROUP (*morbus strangulatorius, suffocatio stridula*) geheeten is. Zy is dus by andere volkeren even onbekend, als by ons. Van daar is het, dat men in de schriften der Gencesheeren zoo weinig gewag daar

van gemaakt vindt. De oorzaak kan ook zyn, dat zy in den beginne zoo gering is, dat de Ouders niet terstond een Geneesheer om raad vragen. De kinderen kunnen hunne ongemakken niet te kennen geeven, en als de ziekte tot haaren hoogsten trap gekomen is, dan is alle hulpe vrugteloos. Zy worden dan onverwagt wechgerukt. De Ouders hebben geene genoegzaame kennis, het begin en den aanwas der toevallen optemerken; de Geneesheeren zyn buiten staat om den loop der ziekte te kennen, en men laat hen nauwelyks ooit toe, het ligchaam na den dood te openen.

Sommige zyn egter zoo verstandig geweest, dat zy de ontleeding toegestaan hebben, en dus heeft men eindelyk kennis van deeze ziekte gekreegen. De eerste, die my daar van eenig berigt gegeven heeft, is de Hr. STRANDBERG; die uit het ontleden der lyken den waaren aart der ziekte heeft leeren kennen. Naderhand hebben meer Geneesheeren in ons Ryk dezelve waargenomen, en gekend, en te geen zy daaromtrent ontdekt hebben, heeft de Hr. WILKE, thans Stads-Doctor in *Norrköping*, in eene verhandeling, onder voorzitting van den Hooggel. Hr. AURIVILLIUS in 1764. te Upsala verdedigd, by een verzameld (x).

Deeze

(x) Van deeze Verhandeling heb ik, voor lang, een uittreksel mede gedeeld in de Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek II. D. pag. 537. en naderhand dezelve ook geplaatst in *Thesaur. Dissert.* vol. 2. pag. 347.

Deeze Keel-ziekte heeft zich niet alleen in Stockholm, maar ook omtrent Upsal, voornamentlyk op het land by het Kerspel *Rasbo*, geopenbaard, alwaar zy in de jaaren 1761. en 1762. zoo algemeen en zwaar was, dat zeer veele huizen van alle kinderen beroofd wierden. Sommige stierven den tweeden, de meesten den vierden en vyfden dag. Zy gaven veel slym op, en somtyds grooten stukken van een vlies. Kinderen, die van andere plaatsen de zieken bezogten, kreegen kort daarna dezelfde ziekte.

In het Kerspel *Fundbo* heeft zy insgelyks verscheidene kinderen gedood, en zy heeft ook geregeerd te *Hedemora* en *Särher*, gelyk ik van den Hr. Blom verneem.

In Schotland heeft men haar ook waargenomen, gelyk ik zie uit een klein werkje, door F. HOME in Edinburg in het jaar 1765. in het licht gegeven; waar van de tytel is. *An inquiry into the nature, cause, and cure of the croup* (y). Men vindt in hetzelfde deels de waarneemingen van den Schryver, deels die van andere. Ik zal my van dit en de bovengenoemde verhandeling, by deeze gelegenheid, voornamentlyk bedienen (z).

De

(y) Men kan hetzelfde naleezen in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek III. D. pag. 328.

(z) In de vorige uitgaave van dit werk, wierd dit Hoofdstuk niet gevonden. De Hr. ROSÉN gaf het in het jaar 1768. afzonderlyk in het licht, gelyk alle de andere Hoofdstukken waren uitgegeeven, eer zy by elkan-

De ziekte bestaat in een dik, zagt, witagtig vlies, welk door eene koorts in het begin van de lugt-pyp geformeerd word, en fomtyds tot in deszelfs takken zich uitstrekt. Hetzelve is niet vereenigd met het binnenste van de lugt-pyp, maar doorgaans zoo los, dat men het, na den dood, zonder moeite, even als een holle pyp, 'er uit trekken kan. Tusfchen dit vlies, en dat, welk natuurlyker wyze de lugtpyp inwendig bekleed, vind men eene etteragtige stoffe, welke ook in de takken van de lugt-pyp, en de long, waargenomen word. Deeze, in het water geworpen zynde, zinkt op den grond. In dit nieuwe vlies ontdekt men geene veezelen. Het smelt niet in een mengfel van lauw water met melk. De longen zyn in het geheel niet beschadigd, en aan het natuurlyke vlies van de lugt-pyp ontdekt men niets van eene verettering.

Wanneer kinderen door deeze ziekte aangetast worden, verliezen zy hunne gewoone vrolykheid, zyn heet op het gevoel, en sommige raaken aan het hoefen. Zy klaagen over een doove pyn boven in de lugt-pyp. Op dezelfde plaats van den den hals ontdekt men by sommigen eene geringe zwelling. Drukt men daarop met den vinger, dan veroorzaakt het pyn. Het aangezicht wordt opgeziet en rood. In de keel en flokdarm ontdekt men
niets

elkander verzameld, en tot een boekdeel gemaakt wierden. Nauwelyks was het waereldkundig gemaakt, of ik heb daar van berigt gegeven in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek IV. D. pag. 821.

niets. Zelden valt hun het slikken moeijelyk; doch de ademhaaling is lastig. Er komt koorts by met een' zeer rasen en harden pols. De dorst is groot. Somtyds hoesten zy. Dit alles neemt schielyk toe, en, eer men het verwagt, veranderd de pols, word zeer ras, maar zwak. De adem-haaling word moeijelyker en schielyker, de pyn verminderd, de hoeft houd op, en de dood volgt zeer onverwagt. Eenige moeten het bed houden; andere, in tegendeel, zyn dan beeter dan slimmer, en konnen op zyn. Een kind ging, en speelde in de Kamer, de Moeder wilde hetzelve op den schoot zetten, en toen bleef het dood. Aanmerkelyk is het, dat de kinderen in deeze ziekte tot het laatste oogenblik toe by hun verstand blyven, een ongewoon en vreemd geluid maaken, welk heesch en scherp is, en eenigermaten met dat van een' jongen Haan overeenkomt, doch het is onmogelyk hetzelve volkomen te beschryven. Hy, die hetzelve eens gehoord heeft, zal de ziekte daar uit altyd erkennen, en men moet zeggen, dat dit het zekerste teken is.

Gemakkelyk word dus de ziekte gekend, en van andere ongemakken, die door hoeft, heesheid, verkoudheid, verzeld worden, onderscheiden. Men moet dezelve niet verwarren met eene andere keel-ziekte, die byna in vergetelheid geraakt was, doch voor eenigen tyd veele kinderen in Engeland, Vrankryk, en Zweeden heeft gedood; men noemt dezelve *Mal de Gorge gangreneux*, *Cynanche pharyngea epidemica*. By deeze laatstgenoemde ziekte bespeurt men eene merkelyke zwelling in de keel,

welke

welke wit word, verzweert, en in het vuur overgaat, zoo men niet spoedig, hulpe aanbrengt. Men zie BERGIUS *Förfök til de i Sverige gaongbare fjukdomars utrönande för 1755. pag. 36.*

Dat de ziekte, welke in dit Hoofdstuk beschreeven word, eigentlyk eene ziekte der kinderen zy, blykt genoegzaam daar uit, dat men nooit waargenoomen heeft, dat iemand boven de twaalf jaaren daar door is aangetast.

De Hr. HOME is van gedagten, dat zy 't meest kinderen aangrypt, die dicht aan de Zee woonen, en fomtyds zulke, die op vogtige en moerasfige plaatfen zich ophouden. Doch zy heeft zich in ons Ryk op onderscheide plaatfen vertoont, die zulk eene ligging niet hadden, en, gelyk reeds gezegd is, in *Hedemora* en *Säther*, welke steden verre van de Zee af zyn.

Daar geene Weetenschap minder gisfingen toelaat, dan de Genees-kunde, als het leven der menschen tot haar onderwerp hebbende, maar alle onderneemingen op waarneemingen en ondervinding steunen moeten, zal ik uit de bovengenoemde schriften gevallen van kinderen aanhaalen, die of hersteld, of gestorven zyn, en opgeeven, hoe zy het gehad, en wat zy gebruikt hebben, waaruit dan eenige gevolgen kunnen getrokken worden, die tot opheldering van deeze onbekende ziekte kunnen dienen.

Eerste Waarneeming. Een kind, dat in 1755. aan deeze ziekte stierf, wierd door den Hr. MARTIN in tegenwoordigheid van de Hr. STRANDBERG

II. DEEL.

N

en

en DARELIUS geopend. Men vondt in de lugt-pyp een los vlies, welk, even als een hol pypje, daar uit genomen wierd. Inwendig was het dik en wit-agtig, uitwendig van boven rood. Hoe dieper het in de lugt-pyp zat, des te blecker zag het uit, en onder in de kleinste lugt-vaatjes was het volkomen wit. Overal kon men duidelyk bespeuren, dat het niet het binnenste vlies van de lugt-pyp, maar een geheel nieuw was. Men vondt de longen volkomen onbeschadigd, en zonder ontsteeking.

Twede Waarneeming. HOME wierd by een meisje van vyftien maanden geroepen, welk een vierde van eene meil van Zee woonde. 's Avonds te vooren had dit kind 'er niet wel uitgezien, en was heeter, dan na gewoonte. Als de Geneesheer het 'smorgens bezogt, had het eene moeiljke ademhaaling, een' harden en rasfen pols, zoo dat men honderd en vyf en dertig slagen in een minuut telde. Hy liet terstond eene ader openen, en vyf oncen bloed aftappen. De stem wierd daarop zeer scherp, en even als het geluid van een Haan; de ademhaaling schielijk, en moeiljke. Aan het voorhoofd, en binnen in de handen, was het zeer heet. De voeten en handen waren gezwollen, doch zonder roodheid. Dewyl de pols hard was, werd wederom eene ader geopend, en daarvan had het veel verligting. Men liet de waassem van warm water met een weinig azyn inademen; dit kon het gemakelyk verdraagen, en het kwam daardoor aan het opgeeven van sluimen. Het lyf wierd door de *Magnesia* opengehouden. 's Avonds plaatste men een
spanfche

ſpaanſche vlieg-pleiſter aan den hals. Den derden dag bevond het zich wat beter; doch de ſtem was, als te voren; de ademhaaling diep, en de pols hard. Dien avond zette men vier bloedzuigers onder de kin op de plaats, alwaar de lugt-pyp begint, en, nadat zy waren afgevallen, wierd de plaats, aan welke zy zich gehegt hadden, met warm water gebaad, zoo dat het bloed, geduurende vier uren, daar uit ſimperde. Den volgenden morgen was het kind gezond.

Derde Waarneeming. Een meiſje van agt-tien maanden, welk altyd gezond geweest was, wierd door dezelfde ziekte aangetaſt. Het woonde dicht aan Zee. Men liet terſtond bloedzuigers aanzetten, die vyf oncen bloed zoogen, en gaf een braakmiddel. HOME kwam by dit kind, en bevondt, dat hetzelfde het genoemde geluid alleenlyk dan maakte, wanneer het hoeſte, of den ſtem verheffen wilde. De ademhaaling was ſchielyk, en de pols zwak, doch ſloeg hondert en dertig maalen in een minuut. Het had een' droogen en hollen hoeſte. Zonder moeite kon het ſlikken, doch het had pyn, als hetzelfde het hoofd omdraaide. De pis was helder, en kreeg geen grond-zetzel. De Geneesheer ſiet haar den waasſem van warm water en azyin inademen, en een ſpaanſche vlieg-pleiſter aan den hals leggen. 's Avonds ſcheen het meiſje een weinig beter te zyn, en de hals begon week te worden. Het bragt de nagt geruſt door, en op den derden dag kwam het natuurlyke geluid weder, behalven wanneer het hoeſte, want dan maakte het

het genoemde geluid. De neus begon te loopen; en in de pis zag men kleine wolkjes. Men gaf wederom een braakmiddel. Den vierden dag was de stem nog niet volkomen natuurlyk. De pis kreeg een grondzetzel, en binnen drie of vier dagen was de gezondheid hersteld. Aanmerkelyk was het, dat dit kind na verloop van zes maanden dezelfde ziekte kreeg, doch die toen geringer was.

Vierde Waarneeming. Een kind van twee jaaren, welk voor een half jaar de pokjes had gehad, wierd zeer schielyk door deeze ziekte overvallen, en maakte terftond het daar aaneigen geluid. Men plaatste bloedzuigers, en een spaansche vlieg-pleister, voor en boven aan den hals. HOME zag het den vierden dag. De ademhaaling was toen moeijelyk; het had eene beklemming op de borst, maakte het gewoone geluid, en had voor aan den hals een gezwel. De pols sloeg hondert en veertig maalen in een minuut. Alles scheen slegt te zullen afloopen. Men maakte gebruik van den genoemden waassem, stoovingen, pappen, en bloedzuigers aan den hals. Den volgenden dag scheen het kind verligt te zyn, het wierd vrolyker, en de stem natuurlyker. Op den zesden dag was de pols beeter, de stem, als in den gezonden staat, en de zwelling was verdeeld.

Vyfde Waarneeming. HOME wierd geroepen by een kind van zeven jaaren, welke vier dagen te voren was ziek geworden. In den vorigen winter had het een' zwaaren hoeft gehad, en zes weeken te voren de mazelen overwonnen. Dikwils had het
 buik-

buikzuiverende middelen gebruikt, en was tamelyk gezond, behalven dat het nog wat hooft, tot dat het nu ziek wierd, koorts met hitte, dorst, en een ongewoon geluid kreeg, waardoor deeze ziekte zoo kennelyk is. Het had op den vierden dag een' rassen, eenigzints harden pols, doch zonder de vereischte sterkte. Zonder moeite kon het slikken, doch klaagde over pyn in de lugt-pyp, wanneer het wilde spreken, of als men met den vinger daarop drukte. Het aangezicht was opgezet, de dorst groot, en de ademhaaling diep. Het kwylde veel, en op de lippen zat schuim. In de pis was een wit, dik, grond-zetzel. Aan het hoofd mankeerde niets. Men opende terstond eene ader, en den volgenden nacht plaatste men bloedzuigers, en een spaansche vlieg-pleister aan den hals. Den volgenden dag was de pols veel zwakker, en sloeg honderd en vyf en zeventig maalen in een minuut. De ademhaaling wierd rasser, en het kind stierf den volgenden nacht, zynde tot op het laatste uur toe volkomen by zyn verstand geweest.

Wanneer het na den dood geopend wierd, vondt men geen teeken van eene ontfteeking in de keel. Doch toen men de lugt-pyp onderzoegt, ontdekte men in het bovenste gedeelte een ongewoon, zagt, doch dik, vlies, welk geheel los was, en eene stofse bedekte, die als etter uitzag. De deelen daar onder waren rood, doch men kon dezelve egter niet ontftooken noemen. In de takken der lugt-pyp waren soortgelyke vliezen, doch zagter, dunner,

en meer na etter gelykende. Men kon uit dezelve ook veel etter drukken. De longen zelfs waren onbeschadigd en gezond.

Zesde Waarneeming. Twee dagen daarna wierd hy by de zufter van het vorige kind gehaalt. Zy was vyf jaaren oud, en had 'savonds te voren over eene doove pyn in de keel geklaagt. Men had terftond eene aderlaating verrigt, haar een mengfel van den *Spiritus Mindereri* met *theriaca* gegeven, en een fpaanfche vlieg-pleifter aan de keel gelegd. Zoodra zy het genoemde mengfel gebruikt had, was zy aan het zweeten geraakt. Wanneer HOME by haar kwam, maakte zy reeds het zonderling geluid, en had eene zoo moeiljyke ademhaaling, dat de fchouders daar by werken moesten. Het aangezicht was gezwollen en rood, zy flikte gemakkelyk, de pols was ras en fterk, en zy zelve volkomen by haar verftand. Hy liet terftond bloedzuigers aan den hals plaatfen, denzelven vervolgens ftooven, gebruikte den waaffem van warm water met azyn, 't geen eenige verligting fcheen te weeg te brengen. 's Avonds was zy flimmer, en zy kon niet langer op eene en dezelfde wyze liggen. Men verwekte eene braaking door *oxymel fcilliticum*, en zy raakte zeer veel flym kwyt. Naderhand gaf hy haar zuiveren Salpeter met Campher. Den volgenden dag telde men hondert twee en vyftig pols-flagen in een minunt, en zy fcheen zwakker te worden. De amandelen waren een weinig gezwollen, en met flym bedekt. De flikking was eenigzins moeiljelyk,

lyk, en zy had geduurig pogingen tot braaken. Dikwils wilde zy drinken, doch gebruikte telkens zeer weinig. De tong was wit, en onzuiver; De ademhaaling zeer moeijelyk. Zy at eenige lepels broodfop met wyn. Men zette een weekmaakend clysteer. In den namiddag verergerden alle toevallen. Na het lavement volgden drie ontlafingen. De ademhaaling wierd moeijelyker en fchielyker. Zy wierp zich op het bed, en was zeer benauwt. De pols wierd zwakker, en kon fomtyds in 't geheel niet befpeurt worden. 's Avonds ftierf zy met volkomen verftand. Al 't geen zy zonder hoeften kwyt raakte zag 'er helder uit; doch het geen zy door middel van den hoeft loosde was dik, en geel, even als etter.

Het lyk wierd door den Hr. GIBSON geopend. De klieren aan den wortel van de tong waren gezwollen, met flym bedekt, en de ontlafte mondjes zeer wyd. De amandelen waren ook grooter, dan na gewoonte; doch men befpeurde noch aan deeze noch aan de omleggende deelen eenig teeken van ontfteeking. Rondom de opening van de lugtpyp was alles met eene dikke en taaye flym bedekt. In de geopende lugtpyp zag men ook geene ontfteeking, doch in het bovenfte gedeelte van dezelve, vooral aan den kant van de flok-darm, was een week vlies, welk voor de helft afgefcheiden fcheen te zyn, en aldaar was ook eene etteragtige ftoffe. In het ftrotten-hoofd fcheenen eenige klieren gezwollen te zyn. Lager in de lugtpyp was wel eene etteragtige ftoffe, doch geen vlies. Op de plaats, al-

waar de lugt-pyp zich verdeeld , vertoonde zich eene groote quantiteit van eene taaye witte stoffe , als men de longen een weinig drukte , welke daar mede fcheenen gevuld te zyn. Voor het overige waren deeze gezond. De maag was van binnen met veel flym bedekt.

Zevende Waarneeming. Een kind van zeven jaaren , welk zeer gezond geweest was , klaagde zederd vier dagen over eene moeiljyke ademhaaling , en eene doove pyn in het bovenfte gedeelte van de lugt-pyp, en maakte een piepend geluid. De rafse pols, en moeiljyke ademhaaling , hadden een' Heelmeester aangefpoort om twaalf oncen bloed aftetappen , en aan het zelve Ammoniak-zout met den geest van harts-hoorn te geeven. Wanneer HOME het kind 's avonds zag , was de pols zeer snel en zwak , en de ademhaaling fchielyk. Het kind voelde de pyn nog boven in de lugt-pyp. Men ontdekte geene ontfteeking in de keel. De pis had een dik grondzetzel , even als in hen , die etter in het lighaam hebben , welke geen vrye ontlasting heeft. De ftem was zwak , en het piepend geluid wierd niet meer bemerkt. Dewyl hy voorzag , dat het einde naby was , verzogt hy den Heelmeester het lyk te openen , en de lugtpyp nauwkeurig te onderzoeken.

Dees berigte vervolgens , dat 'er in de longen geen teken van eene ontfteeking was , dat hy onder de opening van de lugt-pyp eene etteragtige stoffe had bemerkt. Doch een vreemd vlies had hy niet befpeurt , en ook niet gezien , dat de takken van de lugt-pyp met etter gevuld waren.

Agt-

Agfte Waarneeming. Een kind van vier jaaren raakte aan het hoefsten, en kreeg eene fchielyke ademhaaling. Dewyl de ziekte met die, welke in dit Hoofdftuk befchreeven word, veel overeenkomt fcheen te hebben, zette men terftond bloedzuigers, en leide den volgenden dag een fpaanfche vliegpleifter aan. Het fcheen daardoor beter te worden, bleef een geheele week op de been, en had geen ander ongemak, dan dat het een weinig hoefte. Den volgenden Sondag zag HOME het voor 't eerft. Hy vondt het meer heefch, dan zy, die deeze ziekte hebben, gewoon zyn te zyn; de pols was zeer ras, de ademhaaling zeer moeiljelyk, de flikking eenigzins moeiljelyk, de hoeft gering, en droog. Hy kwam op de gedagten, dat het kind daarby eene andere Keel-ziekte had, en liet bloedzuigers, ftovingen, en andere gewoone middelen gebruiken. 's Maandags was de ademhaaling beter, en de andere toevallen fcheenen te verminderen. 's Dingsdags vondt het zich wederom erger, en ftierf.

By het openen van het lyk nam men het genoemde vlies waar. Het was wit, zeer vaft, en dik, en onder hetzelve ontdekte men eene etteragtige ftoffe, ter breedte van een' duim, welke geelagtig en nog niet droog geworden was. De vliezen van de lugt-pyp zelve waren gaaf, doch rood en ontftooken. In sommige blaasjes van de long vondt men foortgelyke ftoffe, als in de lugt-pyp.

Negende Waarneeming. Een Meisje van vier jaaren begon den 20. Octob. 1763. een weinig te

hoeften, doch kon den volgenden dag in de open lugt zyn. Tegen den avond wierd de hoeft sterker, en zy raakte aan het niezen. De Hr. Wood, die Geneesheer van het huis was, kwam toevallig daar, en zag haar speelen. Dewyl hy bespeurde, dat haar de ademhaaling moeijelyk viel, opende hy de ader, offchoon zy anders gezond uitzag. Den 21. was zy slimmer. Dus wierd 'er een spaansche vlieg-pleister aan den hals gelegd, en een ander tussehen de schouders; ook wierd een clysteer gezet. Den 24. kwam HOME by haar. De ademhaaling was kort, de pols sloeg honderd en tagtig reizen in een minuut. De pis had een dik grondzetzel. Men verhaalde, dat zy eene stoffe had opgebracht, welke men voor etter aanzag. Uit de ademhaaling besloot de Geneesheer, dat 'er nog meer voor handen zyn moest. Zy at en dronk, zonder dat het haar bezwaarde. HOME gaf haar de zee-ajuin, om braakingen te verwekken, doch zonder vrugt. Den 25 was zy even eens geschild. Hy bespeurde onder de flaimen etter. De ademhaaling was zeer kort en moeijelyk. Hy liet haar den waasem van azyn inademen, in hoope, daardoor hoeft te verwekken, doch dit deed niets, en het meisje stierf 's avonds.

Wanneer men het lyk opende, vondt men de lugt-pyp van binnen met een vreemd vlies bedekt, ter diepte van drie duimen. Hetzelve was los, en liet zich, even als een hol buisje, te voorschyn brengen. De eige vliezen van de lugt-pyp waren gaaf, en zonder verettering. De longen wierden gezond

zond bevonden; doch in de flinker was veel etter, die, geel en dik zynde, in het water op den grond zakte. Het vreemde vlies was taay, en liet zich niet ontbinden; smolt ook niet, offchoon men hetzelve twee dagen lang in lauw water met melk had laten leggen. In hetzelve kon men geene veezelen befpeuren.

Al 't geen tot hier toe opgegeeven is, heeft **HOMME** zelfs gezien en aangeteekend; doch hy deelt nog vier waarneemingen mede, welke hy van anderen ontleendt heeft, en die ik, als met de voorgaande overeenkomende, niet noodig oordeele, wydloopig op te geeven. Het zy genoeg, het byzondere daaruit aanteteken.

Tiende Waarneeming. **VARDROBE** meld in zyn berigt van een kind, dat op den vierden dag van deeze ziekte ftierf; dat het gezwel, welk het onder de lugt-pyp had, eerder van een wateragtigen, dan van een onstookken, aart was.

Elfde Waarneeming. **BALFLOUR** zegt, dat een kind, welk hy oppafte, agt dagen na elkander, eer de ziekte uitbrak, hoefte; dat hy, de bloedzuigers veel bloed uit den hals gehaalt hebbende, de kropader opende, en een ontsteekings-korft op het bloed bemerkte. Het lyk geopend zynde, fcheen 'er in de lugt-pyp eenē verettering ontftaan te zyn, doch, wanneer hy alles nauwkeuriger onderzocht, bevondt hy, dat het flym was, die de kleur van etter, de gedaante en vaftigheid van een vlies aangenomen had. Dit vlies was in het midden dikker, zoo dat

dat het ſcheen , dat daar door de geheele lugt-pyp verſtopt , en de lyder geſtikt was.

Twaalfde Waarneeming. WOOD verhaalt , dat hy by een kind , welk zefien maanden oud was , en op den zevenden dag deezer ziekte ſtierf; in de lugt-pyp , en de takken daar van veel ſchuimende , taaije , ſlym gevonden heeft , welke het vreemde vlies tot in de kleinſte takken van de lugt-pyp verzelde , en de gedaante van etter had. Uitwendig waren de longen een weinig rood.

Dertiende Waarneeming. Een meisje van negen jaaren, door deeze ziekte aangetaſt , kreeg op den derden dag een hoeft, die eenige uren aanhield, en daar door wierd zulk een vlies uitgeworpen , welk zwart was. HOME denkt , dat deeze kleur ontſtaan zy , omdat het droog was ; want in alle andere gevallen is het altyd wit en week geweest. Dit kind ſtierf inſgelyks.

Ik heb reeds eenige voorbeelden van deeze ziekte in dit Ryk aangehaalt. Dan , opdat men duidelyk zie , hoe dezelve by ons zich vertoont hebbe , zal ik uit de boven aangehaalde verhandeling die waarneemingen overneemen , welke de Provinciaal - Geneesheer in Upland , **HALENIUS** aan den Schryver medegedeeld heeft.

Veertiende Waarneeming. Een jongetje van vyf jaaren wierd onverwagts den 19. Jan. 1762. , daar hy zeer gezond was geweest , ſlaperig en heet , raakte aan het niezen , doch hoeſte niet. De twee volgende dagen lag hy dan te bed , en ſtondt dan
weder

weder op, doch was altyd heet, wierd noch slap-riger, raakte aan het braaken, niesde, en de oogen traanden. Op den vierden dag was alles even eens, doch tegen den avond wierd het slikken moeiljyk, en hy kreeg eene aanmerkelyke koorts. Tot den morgen toe kreeg hy geen geruften slaap. Den vyfden dag was de koorts zoo zwaar niet, de moeiljelyke slikking vermeeerderde. Op de tong zag men een witte, weeke, korst, en veel slym, welke deels uitgeworpen wierd, deels wechliep, en veroorzaakte, dat hy niet voor middernagt in slaap raakte. Den zesden dag kon hy beter slikken, doch de veelheid van slym maakte, dat onder de ademhaaling, die nu gemakkelyker was, een aanhoudend gerentel bespeurd wierd. De koorts was nauwelyks te bemerken. Tegen den avond genoot hy een' geruften slaap, doch niet in den nagt, dewyl de hoeft en slym hem hinderlyk was. Op den zevenden dag tegen den middag wierd hy zeer heesche, kreeg een droogen hoeft, die tegen den avond nog drooger, en zeer lastig wierd, tot dat 'er een taaye slym opkwam. Hy slikte toen zonder moeite, doch viel in een' diepen slaap, en kreeg een' ras-sen pols. Na middernagt bleef de hoeft geheel en al wech, en toen wierd hy zeer onrustig. Op den agt-tienden dag, 's morgens vroeg, wierd de ademhaaling moeiljelyker en rasser, de pols sloeg honderd veertig tot honderd vyftig maalen in een minuut, en het was niet mogelyk, den hoeft wederom te verwekken, of op cenige wyze de fluimloozing te bevorderen. De benauwtheid nam toe,
gelyk

gelyk ook de fchielyke ademhaaling , en de ouders verlooren deezen hunnen geliefden zoon. Men had gedurende de ziekte zagte buikzniverende , braakverwekkende , verkoelende , flym ontbindende , middelen gebruikt ; het kind had gegorgelt ; men had infpuitingen in de keel gedaan , men had gegeven een mengfel van olie met den geest van harts-hoorn. Doch dit alles was te vergeeffch , en men kon het niet redden. By de opening vondt men in de lugtpyp een foortgelyk vlies , als voorheen befchreeven is.

Vyftiende Waarneeming. De zufter was zeven jaaren oud. Zy bevondt zich gezond , gedurende de ziekte van haar' broeder. Niemand ftelde zich voor , dat haar hetzelfde lot treffen zoude. Men was daarom niet bedagt , by haar de ziekte voorte komen. Den vierden Febr. klaagde zy 's morgens over zwaare hoofd-pyn ; was zeer flaperig , zag rood uit in het aangezicht , had een zwaare koorts , en moest het bed houden. Zy braakte eens , raakte , den volgenden nagt , in een zagt zweet , en fliep goed. Den dag daarna tegen den middag bevondt zy zich beter , doch begon naderhand , voornamentlyk tegen den avond , te klaagen over hoofd- tand-pyn , en zwaare hitte. De tong wierd wit , zy bloedde verfcheide maalen uit den neus , doch zeer weinig. By de ademhaaling befpeurde men een geluid , het zy dezelve door den mond , het zy door den neus gefchiedde. De nagt was onrufftig. Op den derden dag s' morgens had zy walgingen. De tong was witter. In den neus , en daar dezelve ein-

eindigd , was een uitflag , welke by de huid rood , doch boven aan wit was. Twee foortgelyke blaasjes zag men ook aan de bovenfte lip. De koorts was byna niet te bemerken , doch wierd tegen den avond zoo fterk , als te vooren. Hoe meer de nagt naderde , des te moeijelyker wierd de flikking. Den vierden dag was de koorts wederom minder. Zy klaagde noch over hoofd-pyn , noch over eene moeijelyke flikking , doch zy kon de flym niet gemakkelyk opbrengen. Binnen in den mond , aan het verhemelte , was een donkere roof; de tong was witter. Tegen den avond vermeerderde de koorts weder. Door inſpuitingen in de keel raakte zy veel flym kwytt. De ſlaap , die haar anders ſcheen te verkwikken , wierd niet weinig ver hinderd , dewyl de flym taay was , en 'er eene gfoote quantiteit toe-vloede. Daarenboven liep 'er veel vogt uit den neus , waar door zy genoodzaakt wierd dikwils en op eene moeijelyke wyze te niezen. Op den vyfden dag was het even eens gefteld. De korst in den mond was dikker , en trok zich na de zyden. Tegen den avond niesde zy dikwils , en wierd daardoor volkomen belet te ſlaapen. De hoeft was minder. De flym was los , doch kwam egter niet te voorſchyn. Op den zevenden dag ſcheen zy zich eenigermate wel te bevinden , en raakte , door inſpuitingen in de keel , veel flym kwytt. Tegen den avond was zy zwak en zoo ſlaperig , dat zy de oogen nauwelyks open houden konde , doch zy kon egter uit oorzaake van de flym niet ſlaapen. Door den hoeft raakte de korst aan het zagte verhemelte

te voor een gedeelte los, doch zy kon denzelven niet kwyt raaken, dewyl het overige vast bleef zitten. Op den zevenden dag ten tien uren scheen zy wederom vrolyk te worden, zy hoefte egter, niesde, en uit den neus liep een dun vogt. Voor middernagt sliep zy niet, deels dewyl de ademhaaling moeiljelyk, en met een geluid gepaart ging, deels dewyl de slym zoo veel en zoo taay was, dat men vreesde, dat zy stikken zoude, zoo veel te meer, dewyl zy zoo onrustig en zwak was, dat zy de slym niet kon uitwerpen. Op den agtsten dag was zy wederom vrolyk, gaf somtyds de slym gemakkelyk op, en eindelyk, na herhaalde inspuitingen, verscheide stukken van de korst, zoo groot als een halve gulde, die taay, dik, aan de eene zyde van eene asch-grauwe couleur, aan de andere met bloederige streepen voorzien was. In den namiddag was de pols ras, doch te gelyk zwak, de kragten namen af, met het hoefsten kwam 'er niets te voorschyn; de stem wierd veranderd, de slym taayer, de ademhaaling schieljeker, benauwder, en zy viel in een' diepen slaap. De zwakheid nam toe, de hoeft verminderde, en bleef na middernagt geheel wech. Al 't geen zy dronk, verwekte braakingen en kwam door den neus te rug; des niet te min kon zy gemakkelyk slikken. Den negenden dag 's morgens raakte zy wederom een gedeelte van de korst kwyt.

De onrustigheid, zwakheid, de rasfe pols, en benauwde ademhaaling vermeerderden allengskens. Van verre zelfs bespeurde men een kwaade lugt, die uit de keel kwam. Het water was dun, en zag 'er uit

uit als dun bier, en liet op den grond van het glas een wit, dik, zetzal vallen. De lugt haalde zy door den mond, doch dezelve keerde weder door den neus. Eindelyk stikte zy, en stierf in den namiddag ten drie uren.

Zestiende Waarneeming. GIBSON berigt, dat een kind deeze ziekte gelukkig overwonnen heeft, na dat het veel etter opgegeeven, en een groot stuk van een vlies uitgehoest had.

Zeventiende Waarneeming. RAEF heeft aan HOME verhaalt, dat een jongetje den 5. Aug. 1764. door eene heesheid aangetaft wierd. Den agtsten wierd de ademhaaling moeijelyk; de stem veranderde, en 'er kwam koorts by. Dewyl het kind merkelyk uitwaasfemde, wierd een mixtuur met den *Spiritus Mindereri* gegeven. Den negenden was de pols rasfer, doch het kind kon met den hoeft niets opgeeven. Men stelde eene aderlating in het werk, zette een lavement, plaatste aan den hals een spaansche vlieg-pleister. Den elfden raakte het door den hoeft een stuk van een vlies kwyf, twee duimen lang, dat zeer taay was, en even als een stuk dun, wit, leder uitzag. 's Avonds zag men duidelyk, dat de slym, die uitgehoest wierd, met etter vermengt was. Het kind kreeg zyne stem, in drie maanden, niet weder.

Onzeker is het, of het kind, waar van STARR in *Philosoph. Transact. n. 495. art. 6.* spreekt, deeze zelfde ziekte had. Het was tien en een half jaar oud, toen het ziek wierd, gaf dikwils door den hoeft een vlies op, doch verloor evenwel ein-

II. DEEL,

O

delyk

delyk het leven. Men heeft niet aangeteekend, hoedaanig het geluid geweest zy, welk het maakte, doch het bleef tot den dood toe volkomen by zyn verstand.

Agttiende Waarneeming. In 1761. regeerde deeze keel-ziekte in *Fahlun*. De beroemde Heelmeester by het Bergwerk JOH. JAC. SCHULZ heeft my daar van een berigt gegeven. Ik zal alleenlyk hybren-gen de gevallen, die iets byzonders hebben.

Een meisje van agt jaaren klaagde over eenig ongemak in de keel, doch ontdekte dit slegts aan eene meid. De ouders bemerkten niet, dat zy zich niet wel bevondt. Vier of vyf dagen daarna at zy met zeer veel smaak eene soep met roozen-bottels. Denzelfden dag 's avonds ten agt uren wierd zy schieelyk ziek, kreeg eene benauwde ademhaaling, vooral by de inademing, en maakte dan het reeds dikwils genoemde geluid. Men gaf haar conserf van vlier met campher. Op de keel wierd een weekmaakende pap gelegd, men bediende zich van rhabarber, een spaansche vlieg-pleister, en den waasem van weekmaakende kruiden. Den volgenden morgen gaf men haar zout van harts-hoorn, en in den namiddag het *oxymel simplex* met het *oxymel squilliticum*. Niets verschaftte eenige verligting. Het kind slikte zonder moeite. Aanmerkelyk was het, dat zich geen koorts openbaarde. De pols was ongelijk, en dikwils niet te bemerken. Den dag daarna 's morgens ten vier uren stierf het kind, dus de hevigheid der ziekte niet langer dan twee en dertig uren duurde.

Uit-

Uitwendig op de borst aan de derde en vierde ribbe zag men eenige kleine roode streepen, doch geene zwelling op deeze plaats, of aan den hals. De longen waren onbeschaadigd. Agter na den rugge waren zy donker van kleur, en als met dik bloed gevuld. Anders bespeurde men geen teken van eene ontsteeking noch in de longen noch in de lugt-pyp. Doch deeze was inwendig met een vreemd vlies bedekt, welk, tegen 't geen men gewoonlyk ziet, op eenige plaatfen vry vast vereenigt was. Boven in de lugt-pyp was een weinig etter, die egter geen reuk had.

Negentiende Waarneeming. Een meisje van zes jaaren, welk eene goede stem had, om te zingen, wierd zonder klaarblykelyke oorzaak heesch, doch scheen anders gezond te zyn. Eenige dagen daarna, en wel den 13. Nov. 1761. wierd zy 's avonds ziek, kreeg eene moeijelyke ademhaaling, en maakte een byzonder geluid, wanneer zy de lugt inademde. Men stelde terstond eene aderlating op den arm in 't werk, en vier oncen bloed wierden 'er afgetapt, doch zonder eenige verligting. Men gaf *oxymel*, gelyk ook buikzuiverende middelen, en liet den waassem van weekmaakende kruiden gebruiken, doch alles te vergeefs. Koorts bespeurde men niet. De pols was dikwils niet te bemerken. De pis, die in eene geringe quantiteit geloofd wierd, was even als water. Des morgens dronk zy thee, en dunne soepen, 's namiddags, en vooral 's avonds wilde zy niets duns genieten, doch kauwde pruimen en rosynen. Op den dag was zy niet benauwt,

maar vermaakte zich met speel - goed. Doch tegen den nacht was zy ongeduurig, en kon niet lang aan een slaapen. Dewyl zy dikwils kleine vliezen en veel etter uithoefte, dagt men, dat zy heritellen zoude. Doch den 21. Nov. stikte zy, terwyl zy op den schoot van de meid zat.

By het openen van het lyk vondt men uitwendig niets veranderd ; de longen waren onbeschadigd. In de lugt-pyp vondt men het vlies, waar van reeds dikwils gesproken is, welk zeer los zat. Boven in de lugt-pyp, gelyk ook in deszelfs takken, was eene schuimende, geelagtige, etter.

Twintigste Waarneeming. De zufter, die vier jaaren oud was, bevondt zich toen op het land, doch men bragt haar na de Stad, wanneer het lyk van het meisje begraven wierd. Zy bleef eenige dagen in de Stad, en wierd toen naar het Land terug gebragt. Den volgenden dag wierd zy ziek, en moest zich te bed houden. Zy braakte, en onder dat geen, welk zy kwyte raakte, was ook bloed. De ziekte ging voor het overige op denzelfden voet voort, als in het voorgemelde geval. Men kon haar niets laten gebruiken, en zy stierf, vier en veertig uren ziek geweest zynde.

Toen men het lighaam na den dood opende, vondt men in de lugt-pyp en in de takken daar van een soortgelyk vreemd vliës, en veel dunne etter.

HOME heeft opgemerkt, dat, offchoon dit vlies in lyken aan deeze ziekte gestorven, zich op geene andere plaats van de lugt-pyp vertoont hebbe, men het egter gevonden heeft aan dat gedeelte, welk na den

den flok-darm gekeerd is, alwaar de kraakbeenige ringen ontbreken, en de meeste klieren haare zitplaats hebben.

Uit al 't geen tot hier toe bygebragt is, zal men deeze keel-ziekte gemakkelyk kunnen onderscheiden. Dus, wanneer een kind begint ziek te worden, over een doove pyn in de lugt-pyp klaagd, en hetzelfde moeijelyk adem schynt te haalen, dan moet men nauwkeurig onderzoeken: 1. of deeze keel-ziekte regeere? 2. of de lugtgesteldheid vogtig en koud geweest zy, of nog zy? 3. of het kind zederd eenigen tyd verkouden geweest zy, den kink-hoest, pokjes, mazelen, gehad hebbe? 4. of men eene hitte en dorst bemerkt, en of het aangezicht gezwollen zy.

Zyn de gemelde omftandigheden tegenwoordig, dan heeft men reden voor deeze ziekte te vreezen. Doch op dat men daaromtrent des te zekerder zy, onderzoekt men: 1. of men aan de keel eene zwelling bemerke? 2. of deeze plaats gedrukt wordende gevoelig, of pynelyk zy? 3. of het kind zonder moeite slikken konne? 4. of de ademhaaling moeijelyk en schielyk zy? 5. of de pols in het begin der ziekte ras, hard, en fterk, doch na verloop van eenige dagen ras, week en zwak zy geworden? 6. of de hoeft, zoo deeze zich openbaard, schielyk, en even als stikkende zy? 7. of de stem heesch, scherp zy, zoo niet altyd, ten minften, als het kind schreid, hoeft, of roept?

Volgens deeze beschryving onderscheid men de ziekte gemakkelyk van andere, die daar mede

214 *Van eene byzondere foort van Keel-ziekte.*

eenige overeenkomst hebben , voornamentlyk van die , waar in het bovenfte gedeelte der lugt-pyp ontflooken is. Want vooreerst is deeze geene ziekte , aan kinderen eigen ; ten anderen gaat zy vergezeld van eene zeer moeiljelyke slikking , en ten derden voegd zich daarby eene brandende , en byna ondraaglyke pyn ; ook ontdekt men uitwendig aan den hals geene zwelling.

Voor zoo verre men uit de opgegeve waarneemingen oordeelen kan , bestaat dit ongemak in eene foort van zinking , die de lugt-pyp aandoed , en waarin de klieren , die in de lugt-pyp , en vooral aan dat gedeelte , alwaar de kraakbeenige ringen ontbreken , gevonden worden , zeer veel flym afzonderen , die naar den kant , dien de lugt aanraakt , vast en vliezig word , doch aan dat gedeelte , welk naar het inwendige vlies van de lugt-pyp gekeerd is , met hetzelfde zich niet vereenigen kan , dewyl aldaar by aanhoudenheid flym vergaderd word , en deeze de famengroeiing belet. Dit is zeer waarfchynlyk , daar men aan de vliezen van de lugt-pyp zelve geene verzwearing heeft konnen befpeuren (*).

Het is niet ongewoon , dat foortgelyke vliezen
uit

(*) In de keel-ziekte , door het vuur verzelde (*angina gangrenosa*) gebeurt , het dikwils , dat het inwendige vlies van de lugt-pyp zich afscheid , en uitgeworpen word. *Journal de Medecine* 1768. pag. 202. MARTEAU DE GRANDVILLIERS *Defeription des maux de gorge epidemique & gangreneux.*

uit flym geformeerd worden. Men vindt een voorbeeld in *Philosoph. Transact. abridged. vol. 3. pag. 60.* HALLER *Elem. Physiol. vol. 3. pag. 149.* haalt 'er verscheide aan. Soortgelyke zyn ook in de darmen ontftaan, en met den afgang geloofd, dit gebeurde aan den Hoogel. LIPSIVS, zoo dat hy vreefde, alle de darmen kwyt geraakt te zyn, tot dat HEURNIVS hem anders onderregte. Meer voorbeelden heeft HALLER *lib. cit. vol. 7. pag. 157.* Men vergelyke ook de verhandeling van WARREN over flym-proppen in de lugt-pyp in *Medical Transact. vol. 1. (b).* Zulk een ongemak komt ook fomtyds aan de blaas over, als de flym taay en hard word, of, ontlaft zynde, in het glas zoodanigee-
ne natuur aanneemt, dat men hetzelve kan omkeeren, zonder dat die daaruit loopt, waar van ik een voorbeeld gezien heb. Door LIEUTAUD word dit *catarrhus vesicae* genoemd.

De oorzaak van eene zinking op de lugt-pyp, is wel eene koude en vogtige lugt, doch waarom dezelve de lugt-pyp meer dan andere deelen aandoed, kan ik niet bemerken. De dampen, die uit Zee opkomen, kan men niet beschuldigen, gelyk HOME doet, dewyl deeze ziekte zich ook op plaatfen, zeer verre van de Zee gelegeen, vertoont.

Daar

(b) Men vindt dit vertoog in de Natuur- en Geneesk. Bibliotheek. IX. D. pag. 259. De Hr. MURRAY heeft zoodanig een geval medegedeeld, en over dit ongemak breedvoerig gefproken in *Comment. Nov. Societ. Scient. Götting. vol. 4. pag. 44.*

Daar de lugt-pyp in deeze ziekte met veel slym en een vreemd vlies aangevuld, en daardoor zoo vernauwt word, dat de lugt door dezelve niet zonder moeite kan passeeren, is het geen wonder, dat den lyderen de ademhaaling moeijelyk, en hun geluid zonderling is; en, dewyl het bloed, in zulk een geval, niet zonder hinder van het hoofd te rug keeren kan, moet het aangezicht ook groot en gezwollen zyn.

Dat de ziekte besmettend zy, leerd men uit verscheide der aangehaalde Waarneemingen, voornamentlyk uit de twintigste, en uit dat geen, welk in het Kerspel *Rasbo* is voorgevallen.

Uit het derde geval ziet men, dat iemand, die eens deeze ziekte gehad heeft, door dezelve wederom kan aangetast worden. De pols is in de eerste dagen gemeenelyk ras, hard, sterk, het aangezicht is rood en opgezet; bloedzuigers en aderlaatingen brengen dan voordeel aan. Na den dood heeft men somtyds de lugt-pyp ontstoken gevonden, en ook op het afgetapte bloed een dikke korst waargenomen. waaruit men besluiten kan, dat de ziekte dan door ontsteeking verzeld word, en ontlastende middelen vereischt. Doch, nadat dezelve eenige dagen geduurt heeft, word de pols ras, zwak, en slap, de benauwdheid vermeerderd, de kragten verdwynen, de slym word opgehoopt, en krygt de gedaante van etter, welke de takken van de lugt-pyp vult, de ademhaaling, en omloop van het bloed door de long, moeijelyker maakt. Den eersten tyd noemt HORME dien van van ontsteeking (*stadium inflammatorium*),

rium), den laafsten dien van verettering (*Stadium purulentum*). In het eerste tyd-perk is nog eenige hoop, in het laafte in het geheel geene. Het eenige, dat men alsdan wenfcht, is, dat het vlies en de etter uitgehoeft worde; offchoon ook dit zelden geholpen heeft. Men vergelyke de dertiende, zestiende, zeventiende, en negentiende. Waarneemingen.

Men ziet hier uit, hoe noodzakelyk het is, beide deeze tyd-perken van elkander te onderscheiden, zoo wel ten opzichte van de hoop; die men hebben kan, als in aanzien van de keur der genees-middelen. Somtyds zyn zy moeijelyk te onderkennen, en in dat geval geeft HOME den raad, dat men onderzoekte, of de pis een wit, etteragtig, grondzetzel hebbe. Heeft dit plaats, dan is reeds het tweede tyd-perk begonnen, en dus weinig of geen hoop meêr overig; alle ontlastende middelen zyn dan fchakelyk; en verhaaften den dood. Vooral moet men op alle deeze tekenen wel acht geeven, wanneer de ziekte langzaam begint, en iemand als verrast, of even als eenetufchenpoozende koorts een aanvang neemt. Men is anders zonder zorg; en eer men het denkt, is de lyder buiten hoop en fterft. Zie de vyftiende Waarneeming. De ouders zien daar uit, hoe nodig het is, terftond en met het begin der ziekte, kundige lieden raad te vraagen.

Het voornaamfte en kragtadigfte middel, welk men tegen deeze ziekte gebruiken kan, is de aderlaating. Dezelve moet terftond gefchieden, en zulk eene quantiteit bloed moet 'er worden afge-

tapt , dat de pols bedaare. Zoo dezelve zich na eenige uren wederom verheft , dan moet de aderlaating herhaald worden ; gelyk uit de tweede Waarneeming blykt. Doch is het tweede tyd-perk reeds begonnen ; dan moet dit middel niet in het werk gefteld worden , gelyk eens , onvoorzigtig , gefchied is. Zie de vyfde Waarneeming.

De aderlaating verrigt zynde , moet men bloedzuigers aan den hals plaatfen op de lugtpyp. Deeze brengen in dit geval , hetzelfde nut aan , als in het zyden-wee , wanneer zy op de pynelyke plaats gezet worden , of in de oog-ontfteeking , als men dezelve rondom de oogen plaatft.

Verder moet men een aftrekfel van vlier-bloemen bereiden , dit met een weinig azyn (*) vermengen , hier in een fpons doopen , dezelve voor den neus houden , of op de borft leggen , zoodat de lyder den waasfem daarvan inademen konne , deels op dat de fym losgemaakt , deels op dat de hoest verligt worde.

Een fpaanfche vlieg-pleifter kan de zinking op de lugt-pyp verminderen , en dezelve naar de huid afleiden. Men moet dezelve daarom in den nek , of aan de zyden van den hals leggen , doch niet vooraan den hals , alwaar men de bloedzuigers plaatft.

Men

(*) De Hr. BERGIUS heeft den waasfem van azyn in deeze ziekte zeer kragtig bevonden , en heeft daarom de zieke kinderen laaten ruiken aan een doek , in azyn gedoopt , en daarenboven de bedlakens en floopen met azyn befprengt.

Men weet, welke voordeelen zulk een middel in zinkingen, die op de tanden vallen, in de gewoone keel-ziekten, en in andere zinkingen, aanbrengt; en daarom verwacht men ook in dit geval daar van goede uitwerkingen. Doch te vooren moet de aderlaating in het werk gesteld worden, en de bloedzuigers moeten hunne werking verrigt hebben.

Zoo iemand deeze genees-wyze te hard mogt voorkomen, zoude men om den hals een maatig warme pap van weekmaakende middelen kunnen leggen, waar onder men gestooten mostaart-zaad zoude kunnen doen. Men laat dien zoo lang leggen, tot dat de huid rood en ongelyk word. Dan laat men het mostaart-zaad wech, en gaat met de pap voort, welke men zoo dikwils veranderd, als dezelve koud word. Zoodanig een pap kan bereid worden, uit zes lood bladeren van kaasjes-kruid, die men in water tot een pap kookt, en daar by doet men, de bladeren genoegzaam gekookt zynde, een half loot gestooten mostaart-zaad.

Het is ook noodig, dat het lyf open gehouden worde, en dit oogmerk bereikt men door lavementen, of ook door dagelyks te geeven een klein lepelkje vol van het *electuarium lenitivum*: of versche *pulpa castæ*, of de *magnesia alba* met zuiker. In zuivere wey kan men ook een weinig manna-zuiker laten smelten, en het kind daarvan laten drinken.

Uit de zesde, zeventiende, en agttiende Waarneeming ziet men, dat zweet-dryvende middelen beproefd zyn, waarfchynelyk met oogmerk, om de vogten afteleiden. Doch daardoor heeft men
niets

220 *Van eene byzondere foort van Keel-ziekte.*

niets gewonnen. Braak-middelen fchynen ook niets uitgericht te hebben.

Of in de uiterfte nood eenig nut van het openen der lugt - pyp te wagten zy , zal de tyd en onder- vinding moeten leeren ; gelyk ook of het uithoeften van het vlies door berookingen met peper in het ver- trek zoude kunnen bevorderd worden.

Uit de berigten , welke in 1769. op den Ryks- dag van den toestand der Geneeskunde gegeven zyn , ziet men , dat ook eenige der Doctoren in de Provintien deeze keel-ziekte insgelyks waargeno- men hebben , vooral WAHLBOM , en ENGSTRÖM. Hunne waarneemingen zyn leezenswaardig. 'Er blyft nog overig te weeten , waarom de lugt-pyp in deeze ziekte zoo ongevoelig is , en te bepaalen den tyd , wanneer het vlies zich heeft geformeert.



XXVII. HOOFDSTUK.

Van de Schurft.

KINDEREN van voornaame en ryke lieden heb- ben zelden Schurft: Daarentegen is dezelve by geringe of arme lieden dies te gemeener. De eerftgenoemde worden genoeg opgepaf; de kamer , waarin het kind is , wordt zuiver gehouden; de Minne heeft rykelyk haare verfchooning; ook kan zy het kind zuiver houden , en dikwils van neus- doeken , luuren en zwagtels veranderen. De laaft- genoemde zyn niet in ftaat zich dit alles aan te fchaf- fen;

fen; zy hebben het vermogen niet, en konden dus niet zeer zindelyk zyn (c).

Des kan de morsigheid aangemerkt worden, als eene oorzaak van de Schurft. De tweede oorzaak is de besmetting, die niet door de lugt, maar van den eenen mensche op den anderen, voortgeplant word; het zy hierdoor, dat hy, die den uitslag heeft, eenen anderen aanraakt, die daarvan vry is, of door kleederen; waarvan de onbesinnette zich bedient, of die hy alleenlyk aangeraakt heeft (*). Wanneer slegts iemand, die eenige blaasjes heeft, het kind eenigen tyd op de armen draagt; dan wordt het reeds dikwils daardoor besmet. Heeft de

(c) Ontstond de Schurft uit de onreinigheid, gelyk veelen willen; dan zoude ontegenzeglyk meest al het gemeene volk dezelve moeten hebben; doch, dagelijks ziet men, dat zy zoo wel onder ryken, als onder armen, waargenomen worde; een bewys, dat, door zich zeer zuiver te houden, deeze ziekte niet kan worden voorgekomen. Dit is egter zeker, dat de Schurft in menschen, die zich weinig reinigen, veel moeilijker te geneezen is, en veel langer onderhouden word.

(*) In America zyn 'er veele, vooral de zwarten, geplaagd met eene soort van uitslag, verzeld met zweeren en blaasjes, die even als aardbeijen uitzien, welke daarom *Frambæsia Americana* genoemd word. Dit ongemak word deels door de aanraaking voortgeplant, deels door eene vliege, die naast een zweer zich geplaatst heeft, en van daar na een gezond mensch gevloogen is. SAUVAGES *Nosol. Meib. Tom. 3. p. 2. pag. 429.*

de wafch-vrouw, of zy, die haar helpt, of zelfs die de kleederen van het kind voor den dag haalt, een' uitflag; dan kan hetzelfde insgelyks de schurft ligt krygen.

De Schurft zelve bestaat niet in eene uitwaasfeming, of in eene aangebooren of verkreegen fcherpte, noch in eene zout- of zuur-agtigheid van het bloed; neen, maar zy komt voort van kleine levendige insecten (*acari* LINN. *Fauna suecica* 1191. en 1195.), die zich in het lighaam tusfchen de opperhuid nestelen, aldaar groeijen en vermeerderen, door hunne prikkeling, of voortkruiping, eene jeukte veroorzaaken, en door middel van den daarop volgenden toevloed der vogten, eene meenigte blaasjes voortbrengen, welke, gewreeven wordende, of derzelver dunner water uitgewaasfemd zynde, eene korst krygen. Dit is geen gevoelen, uit kortswyl aangenomen, maar is gegrondt op de ondervinding. AUGUST. HAUPTMAN, BONOMO (*d*), SCHWIEBE en andere geloofwaardige mannen, hebben dit te meêrmaalen, op verscheide tyden van het jaar, by menschen van ongelyke jaaren en gellachte, die met de Schurft geplaagd waren, onderzocht, en deeze diertjes op de huid zelve, in de rimpelen der huid, doch voornamentlyk om de randen der blaasjes gevonden. Zy hebben dezelve 'er uit genomen, door het vergroot-glas beschouwd, uitgetekend, en opgemerkt, hoe zy eijeren gelegd, zich

(*d*) De waarneemingen van deezen Schryver vindt men, onder anderen, ook in de *Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek*, II. D. pag. 607. noote (*).

zich schielijk en ontelbaar vermeerderd, en eenige dagen buiten het lighaam geleefd hebben.

Hieruit begrypt men:

1. Waarom de Schurft zoo ligt besmet? Alleen door het aanraaken kunnen deeze diertjes van den eenen mensche tot den anderen komen.

2. Waarom de onreinigheid de Schurft vermeerderd? By dezelve komt dit ongedierte het best voort.

3. Waarom kinderen meer aan de Schurft onderworpen zyn, dan volwasene? Omdat derzelver huid weker en spons-agtiger is, zoodat het ongedierte gemakkelyker onder de opper-huid insluipen kan.

4. Waarom de uitslag 't eerst aan de handen uitbreekt? Met deezen raaken wy 't eerst aan andere menschen en kleederen, die met dit ongedierte behebt kunnen zyn. Bestond de Schurft in eene scherpte of zout-agtige gesteldheid van het bloed; dan zou zy zich het eerst moeten openbaaren aan de plaatsen, daar wy 't meest zweeten.

5. Waarom het noodig is, zich dikwils, vooral des avonds, te waschen? Wy spoelen alsdan wech de diertjes, die nog in de rimpelen der huid verborgen zyn, eer zy onder de opper-huid kunnen insluipen. En dewyl wy altoos meer dingen over den dag, dan des nagts, met de handen aanraaken; zoo ziet men, waarom men de handen veel meer des avonds, dan des morgens, te waschen hebbe.

6. Waarom de Schurft door de koude na binnen gaat,

gaat, doch uitkomt, als wy ons door sterke beweging verhit hebben? Dit ongedierte heeft een' afkeer van beiden.

7. Waarom de jeukte alleenlyk af en aan bemerkt word? Dewyl deeze diertjes eeten en zich bewegen op zekere tyden, en zich tusfchen beiden stil houden.

8. Waarom de Schurft zich vermeerdert, en van plaats aan het lighaam verandert? Omdat deeze diertjes van verblyf-plaats verwisfelen, en zich zeer fterk vermeerderen.

9. Waarom de Schurft niet noodzaakelyk is? Deeze diertjes zyn niemand aangebooren, maar komen van buiten. Met hetzelfde recht zou men anders kunnen zeggen, dat venus-ziekten, de pokjes, de mazelen, en de kink-hoest, voor elk en een ieder noodzaakelyk zyn, daarwy die nogtans ontgaan kunnen, indien wy ons voor de befmetting in acht neemen.

10. Waarom de jeukte en fchurft verdwynt, wanneer men 'er opfmeert genees-middelen uit olie, zwavel, kwik, lood, knof-look, alant-wortel, tabak, loog van wyn-fteen-zout, en diergelyken? De infecten worden daarvan gedood, of zy vlieden daar voor, en begeeven zich in het lighaam: Van daar ziet men ook; met welk gevaar men foortgelyke middelen alleen uitwendig gebruikt.

11. Waarom de Schurft zoo ligt weder komt? Omdat de befmetting zeer gemakkelyk gefchiedt. Daarenboven is het ons onbekend, hoe lange deeze dieren in de kleederen kunnen leeven. Trekt men
deeze

decze weder aan, eer zy gestorven zyn; dan tast ons de ziekte op nieuws aan. De diertjes, die aan de huid zitten, kunnen reeds uitgebroeid zyn; daar, integendeel, die, welke zich dieper verborgen hebben, na eenen korten tyd weder te voorschyn komen kunnen.

12. Waarom het kind, 't welk de Minne met meel poederde, volgens de waarneming van den lyf-artz en Ridder VAN LINNÉ (*), op die plaats aanstonds een' uitflag kreeg? Omdat in het meel soortgelyke diertjes zich ophouden.

13. Waarom de schurft verslimmert, wanneer men zich krabt? Dewyl men, deels zich zelve daar door pyn verwekt, en deels deeze diertjes verontruft worden, waar door zy meer in beweging komen en van plaats veranderen.

14. Waarom een enkel mensch, die de schurft heeft, eene geheele armée kan aansteeken? Omdat deeze diertjes zich ontallyk vermeerderen, doch het meest daar, waar de reinigheid bykans onmogelyk is.

15. Waarom zy, die zich in groote ziekenhuizen, of in gevangenissen bevinden, ligt de schurft krygen? Dewyl men, voor eerst, aldaar alle soorten van menschen aanneemt, waarvan sommigen de schurft medebrengen, en de overigen besmetten kunnen: voorts kan men, daar zoo veele menschen
liggen,

(*) Men zie *Differtatio Exanthemata viva in Ament. Acad. vol. 5. p. 95. M.*

II. DEEL.

P

liggen , niet genoeg op de reinigheid letten ; behalven dat de gelegenheid ontbreekt , om van kleederten te veranderen , en schoone aan te doen.

16. Waarom de schurft gemakkelyker des zomers , dan des winters , te geneezen is ? Omdat de koude de diertjes dieper in het lighaam dryft ; doch de maatige warmte des zomers dezelve lokt na de huid toe , zoo dat men hen beter naby komen kan , om hen te dooden. Des zomers beweegen en verhitten wy ons meer : zy vlieden voor eene sterke hitte , en komen daarom voor den dag.

17. Waarom de Vrouwen de schurft schielyker geneezen dan de Geneesheeren ? Omdat de laatsten te veel geleezen en te veel ondervinding hebben , en de eersten aanstonds met het smeeren in de weer zyn , en niet verstaan , wat het te zeggen hebbe , wanneer de schurft inslaat.

Ik heb veele middelen tegen de schurft beproefd , en eindelyk bevonden , dat niets meerder zeker zy , dan het geene ten allen tyden geroemd geworden is , namentlyk , de zwavel in- en uit-wendig gebruikt (e) : Het is bekend , dat de Insecten daar van sterven. Merkwaardig is het , dat de zwavel , die anders geen reuk heeft , alleen door de warmte van ons lighaam eenen reuk van zich geeft , en dat
ons

(e) Het *Unguentum Enulatum cum Mercurio* word ook met veel voordeel gebruikt , en in het algemeen zyn de in- en uit-wendige kwik-middelen niet te veragten. Het *Semen Sabadillos* , in een *linimentum* gedaan , word ook zeer voordeelig bevonden.

ons zweet gelyk zwavel ruikt, als wy dien ingenomen hebben. Van daar word het goud en zilver zwart, wanneer men het als dan by zich draagt. Deeze uitwaasfemingen, of deeze reuk is het, dien deeze diertjes schuuwen, en waar van zy fterven; en uit dien hoofde is dit middel in de schurft aan te merken, als een onfeilbaar middel (*Specificum*). Wil men derhalve een kind van de schurft geneezen; dan heeft men zorge te draagen:

1. Dat het vertrek zuiver gehouden worde; dat men 's kinds kleederen dikwils wasche, en verander; dat de Minne zelve, of de Moeder zuiver zy; en dat niemand het kind aanraake, die deezen uitflag heeft.

2. Dat het vertrek matig warm zy.

3. Dat het kind in warme melk, of in het zog der Minne, van twee tot tien grein', of meêr, na deszelfs ouderdom, twee- of drie-maal daags inneeme, fyn-geftoote en gezifte bloem van zwavel. Brengt dezelve ontlastingen te weeg, gelyk fomtyds gebeurt; dan geeft men kleinere giften.

4. En zoo dit niet binnen agt dagen mogt helpen; dan bereidt men eene zalf van bloem van zwavel en zoeten room, en besmeert daarmede alle morgen alleenlyk 's kinds geleedingen aan handen en voeten, tot dat de schurft volkomen overwonnen is. Doch op dat dezelve niet zoude inslaan, gaat men, geduurende het smeeren, des niet tegenstaande voort, aan het kind inwendig de bloem van zwavel, even-als te vooren, te geeven; en even daarom smeert men des morgens, omdat men over dag

inneemt. Op deeze wyze komen de infecten als ware het tusſchen twee vuuren, en moeten ſterven. Men kan te voren een laxeer-middel inneemen, de maag en darmen onzuiver zynde; doch anders is het overtollig; want door laxeer-middelen is de ſchurft nog nooit geneezen geworden, ten zy zy langzaam gewerkt hebben, in het bloed gekomen zyn, en het een of ander hebben bevat, 't geen de infecten doodt, of verdryft (*f*).

Is het kind nog zoo jong en teder, dat men aan hetzelve niet gaerne genees-middelen ingeeven wil; dan is het genoeg, wanneer de minne, dagelyks twee- of drie-maal, in warme melk bloem van zwavel neemt, zoo veel, als men met de punt van een mes vatten kan. Ik weet door de ondervinding, dat dit geholpen heeft.

Wanneer de uitſlag zeer ſterk is, by voorbeeld aan de voeten, heb ik tegen dezelve kool-bladen laten

(*f*) Het is egter van groot nut, nu en dan een zagt laxeer-middel voor te ſchryven, vooral indien de zwavel geene ontlaſtingen verwekt, 't geen in ſommige lyders geſchiedt.

Ik kan hier, ten opzigte van alle ſoorten van uitſlag, aanmerken, dat men zeer onvoorzigtig handelt, wanneer men, gelyk de gemeene man gewoon is, dien door uitwendige ſmeerſelen zoekt te vrdryven; veele kinderen hebben daar door het leven verloren, en anderen zyn voor altyd ongelukkig geweest. Het veiligſte is, in alle ſoorten, het lighaam door bloedreinigende, en zachte buik-openende, middelen te zuiveren, en dan te gelyk tot uitwendige middelen toeylugt te neemen.

laaten leggen met een gewenscht gevolg. De ver-
zweeringen geeven in den beginne veel vogt, doch
droogen, en geneezen schielyk. De handen kan
men schielyk zuiver krygen, als men dezelve twee
dagen lang eenige reizen met een afkooksel van je-
never-bessen wascht.

Hoe die soort van schurft geneezen worde, wel-
ke de kinderen van hunne Ouders of Minne kry-
gen, zoo deeze de Venus-ziekte hebben, kan men
in het Hoofdstuk over de Venus-ziekte zien.




XXVIII. H O O F D S T U K.

Van het Ongedierte op het Hoofd.

DE kinderen haalen zich het ongedierte op den
hals, op dezelfde wyze als de schurft; ook
vermeedert het en teelt voort op dezelfde wyze:
Doch men verdryft hetzelve met minder moeite.
Een zalfje, gemaakt uit pieterselie-zaad en ongezhou-
te boter, verdryft aanstonds het ongedierte van
het hoofd, indien het eenige maalen daar me-
de besmeerd word (*g*). Het zekerste middel is,
dagelyks het hoofd van het kind te kammen.

XXIX. HOOFD-

(*g*) Zeer nadeelig is de gewoonte van den gemeenen
man, die den *Mercurius præcipitatus ruber*, tegen dit
ongedierte, op het hoofd strooit; niet alleen, omdat de
huid daar door beschadigd word, maar ook, omdat hy, in
het bloed gebragt wordende, het lighaam kan benadeelen.



XXIX. H O O F D S T U K.

Van de Venus-ziekte.

DE Venus-ziekte (*Lues Venerea*) is in den jaare 1494. 't eerst na Europa gekomen. Schoon zy door de Spanjaarden van het Eiland St. Domingo (*Hispaniola*) herwaarts gebragt zy, wanneer zy onder aanvoering van CHRISTOPH. COLUMBUS de nieuwe Waereld ontdekten, en vandaar dit vergift medebragten; zoo heeft zy nogtans eerst het jaar daaraan by de Fransche armée opmerkzaamheid verwekt, wanneer KAREL VIII. Koning van Vrankryk, eene vyandelyke armée van tagtig duizend man' na Napels voerde, want deeze wierden door de gemeenschap met de Vrouwen-perfoonen, door de Spaansche soldaaten reeds besmet, zeer lelyk gehaavend. Van Italien, Vrank-en Spanjen heeft zy zich vervolgens allengskens uitgebreid over het overig gedeelte van Europa, als mede in Africa en Azia over de landen, aan de middenlandsche Zee grenzende, en eindelyk over Turkyen, Perfiën, en Japan.

Deeze ziekte was in den beginne zeer geweldig. Het vergift drong aanstonds in 't bloed, en beroofde veel van het leven; vervolgens heeft haare heevigheid allengskens zoo afgenomen, dat dit ongemak zedert den jaare 1610. door geen nieuwe toevallen

toevallen vermeerderd geworden is , gelyk vooreen geschiedde. Het vergift komt thans niet zoo schielijk in het bloed , maar tast eerst een der uitwendige deelen aan , voornamentlyk de zulke , die met dunne bekleetselen bedekt zyn , als de lippen , den mond , en andere meer (*). Indien het
in

(*) FABRE (*traité des maladies veneriennes Tom 1. pag 12.*) verhaalt , volgens PETIT , dat een man , die in de beenderen van het verhemelte gaten had , een traan-fistel aan beide zyden van den neus kreeg. Te vergeefsch poogden veele kundige hem te helpen. Door PETIT ondervraagd zynde , stond hy eindelyk toe , dat hy omgang had gehad met besmette vrouws- personen , doch dat hy daar van niet het minste ongemak bespeurt had. Het vergift was des niettegenstaande in het lighaam gekomen. PETIT maakte gebruik van smeefsels , en herstelde hem volkomen. FABRE wierd zelve raad gevraagd van eene juffrouw van eenen dertig jaaren , die , agttien jaaren oud zynde , getrouwt was. Zeven jaaren daarna kreeg zy eene ontfteeking in de keel , met koorts en yl-hoofdigheid. Nadat deeze overwonnen was , bleef 'er eene zwelling over , die in drie maanden zich verdeelde. Zy bevondt zich daarna een jaar wel. Doch daarna wierd zy , drie jaaren lang , ziekelyk , en wierd dan van zinkingen , dan van pynen in de borst , het hoofd , en de maag geplaat. Eindelyk kreeg zy den loop , die twee maanden duurde , en toen eerst ophield , wanneer eene andere , onaangenaame , ontlafing zich openbaarde ; die egter met geene andere ongemakken verzeld ging , dan somtyds door pyn in de baar-moeder. Haar man bevond zich nu wel , doch had , eer hy trouwde , dikwils

in 't vervolg, ten aanzien van het getal en de heevigheid der toevallen, in dezelfde evenredigheid mogt afneemen; dan zou het eindelyk gemakkelyk te geneezen zyn, of zelfs volkomen ophouden.

Men haalt zich gemeenelyk deeze ziekte op den hals door de vermenging met een onrein perfoon, en men kan verzekerd zyn, dat zy op deeze wyze volgen zal, offchoon zich terftond geen uitwendig ongemak vertoone. Het vergift is fomtyds zoo zwak, dat het in de deelen, die aangedaan moesten worden, geene pyn, ontfteeking, verzwearing verwekt. Het komt daarom niet minder in het bloed, blyft aldaar dikwils eenige jaaren verborgen, tot dat het eindelyk door de eene of andere oorzaak, als ware het, levendig gemaakt word, en in eene kennelyke of verborge venus-ziekte uitbreekt. Doch men kan ook op eene onfchuldige wyze door dezelve aangedaan worden, wanneer men, by voorbeeld, by iemand slaapt, die daar mede besmet is, en, als deeze 's nagts zweet, of eene uitflag heeft, dan kan men ligt ongelukkig worden. De geloofwaardige FABR. HILDANUS verhaalt daarvan *Cent. 5. obs. 97.* een merkwaardig voorbeeld. Hetzelfde noodlot kan men ondergaan, wanneer men by ongeluk

ongemakken gehad, die niet wel behandeld maar gestuit waren. Thans had hy geene andere ongemakken, dan fomtyds eenen uitflag, waar uit foortgelyk vogt ontlafst wierd, als hy voorheen door een' anderen weg was kwyt geraakt. FABRE had geene andere opheldering noodig. Hy liet beide de smeer-cuur gebruiken.

geluk gebruikt de kleederen , of de bed-lakens , waar op zoo een mensch kort te vooren gelegen heeft. **SAUVAGES** verhaalt dat een Heelmcester in Montpellier besmet wierd , wanneer hy onder het hoofd een hoofd-kusfen leide, welk besmet was met de kwyl van iemand , die deeze cuur had ondergaan. **HILDANUS** berigt , dat een jong , onverftandig , vrouws-perfoon door deeze ziekte aangedaan wierd , wanneer zy zich bediende van de kousfen van eenen jongen , die de venus-ziekte had. Heeft slegts één zich dezelve op den hals gehaald ; dan kan zy zich gemakkelyk op onschuldige lieden verspreiden. De lyf-arts **LINDESTOLPE** haalt , in zyn boek over de venus-ziekten , *pag.* 35. aan , dat een jongeling , zyne eigene zuster door eenen kus besmet hebbe. De zeer ervaaren **FORESTUS** verhaalt , dat een man , die deeze ziekte had , zyne eigene vrouw besmet hebbe : deeze bragt de ziekte over tot het kind , waarvan zy zwanger was ; het kind op de Minne , en deeze besmette twee van haare eigen kinderen. In een voornaam en eerbaar koopmans huis in Stockholm verspreide zich over eenige jaaren dit kwaad , door eene onvoorzigtiglyk aangenoomen Minne , op den man , de vrouw , drie kinderen , de meid , en twee winkel-knegts. **ANTONIUS GALLUS** verhaalt , dat eene vroedvrouw besmet wierd , wanneer zy eene vrouw verlosste , die de venus-ziekte had. **BURGESIUS** maakt gewag van eene daar mede besmette vroedvrouw , die deeze ziekte in vyf- en dertig familiën bragt. Een Hollandsch Geneesheer , met naame **ANTONIUS EVER-**

HAERS, zegt in een klein werkje, door hem in den jaare 1661. uitgegeeven, dat eene voor het overige eerlyke vrouw, die zelve niet wist, dat zy besmet was, en die gewoon was de borsten der kraamvrouwen uit te zuigen, op deeze wyze veele vrouwen en kinderen besmet hebbe. Soortgelyke voorbeelden heeft BILGUER aangeteekend (*von hypochondrie pag. 71. 75.*)

Wanneer de ouders de venus-ziekte hebben; dan is het natuurlyk, dat de kinderen, welke zy voortbrengen, met dezelfde ziekte ter waereld komen. Doch dewyl het vergift, ten tyde van de bevrugting of zeer kragtig, of kragtenloos is, zoo moet ook de werking op het kind onderscheiden zyn. Is het by dié gelegenheid zeer kragtig, dan sterft het kind doorgaans in 's Moeders lighaam. Uit deeze oorzaak brengen ook zulke ongelukkige Moeders dikwils doode kinderen ter waereld.

Somtyds kan het kind wel levendig ter waereld komen; doch het is vol zweeren. en brengt duidelyke tekenen van de ziekte met zich. Is dit vergift by de ouders zwakker, en langzaamer in zyne werking, dan kan het gebooren kind op het uiterlyk aanzien gezond zyn, tot dat, na verloop van eenigen tyd, venerische verzweringen over het geheele lighaam uitbreeken. By die ouders, welke tegen hunne venus-ziekte wel genees-mindelen gebruikt hebben, doch daarvan niet volkomen geneezen zyn, is, ten minste voor eenen tyd, het vergift zoo kragteloos geworden, dat by de kinderen, door hen voortgeteeld, geene regte venus-ziekte, maar

maar alleen de Engelsche ziekte, of verhardingen der klieren, waaraan zy levens-lang moeten sukkel-
len, ontstaan zyn. Zulke kinderen blyven klein en
zwakkelyk, en dus ook hunne nakomelingen. Op
zulk eene wyze kan een geheel volk ontaarden, en
als verdorven worden (*). Vandaar is het, dat
onder de kinderen, die zulke ouders hebben, eeni-
gen verscheide der genoemde toevallen lyden, doch
anderen volkomen gezond uitzien. In het laatste
geval is het kind geteeld en gebooren geworden in
eenen tyd, wanneer het vergift by de ouderen door
eene zeer goede levens-wyze, of door genees-midde-
len, zeer verzwakt, schoon niet volkomen wech
genomen geweest is: Daarom kan het, gelyk eene
zaadstofte, door eene ongeregelde levens-wyze, of
van zich zelve, op eenen anderen tyd wederom toe-
neemen, en zoo heevig worden, dat het kind,
welk in zulke omstandigheden gebooren word, of
dood ter waereld kome, of aan een der gemelde
zwaare toevallen onderworpen zy. Hieruit bemerkt
men mede, van waar het kome, dat onder kinde-
ren

(*) Zoude men welgelooven, dat slegte vrouws-
perfoonen meêr schaade toebrengen, als kruid en lood?
Dit moest PHILIP V. ondervinden, wanneer de Portu-
geefche Armée by Madrid campeerde, en voor de helft
door de zulken bedorven wierd, die met dit oogmerk
uit eigen drift den vyand bezogten. *Supplement aux
Essais historiques sur Paris. pag. 75.*

ren, die uit zulke ouders voortgekomen zyn, eenigen gezond, doch anderen, zoo wel ten opzichte van het lighaam als het gemoed, in ziekelyke omstandigheden zyn kunnen. Men neemt ook hieruit af, hoe noodzaakelyk het voor een' man zy, die trouwen wil, dat hy zich voor dit ongemak in acht neeme, of, zoo hy zich hetzelve op den hals gehaald heeft, zorge draage, dat hy daarvan volkomen bevreed worde; want ander stoft hy zonder twyfel eene deugdzaame vrouw en zyne kinderen in 't ongeluk. Het is dus eene zaak van groote aangelegenheid, dat hy de kundigste en hier in 't meest ervaren Geneesheeren raadpleegt, en hen openhartig de zaak ontdekt. Zoo hy een chanker gehad heeft, die schielyk verdweenen, of door uitwendige middelen verdreeven is, zonder dat daarop eene zwelling gevolgd zy in eene of in beide lieschen, die tot verettering overgegaan, en volkomen gezuiverd is, dan kan hy zich verzekerd houden, besmet te zyn. Niet minder, zoo hy een' druipert gehad heeft, waarop men niet behoorlyk acht geflagt heeft, die niet genoegzaam gezuiverd is, maar schielyk, het zy van zelve, het zy door eene koorts, het zy door sterke buik-zuiverende middelen, door den *balsamus de copaiva*, of samentrekkende inspuitingen, opgestopt is; of als de klieren in de lieschen zeer hard zyn, dan heeft hy de stoffe deezer ziekte voorzeker in het lighaam, en schoon hy schynt gezond te zyn, is het egter noodig, dat hy volkomen gezuiverd worde. Een Geneesheer zoude tegen

gen beter weeten aan handelen, zoo hy voor hem zyn toestand verborgen hield (*). De volgende geschiedenis zal ons daarvan tot een bewys strekken.

Een jong Heer, die zich aan dit kwaad bloot gesteld had, onderwierp zich aan de kwyling, en meende gencezen te zyn. Hy trouwde, en teelde by zyne vrouw twee gezonde kinderen. Hy wierd weduwnaar, en hertrouwde eene gezonde vrouw, die twee dogters baarde, waaraan niets ontbrak. De vrouw, die van nature geene zwakke borst had, begon eindelyk dikwils zonder eene merkelyke oorzaak, bloed te spoegen. Zy bragt naderhand verscheide zoonen ter waereld, die allen gebrekkelyk waren, en de Engelsche ziekte, en een derzelver de vallende ziekte, kreeg. De kwyling had, in dit geval, het venerische vergift voor eenigentyd verstikt, en hetzelfde zoodanig verzwakt, dat de eerste vrouw en haare kinderen daarvan geene tekenen

(*) Doorgaans is men zoo onverstandig, dat men zulke raadpleegd, welke zich de zaak niet verstaan. Men geeft middelen, die de uitwendige ongemakken verdryven, en geloofd dan, dat men zyne zaak behoorlyk verrigt hebbe, daar het vergift in het bloed gekomen is, en vroeg of laat, het zy met duidelyke kentekenen zich openbaard, of zich veranderd, en onder gansch andere ziekten verbergt, die egter uit denzelfden oorsprong voortkomen, en dan zoo gemakkelyk niet te gencezen zyn, als zy zouden geweest zyn, eer de natuurlyke aart van het vergift door den tyd, en de gebruikte middelen, veranderd was.

kenen gewaar wierden; ook niet de tweede vrouw en derzelver eerste kinderen: Doch wanneer het verzwakte venerische vergift wederom begon te herleeven, kreeg de vrouw eene bloedspoeging, en de kinderen, die naderhand geboren wierden, kreegen zulke ziekten, welke dikwils gevolgen daar van zyn, en die, het eene voor, het ander na, om 't leven bragten.

Een kind kan mede ongelukkig worden, wanneer het gezoogd word door eene Minne, die met deeze ziekte behebt is; want in dit geval kan het dezelve niet ontgaan: Egter is by dit ongeluk nog een geluk, als men het aanstonds, en eer het kind gespeend word, ontdekt; want dan is het nog te helpen, indien de Minne de vereischte genees-middelen gebruikt, en men het kind geduurende dien tyd aan dezelve laat zuigen. Vertraagt men hier mede, tot dat hetzelfde gespeend is; dan kan de ziekte wortelen schieten, en is alsdan veel moeilijker te geneezen. Men moet daarom in het verkiezen eener Minne niet blindeling te werk gaan, en dezelve niet eer aanneemen, voor dat men haar na behooren onderzocht hebbe. Vandaar is het zoogenaamde Comptoir der Minnen in Stockholm eene voortreffelyke stigting, indien slegts zy, die Minnen noodig hebben, van hetzelfde wilden gebruik maaken (*b*). Doch het is niet genoeg, dat het lig-

haam

(*b*) Dit Comptoir is van de grootste nuttigheid; alle vrouws-perfoonen, die zich voor Minnen willen verhuuren, moeten zich aldaar aangeeven, en onderzocht worden

haam der Minne onderzocht worde, men moet ook zorgvuldig naspooren, hoe zy geleeft hebbe? of zy dienstbaar geweest zy op plaatsen, alwaar zy heeft kunnen besmet worden? Het veneriesch vergift kan zich by eenige, vooral by vette menschen, lange verbergen. Haar kind moet ook onderzocht worden, want de kinderen brengen dikwils aan den dag, hoe de Ouders voorheen geleeft hebben.

Gelyk de Minne het kind kan aansteeken; alzoo kan ook een kind, met de venus-ziekte gebooren, de Minne besmetten; en hierby is eene herinnering te doen, die nooit gemist heeft, namentlyk, dat die deelen, welke van de Veneriesche ziekte het eerst besmet worden, benevens de omliggende, ook 't eerst derzelver uitwerking vertoonen. Wanneer derhalve een kind van eene onreine Minne aangestookten is; dan ontstaan by hetzelfde ineetende zweeren in den mond, voornamentlyk agter in de keel,
en

worden, en daardoor is de Venus-ziekte in Sockholm, zedert eenigen tyd, merkelyk verminderd. Zie *Berät-
telse inlaemnade Til Kongl. Collegium Medicum, Rot-
rande Medicinal-Werkets Tilstaand. Stockholm 1765.*

Men heeft daarvan dit gemak, dat, als eene Vrouw eene Minne noodig heeft, zy 'er terstond eene kan krygen, en dat zulke, die de eene of andere ziekte hebben, niet aangenomen worden. In 1764 heeft men van 295. die zich aangegeeven hadden, 'er maar 152. aangenomen. In volgende jaaren zyn 'er veele om venus-ziekte, uitslag, klier-gezwellen, en andere ongemakken, wechgezonden.

en de klieren aan de kaak en den hals zwellen, en worden hard: Doch, word de Minne door het kind besmet; dan krygt zy foortgelyke zweeren aan de borsten, en de klieren onder de armen worden verhard. Heeft men, integendeel, zich de besmetting hierdoor op den hals gehaald, dat men by zoo eenen zieken gelsaapen, of dat men zich van deszelfs kleederen bediend heeft; dan vertoont zich de ziekte 't eerst op de huid, door blaasjes, gezwellen en verzweeringen.

Kinderen worden door dit vergift eêr aangedaan, dan meer bejaarden: Waarschynlyk daarom, dewyl derzelver huid dunner en fyner is, en de poren gevolgelyk meer open zyn. Vandaar keure ik af, dat kinderen zich bedienen van de lepels, messen, vorken en bekers, door een besmet persoon gebruikt; want dit kan by een kind van belang zyn: doch weinige volwasfene zullen zich op deeze wyze, en ook niet door de lugt of den adem van den lyder, dit kwaad op den hals gehaald hebben.

By kinderen breekt dit vergift ook schielyk uit, indien het by de ouders, vooral by de Moeder, ten tyde van de bevrugting kragtig geweest is. Doch is de ziekte by de ouders, door het gebruik van genees-middelen, verzwakt, dan is het onzeker, wanneer het zich by het kind zal openbaaren. Een meisje van elf jaaren overwon, door de inenting, zeer gemakkelyk de pokjes, was gezond en zag 'er uit als een roos. Na eenige maanden brak de Venus-ziekte, welke zy van de ouders geërft

geërft had , uit ; de klieren aan den hals zwollen en veretterden , een veneriefche uitflag , been-eeters , veretteringen in den neus , en leelyke zweeren in het aangezicht , vertoonden zich . Een meisje van twee jaaren wierd door eene meid befmet , welke het eeten voor haar kauwde , en by welke men naderhand groote verzweringen , benevens andere , zekere , tekenen van venus-ziekte ontdekte . De befmetting vertoonde zich aan het kind niet , dan negen jaaren daarna , wanneer het eerft de hair-worm kreeg . De *Spiritus mercurialis* , die vier maanden lang gebruikt wierd , fcheen haar gezond te maaken ; doch het volgende jaar vertoonde zich dezelfde uitflag , hoewel in minder graad . Doch 'er kwamen verzweringen in de keel , zy begon door den neus te fpreken , en was dikwils heefch . Twee kinderen wierden door eene Minne befmet , die den neus verloor , nadat zy den dienft verlaaten had . De venus-ziekte brak niet eerder by deeze uit , dan wanneer zy dertig jaaren oud waren . By het eene ontdekte zich een uitflag in het agfte jaar .

Of het veneriefche vergift zelve in infecten , in een fcherp zuur , of in eene verrotting beftaa , kan ik niet zeggen . Dit alleen weeten wy , dat het op het deel van 't lighaam , waaraan het zitten blyft , eene roodheid , hitte , fpanning en pyn verwekt , en aldaar incetende verzweringen te weeg brengt . Wy ondervinden mede , dat het wateragtig gedeelte van ons bloed daar van fremt , en dat het zich

gemeenelyk plaatst, daar de *glandula sebacea* zyn, en dat de veneriesche zweeren niet ligt littekens agter laten. Ook bemerken wy, dat dit vergift niet vlug zy, en dus niet met de lugt omgevoerd worde; maar dat deszelfs besmetting door de aanraaking geschiede. (Men zie ASTRUC *de morbis veneris*, p. 125.)

Het is iet byzonders, dat deeze ziekte by veelen, zelfs somtyds jaaren lang, verborgen blyft, schoon men volkomen overtuigd zy, dat het vergift in het lighaam is, en anderen daar door besmet zyn geworden. De waarneeming van den Heere GOULARD (*Oeuvres de Chirurgie*, Tom. 2. pag. 19.) is ten deezen opzigte merkwaardig. Eene vrouw, die over haar geheele lighaam blaasjes en zweeren had, vroeg hem om raad. Nadat hy haar de noodige vraagen gedaan had, sprak hy met haaren man, die gezond en fris uitzag; doch egter bekende, dat hy voor meer dan vyftien jaaren een gezwel in de lies, en een Chanker gehad had. GOULARD befloot daar uit, dat de uitslag van de vrouw van eenen venerieschen aart was; de uitkomst toonde ook, dat hy zich niet bedroogen had; want, als men de geneezing met de zalf, uit kwik bereid, voortzette, verminderden alle toevallen, tot dat zy geheellyk verdweenen. Hy poogde haaren man te overreden, van zich aan dezelfde genees-wyze te onderwerpen, alzoo de vrouw anders op nieuws zich deeze ziekte zou konnen op den hals haalen; doch hy wilde niet. De vrouw wierd op nieuws besmet;

waar.

maar het veneriefche vergift viel thans op de borst, en zy schoot 'er het leven by in, De man was hierom niet tot de cuur over te haalen, om dat hy voor het overige gezond was, gelyk hy ook, nog langer dan vyfen twintig jaaren na den dood van zyne vrouw in denzelfden toestand leefde.

Gelyk het veneriefche vergift lange in het ligchaam zyn kan, eer het in eene wezentlyke ziekte uitbreekt; alzoo kan hetzelve zich ook dikwils onder andere ziekten verbergen, welke met de Venus-ziekte niet de minste gemeenschap fchynen te hebben. In de fchriften van hen, die ten deezen opzigte waarneemingen gemaakt hebben, vindt men, dat hetzelve zich dikwils verborgen hebbe onder hoofd-pyn, ontfteekingen der oogen, blindheid, oor-pyn, doofheid, zweeren in de neus, zinkingen op de keel; de fprouw, heesheid, hoest, het zyde-wee, bloedspoelingen, aamborstigheid, de teering, rooden loop, heup-pyn, den witten vloed, de uitdrooging, eene fleepende koorts, de geel-zugt, de anderen-, of derden-daagsche koorts, eene zwakheid in de geledingen, jigt-pynen, het voet-euvel, de ftuipen en vallende ziekte. De zieken konnen deeze ongemakken te vooren gehad hebben, doch dan zyn dezelve door de befmetting kwaataartiger geworden. Men kan dezulken wegens venus-ziekte verdenken, zoo zy te vooren met een chancker of druipert geplaagd geweest zyn, welke men verwaarlooft heeft, of zoo zy omgang gehad hebben met verdagte en onzuivere perfoonen. Ontdekken de zieken, of derzelver befte vrienden, zulks niet

aan den Geneesheer, dan valt het hem moeilĳk; agter de waarheid te komen, en te ontdekken, dat het ongemak venerieſch is (*). Hoe moeilĳk is het, in zulke gevallen der zaake kundig te worden, en tot de gedagten te komen, dat deeze ziekten venerieſch zyn, ten zy de lyder zelve zynen toestand openbaare, en het voorgaande openhartig be-lyde? Eene deugdzaame vrouw, die niets kwaads vermoedende is, kan in deezen niets getuigen (†).

Nog

(*) De Hr BIERCHÉN heeft my verhaalt, dat een jongeling van twintig jaaren met een verlamd en neêrhangend oog-lid, een verdraaiden mond naar de regter zyde, en eene zwelling van de wang, by hem gekomen was; hy verzekerde, dat zulks door eene gevatte koude was ontstaan; zeide, dat hy op denzelfden tyd pyn in de keel gehad had, dat hem deeze ongemakken ſchielyk overkomen waren, doch dat thans de keel beeter was. Hy zoude dit ongemak niet voor venerieſch gehouden hebben, zoo hy niet bemerkte had, dat de klieren onder de kin gezwollen, en tot een gelopen waren. De keel onderzoekende, vondt hy eene verzwearing in den neus, waardoor by nog meer aangaande de oorzaak verzekerd wierd. De zieke bekende ook, dat hy een druipt gehad, doch op dezelve niet genoeg gelet had. Hy liet hem den *Spiritus mercurialis* inwendig en uitwendig gebruiken, en na veertien dagen waren de bovengenoemde ongemakken geneezen.

(†) Zekere eerlyke vrouw wierd, zoo zy meende, langen tyd geplaagd door den witten vloed. Dezelve was vergezeld door zwaare buik-pyn, eene ſlegte kleur, en dikwils met eenen ſtink, die andere menſchen verveelde. Aan haare levens-wyze viel niets te berispen;

zy

Nog minder heeft men van een kind , besmet door zyne Ouders of Minne , opheldering van zaaken te verwagten. Meenig een vergeet ook , dat hy voor veele jaaren iet veneriesch gehad hebbe , of denkt niet , dat hetzelfde zoo langen tyd daarna eenige gevolgen zou kunnen hebben. Des komt het in deeze omstandigheden alleen aan op den vlyt en de navorsching van den Geneesheer , of hy in zulk eene duisternis de waarheid zal ontdekken , en daarna de geneezing bepaalen kunnen. Men gebruike wat men wil , zelfs de uitgezogtste middelen , de geneezing zal altoos zonder werking zyn , ten zy men de oorzaak ontdekke , en dezelve door kwik-middelen trachte wech te nemen.

Een Heer van vyftig jaar' had , reeds zedert meer dan zes jaaren , eene vermagering en kragtelootheid by zich bespeurt , zonder over iet anders te klaagen. De vermaarde Geneesheeren STAHL en HOFFMAN hadden zich reeds vier jaaren lang moeite gegeven , om hem weder te regt te brengen. Hy reisde daarop na Parys , en bediende zich
aldaar

zy was dus boven allen argwaan. Haar man zag gezond uit , en van hem kon men niets verneemen. Eindelyk ontdekte een der Geneesheeren , dat de man , een jaar te vooren , de kwyling uitgestaan had. De zaak werd daardoor op eenmaal opgehelderd ; doch voor de vrouw verborgen gehouden. Men liet haar den *Spiritus Mercurialis* gebruiken , en daar mede verdweenen voor altoos alle toevallen.

aldaar twee jaar' van den raad der Geneesheeren. Eindelyk zocht hy hulpe in Montpellier, en bragt aldaar agt maanden door, zonder de minste verandering te bespeuren. De Hooggel. Heer FIZES kwam op de gedagten, dat hier onder wel iet veneriefch zou konnen verborgen liggen, en schoon de lyder verzekerde, dat, noch hy, noch zyne Ouders, noch zyne Minne, zulk eene ziekte gehad hadden, liet hy hem egter de melk en smeer-cuur te gelyk gebruiken, en wel met dit gelukkig gevolg, dat vleesch en kragten spoedig wederkeerden: (Men zie BOISSIER DE SAUVAGES *Nosol. Method. Tom. 3. part. 2. p. 383.*). Een Officier, die zoodanig in den arm was geschooten geworden, dat men denzelven moest afzetten, wierd, alles geneezen zynde, door stui-pen aangetast, waarby het hoofd na de regter zyde getrokken, en de kaaken zoo vast geïlooten wierden, dat hy tusfchen de tanden een' doek moest houden. De stomp wierd op nieuws afgezet, doch zonder hulpe: noch veele andere middelen wierden aangewend, maar met dezelfde flegte uitwerking. Eindelyk ontdekte de Heer AIMAR, dat de Officier reeds voor lange een veneriefch ongemak had gehad, maar niet wel geneezen was, waarom hy hem bewoog, zich te laten smeeren, en daardoor wierd de ziekte gelukkig overwonnen: (Men zie RIVERII *Obs. 10. Commun.*) De Heer *Assefor* STRANDBERG deelt in zyne laatste redenvoering, by de Koninglyke Academie der Weetenschappen voorgelezen, wanneer hy als voorzittend lid afging, *p.*

33, mede de geschiedenis vaneenen man, die langen tyd pyn in de eene heup gehad had, welke hy eindelyk door smeersels verdreef; doch waarvan hy ten eersten had kunnen geneezen worden, indien hy slegts by tyds zynen toestand had willen te kennen geeven. Hy spreekt ook in dezelfde redenvoering pag. 32. van een jong mans-perfoon, die ongetwyfeld gezicht en gehoor zou verlooren hebben, indien hy niet eindelyk genoodzaakt ware geweest, te beken- nen, dat hy zich de venus-ziekte op den hals ge- haald had.

Ik brenge deeze voorbeelden by, met oogmerk, om daar uit te doen zien, hoe slegt eene zieke met den Geneesheer handele, en hoe hy zich zelve be- nadeele, zoo hy, in staat daartoe zynde, aan den Geneesheer zyne omstandigheden niet ontdekt. Ge- heel ander is het geleegeu met eene onschuldige Moeder, en met een kind: De Geneesheer moet alsdan op alle mogelyke wyzen alle omstandigheden nauwkeurig overweegen.

Wat een kind aangaat; zoo openbaaren zich by het- zelve wel zelden eenige zekere tekenen; ten zy de ziekte by de Moeder met chanker-agtige verzwearingen begonnen zy. Nogtans heeft men eenige agter- docht, wanneer by hetzelfde eene meenigte blaasjes en witte spekagtige zweeren in den mond, doch voornamentlyk aan de amandelen, het lelletje, het verhemelte, en in de keel ontstaan, die zich ver- spreiden van den eenen plek tot den anderen, en, den eenen verlaaten hebbende, aan eenen anderen

weder voor den dag komen (*); wanneer daarby de klieren onder de kaak, of aan den hals, hard worden, en een lelyke reuk uit de keel bemerkt word (†). Ook onderzoekt men, of het uitflag, hair-

(*) Verzweeringen van den Scheurbuik ontstaan altoos 't eerst aan het tand-vleesch.

(†) Dat het kwaad zeer (*Tinea*) by kinderen dikwils tekenen geeve, dat hunne Ouders de venus-ziekte gehad hebben, en niet wel geneezen zyn, besluit ik uit een berigt, 't welk de Admiraliteits Geneesheer KÄHLER my medegedeelt heeft. Hy heeft, namentlyk, in het Hospitaal te Napels, alwaar men geneest de kinderen, die met het kwaad zeer geplaagd zyn, onder vier-honderd, die de genoemde ziekte hadden, bevonden, dat twee-honderd drie en tagtig derzelven gebooren waren van ouders, wier namen, het zy Vader of Moeder, stonden op de lyst in het Hospitaal der venus-zieken onder hen, die de smeer-cuur uitgestaan hadden.

Dit ongemak ontstaat ook uit eene veneriefsche oorzaak by zulke kinderen, wier ouders geplaagd zyn geweest met zulke ziekten, die men niet wel behandeld heeft, of zoo zy door de mutsen, of kammen, van anderen bebesmet zyn. De geneezing is dezelfde, als in de Venus-ziekte. Het hoofd word 't schielykft geneezen, wanneer men hetzelve met den *Spiritus mercurialis* wascht; Zoo men dan tegelyk geene kwik-middelen gebruikt, komt de uitflag schielyk weder. Het zoude ook gevaarlyk zyn, deeze middelen flechts uitwendig te gebruiken. Zy, die in hunne kindsheid dit ongemak gehad hebben, en niet behoorlyk geneezen zyn, kreigen onder geworden zynde Scrophuleuse gezwellen, en dikwils

hair-worm, zingen op de oogen; of ooren, heeft, en of de lippen ook dikwils zweeren. In dit geval heeft men zekerlyk reden, der Minne te mis-trouwen.

Vindt men by haar eenige tekenen van dit onge-mak; dan is het klaarblykelyk, dat het kind be-smet geworden zy: tot dit einde verneemt men

1. by de Predikanten van de plaats, of by de bekenden der Minne, of daar zy te vooren gewoond heeft, hoedanig haar gedrag geweest zy? Of zy op het land, of in de Stad, in kroegen, herbergen, of soortgelyke huizen gediend hebbe? Of mischien in het een of ander dier huizen zulk eene ziekte ge-heerscht, dan of men aldaar slegt geleefd hebbe? Dit alles kan ten haaren opzigte argwaan verwekken.

2. Onderzoekt men, of zy geelagtig in het aan-gezicht en aan de handen uitzie, ingevallen oogen heb-be, met een blauwen en opgezetten kring daar onder, en langs zoo magerer word; of zy dikwils met verkoudheid of zinkingen geplaagd zy, door de neus spreekte, en dikwils, zonder eene merke-lyke oorzaak, heesche worde; of haar het slikken moeijelyk valle; of zy veel spoegte, of veel stin-kende etter uitroeghele; of, het geene zy doorslikt, somtyds door de neus te rug keere, of met den hoeft weder na boven gebragt worde; of zy in de

wils andere, ongeneeslyke, kwaalen, dewyl het vene-rifsch vergift in het lighaam gebleeven, doch van natuur veranderd is.

de keel spekagtige en diep-inetende zweeren hebbe; of het haar bezwaarlyk valle de leden te buigen, en of haar de hairen, zelfs aan het lighaam, uitvallen.

3. Verder geeft men nauwkeurig acht, of zy 's nagts wel slaape, dan of zy ter dier tyd klaage over pynen in 't hoofd, in den rugge, de leden en beenderen; doch die over dag verdwynen, en 's nagts niet zoo geweldig zyn, al zy op eene bank, dan wanneer zy in een goed warm bed ligt.

4. Men onderzoekt mede, of zy gezwollen in de liefsen, onder de armen, den kin, of de ooren hebbe; of aan het hoofd, de armen of beenen, been-gezwollen zyn, dan of op het voorhoofd, en ter plaatse, daar de hairen voortkomen, natte, of drooge en schilferagtige zweeren bemerkt worden; of men aan den hals, de borst, op den buik, even als de roos, of meestendeels geel-agtige vlakken, gelyk zynde aan de lever-vlakken, ontdekke; of men aan het lighaam waarneeme kleine voortkruipende of ook groote zweeren, waarin als ware het een brok kaas ligt; of zy klooven in de handen of voeten hebbe.

5. Niet minder moet men nazien, of zy aan heimelyke plaatsen uitwasfen, ter gedaante van rijen, of vleesch-agtige uitwasfen, of chankeragtige verzweringen hebbe. Deeze zyn klein, meestendeels rond, met hoog-roode randen, die meer of min, en fomtyds in het geheel niet, hard zyn. Zy zyn van binnen witagtig; maar als sy diep in eten; dan vallen zy eenigzints in 't zwart.

Zy

Zy zyn van eene geheele andere soort, als kankeragtige verzweeringen; zy beginnen ook op eene gantsch onderscheide wyze, namentlyk, na een klein wit blaasje, dat afvalt en zweert. Somtyds gelyken zy naar uitwassen, die met eene witagtige zweer veretteren. De etter, die deeze zweeren ontlasten, ziet, op linnen, altoos geel uit.

6. Men is mede genoodzaakt te onderzoeken, of zy om en by het fondement klooven hebbe, die etter van zich geeven, of uitwassen van verscheide gedaantens, alzoo die somtyds als uijen, en somtyds als vygen, moer-beijen en franjen uitzien. Deeze zyn by sommigen slap, doch by anderen hard en vereeld.

Men vindt egter niet by elk een alle deeze toevallen; de eene heeft 'er meêr, de andere minder; want, by voorbeeld, zy, die zweeren hebben, welke sterk etteren, of die veel slym en etter uitroghelen, worden op dien tyd zelden, of in 't geheel niet, des nagts van pyn aangedaan.

Heeft een kind dit ongemak van zyne ouderen gekreegen; dan word hetzelve gekend door de reeds opgenoemde toevallen, als mede hierdoor, dat de tepels aan de borsten der Minne rondom rood en gezwollen worden; aan dezelve kleine blaasjes ontstaan, welke afvallen en chankeragtige zweeren verwekken; dat het zog niet te voorschyn komt, het kind mag zuigen, zoo als het wil, doordien de openingen der tepels door de zwellings toege-
drukt zyn. Zulke kinderen zyn zwak en mager, hebben des nagts geene rust, en krygen, of schiel-
lyk,

lyk, eenen kwaadaartigen uitflag, of binnen een half jaar.

Men kan egter in deezen niet volkomen zeker zyn, voor dat men weete, of de ouderen met dit kwaad behebt zyn. Men gift het met recht, als de Moeder, zonder eene klaarblykelyke oorzaak, dikwils eenen miskraam gehad, of doode kinderen, of zulke, die elendig en als half verrot waren, en kort daarna gestorven zyn, ter waereld gebragt heeft. By de ouderen word dit kwaad gekend door dezelve toevallen, die hetzelfde by eene miune te kennen geeven. By lieden van aanzien moet men dit egter zeer voorzigtig onderzoeken. Het komt aan, op het beleid van eenen Geneesheer, in deezen zoo te handelen, dat hy niet voor slegt opgevoed en lomp gehouden worde.

De veneriesche zweeren, die men in den mond ontdekt, worden door de Geneesheeren insgelyks chankeragtig genoemd; doch dit wil geenzins zoo veel zeggen, als kankeragtige zweeren. Ik ondervinde, dat zy zich zoo gemakkelyk niet laaten onderscheiden, als ik te vooren gedacht heb. Wanneer zich veneriesche verzweringen en verhardingen aan de lippen, tong, of borsten vertoonen, en toeneemen, zyn zy moeijelyk te onderskennen, zoo men niet dikwils voortgelyke ongemakken gezien heeft. Men wil in het algemeen, dat kankeragtige verzweringen sterk bloeden, doch veneriesche niet; maar de veneriesche bloeden somtyds zeer sterk. Als de roef 'er afgetrokken word, geeven zy veel bloed. Alle veneriesche verzweringen,

gen,

gen, die niet spekagtig zyn; maar rood, en droog, bloeden ook, vooral wanneer het plukfel, het welk men 'er droog opgelegd heeft, wechgenomen word. Niet alle veneriesche verzweringen zyn spekagtig, eenige rood, eenige zwartagtig, en brandig. Deeze laatste ziet men dikwils voor kankeragtig aan, vooral, zoo zy zich niet bevinden aan de teeldeelen, Moeijelyk is het ook, dezelve uit de hardheid der randen, en binnen in de verzwering te onderscheiden, daar het geheele verschil in een' meerderen of minderen graad bestaat. Kankeragtige zyn harder, dan andere, doch hy, die dezelve erkennen wil, moet ze beide dikwils gezien hebben. Uit al 't geen voorafgegaan is, de ontdekking der oorzaak, en de omstandigheden, die zich daar by opdoen, word men dikwils in staat gesteld, het ongemak te ontdekken, 't geen uit hoofde van de geneezing noodig is, indien men de plaats zelve niet beschouwen kan, gelijk, wanneer de verzwering in den mond der baarmoeder huisvest. Is dezelve kankeragtig, dan zal men nauwelyks hetzelfde kunnen geneezen, doch is het veneriesch, dan is de kwik dikwils werkzaam. Een meisje van twaalf jaaren wierd na Stockholm gebragt, om zich te laten geneezen van eene verzwering in den mond, welke men voor kanker hieldt, en die ook van verscheide daarvoor aangezien wierd. De verzwering was zoo groot, als een halve gulden, en had ongelyke, hockige en verheeye randen, die egter niet hard waren; maar zy zag onzuiver uit, en gaf
et-

etter van zich. Uitwendig merkte men niets, dan een wit gezwel, en dat de klieren aan de keel, en onder de ooren zeer opgezet waren. De Heer BIERCHÉN, die aanstonds bemerkte, dat dit eene veneriesche, en geene kankeragtige, verzwearing was, herstelde haar binnen vyf weeken door eene ontbinding van vier tot zes grein' *Mercurius sublimatus corrosivus* in een once brande-wyn. Hier mede werd samengerold plukfel nat gemaakt, en op de verzwearing in den mond gelegd. Dezelve werd geneezen, de randen smolten wech, en het uitwendig gezwel verdween. Vervolgens gebruikte zy inwendig middelen, uit kwik bereid, ten einde het veneriesch vergift geheel en al uit te roeijen.

Het is zeer noodzaakelyk, dat men zulke verzwearingen, waar zy zich ook op het lighaam bevinden, van kankeragtige zweeren weete te onderscheiden. De Heer BIERCHÉN, die in deezen zoo veele en gelukkige ondervindingen bezit, heeft my het volgend onderscheid opgegeeven, waardoor hy, gelyk ik weet, veelen gered heeft, wier omstandigheden slegt, en twyfelagtig geweest zyn.

Kankeragtige zweeren vertoonen zich in tweederlye gedaante; of zy eeten rondom zich met harde en omgekrulde randen, of zy schieten in de hoogte, en zyn sponsteus.

De eersten hebben eene merkelyke hardigheid, wanneer men hen aanraakt, zoo wel inwendig, als aan de randen. Deeze hardigheid laat zich met den vinger niet indrukken, of is niet van dien aart, als of men op een veerkrachtig lighaam drukte;

maar

maar het is, als of men op een' steen drukte, en dit hebben zy gemeen met de verhardingen der klieren (*scirrh*). Deeze zweeren zyn meestendeels rond, donker-rood, met heldere randen, die dikwils voor een gedeelte bedekt zyn met eene huid, die niet zweert. De tweede soort, of de sponsieuse, en in de hoogte opschietende (*luxuriantia*) kankeragtige zweeren zien anders uit, dan de eerstgenoemden. Men zou dezelve, wilde men naar het uitwendige oordeelen, voor week houden; maar zy zyn hard, als men hen aanraakt, schoon niet in denzelfden trap, als de anderen. Zy hebben geene merkelyke randen, maar zwellen hoog en breed, en zyn van onderen van de onderliggende huid even als samengetrokken; doch deeze is somtyds, het sponsieuse gewas wechgenomen zynde, hard, en heeft op de eene of andere zyde eenen hoogen rand. Deeze zweeren zyn donker-rood en hoekig; zy geeven meestendeels eene geele etter, doch somtyds alleenlyk eene dunne en kwaad-aartige stoffe (*sanies*), en somtyds eene vermenging van beiden.

De geele etter komt van het rondlegend celagtig weeffel, welk door de aanraaking der lugt, en de aanhoudende prikkeling, in eene volkome verettering gekomen is, de etter vermengt zich met de sanieuse stoffe van den kanker; en dus ontstaat de geele kleur.

Het veneriesch vergift verbergt zich dikwils by zeer vette menschen gedurende den geheelen leeftyd. Eene vrouw kan des niet te min door zoo een'

1733

man besmet, en de kinderen kunnen in een' droevigen staat gebragt worden.

Een verborgen veneriesch ongemak breekt ligt uit, en word zwaar, als de lyder zich sterk en op eene ongewoone wyze beweegt, sterk drinkt, veel brande-wyn gebruikt, grove spyten en vooral spek nuttigt. Van daar is het, dat deeze ziekte by den landman geweldiger is, ja dikwils den dood veroorzaakt.

Wanneer men tegen eene langduurige ziekte te vergeefsch allerley middelen gebruikt heeft, dan heeft men grond, om op een verborgen veneriesch ongemak te denken. Zegt de lyder, dat kwik-middelen verzagting te weeg brengen, dan word het verdenken grooter. Om deeze rede heb ik, als het my moeijelyk was, te oordeelen, of het ongemak veneriesch was, dan niet, den lyder een weinig van den *spiritus mercurialis* laten gebruiken, welke in dit geval eene spoedige verzagting te weeg bragt. In het vervolg zal ik de bereiding daar van opgeeven.

Eene veneriesche ziekte, welke op een' kwaalyk geneezen druipert volgt, is in zich zelve wel goedaartiger. doch moeijelyker te geneezen, dan die, welke zich eerst door chankers te kennen geeft. Deeze tast gemeenelyk den lyder schielyk en zeer geweldig aan, en noodzaakt hem spoedig hulpe te zoeken.

Als iemand zodanig uitwendig ongemak gehad heeft, en geloofd geneezen te zyn, doch hetzelfde naderhand. Zonder oorzaak wederom komt, dan
kan

kan hy verzekerd zyn, dat het vergift nog in het lighaam is, en dat hy eene geregelde cuur moet ondergaan, zal hy herstellen.

Wanneer een vrouwspersoon, dat te vooren gezond en frisch uitzag, getrouwt zynde, begint mager te worden, zickelyk te zyn, en het eene toeval na het andere heeft, als zinkingen op de keel, pyn en zwelling der leden, verhardingen in de klieren, pyn in het ontlasten van de pis, of eene onaangename ontlasting met ontvelling en brandende pyn aan de teeldeelen, dan moet de man zyn geweeten onderzoeken, eenen kundigen alles bekend maaken, en raad vraagen. Bevindt zoo een, dat hy onzuiver is, dan moeten zy beide de cuur ondergaan, en dezelve niet van tyd tot tyd uitsstellen. Het vergift kan zich anders op het een of ander deel werpen, en de dood van een van beide, of van alle beide, veroorzaaken.

De zweeren, door den Scheurbuik veroorzaakt, onderscheidt men van de venerieschen hierdoor, dat de rand der eersten blauwagtig. en met kleine witte puntjes gespikkeld is. Als men op derzelver roof drukt, dan bemerkt men, dat zy week en sponsieus zyn. In deezen is gemeenelyk wild vleesch, van kleur als een stuk kalfs-lever. Neemt men het zelve wech; dan schiet het schielyk weder in de hoogte; doch het word 't gemakkelykst bedwongen door gebranden aluin, dien men 'er op strooit. Neemt men daarenboven andere tekenen van den scheurbuik waar; dan kan men niet meer missen: Deeze zyn, by eenen kouden scheurbuik,

II. DEEL.

R

een

een bleek en gezwollen aangezicht, eene vermoeidheid en aamborstigheid na de beweeging, een week, fungus, en ligt bloedend tand-vleesch, roode, blauwe, lood-kleurige of zwarte vlakken, voornamentlyk aan het scheen-been, doch nooit in het aangezicht, eene zwakheid en pyn in de knijen, en voortgelyke meer.

In den jaare 1735. wierd ik te gelyk met wylen den Heere BOLTENHAGEN geroepen by een kind, 't welk veele verzweringen op het lighaam had; dezelve waren spekagtig. Het kind kermde gestaadig, en de ouders begeerden hulpe. De kleur der zweeren, en derzelver uiterlyke gedaante deedt ons vermoeden, dat zy veneriesch waren; maar van den toestand der ouden konden wy geen genoegzaam berigt krygen; dus bleef het alleen eene gissing. In zulke verdrietige omstandigheden wist de Heer BOLTENHAGEN, die veel doorzigt en ondervinding had, zich terstond te helpen, hy strooide een weinig syngewreeven *mercurius dulcis* in een der grootste zweeren, en leide een pleister daar over, verzekerende my, dat, de verzwering veneriesch zynde, de kaas-agtige klomp den volgenden dag zou gesmolten zyn; doch dit niet geschiedende, dat zy dan verslimmeren zou. Het geschiedde, gelyk hy gezegd had; de kaas-klomp was wech. De Moeder liet men kwylen; het kind zoog haar zog, en zy wierden beide hersteld.

Kinderen zyn gemakkelyker te helpen, wanneer zy nog zuigen, dan gespeend zynde: Doch zyn die, welke met deeze ziekte gebooren zyn, moeilij-

lyker te geneezen , dan zulken , die dezelve van de Minne gekreegen hebben. Hoe vroeger de ziekte uitbreekt , en gekend word , des te zekerder kan men dezelve te keer gaan. Verloopen 'er verscheide jaaren , eer zy zich openbaard , dan laat zy zich moeiljelyk bedwingen. Men heeft dan somtyds een jaar , ja twee jaaren , noodig om de geneezig volkomen te maaken ; waar toe zoo ten opzigte van den Geneesheer , als lyder , veel geduld noodig is. In het algemeen laat zich de venus-ziekte meesten-deels geneezen , wanneer zy niet te oud geworden is. Zedert hoe korter tyd men zich dezelve op den hals gehaald heeft , dies te gemakkeljker kan men dezelve te keer gaan. Wanneer de beenderen reeds aangedaan zyn ; dan word de geneezing moeiljelyker : zy word ook zelden volkomen en in den grond geneezen , indien de lyder verdrietig word , en de genees-middelen verwerpt , zoodra de toevallen ophouden , en het ligchaam uitwendig zuiver is. Vandaar is het , dat zy , of wederom instorten , of hun leven lang ziekelijk blyven , of in het vervolg eenen uitslag , voornamentlyk den zoo genoemden haïr-worm (*herpes*) , krygen.

Eene andere oorzaak is , dat jonge lieden hunnen toestand den ouderen niet durven ontdekken. Zy kunnen dus op geene geregelde wyze zich laten helpen , maar moeten zich met verzagtede middelen vergenoegen , tot dat zy in den grond bedorven zyn , en zy somtyds niet meer zyn te helpen. Ik kan hier by brengen het geval van een heer , die

uit deeze oorzaak met uitflag geplaagt was, waar tegen hy zoo in Vrankryk, als alhier, kwik-middelen gebruikt had. In den nagt had hy eene ondragelyke jeukte. Wanneer hy eindelyk aan het eene been een fontanel liet zetten, verdween de uitflag schielyk, en tegen verwagting. De *spiritus mercurialis* was toen nog niet in gebruik. Als zulk een uitflag (*dartres*) in een plek by een zit, kan men met eene naalde eenige reeten daar in maaken, op dat 'er verettering kome, en dan geneest men de zelve als eene andere verzweering.

Hoe meermaalen men de Venus-ziekte heeft, dies te moeiljker is dezelve te geneezen.

Hoe langer men met afkooksels en foortgelyke *pallieerende* middelen speelt, dies te meer kan de ziekte inwortelen, en dies te meer moeite kost het, dezelve te overwinnen.

Zy, die verhardingen (*tophi*) op het hoofd, of verzweeringen in de keel hebben, moeten aanstonds na hulpe omzien, alzoo het bekkeneel, by de eersten, schielyk *gecarieerd*, en door gegeten word, waarop ligt stuiptrekkingen, en de waare vallende ziekte volgen; en by de anderen, door het afvallen van de neus, het aangezicht ligt geschonden word.

In eenen zwaaren scheurbuik zyn de kwik-middelen nadeelig, ten zy dezelve alvorens geneezen, of ten minsten verzagt geworden zy (*). Kropgezwel-

(*) De Heer LIND deelt hiervan eene merkwaardige waarneeming mede, welke hy van den Heere GRAIN-

zwellen (*Scrophulæ*) van eene veneriefche oorzaak ontstaande , konnen door kwik geneezen worden , zoo zy niet al te zeer verouderd zyn. De geelzugt , braakingen , en afgangen , die als tot eene gewoonte geworden zyn , fluipen uit dezelfde oorzaak , laaten zich alleen op deeze wyze geneezen. Meestendeels is de vallende ziekte doodelyk , als de kinderen door eene veneriefche oorzaak , dezelve gekreegen hebben. Heeft het vergift zich op de borst geplaatst , en de long verzwakt , dan is 'er weinig hulp te verwagten. *Hepochondristen* , de venus-ziekte krygende , twyfelen altoos , of zy wel volkomen gezuiverd zyn , schoon men hen geheel en al van dit kwaad verloft hebbe. Wanneer zy , die de venus-ziekte hebben , of daarvan niet volkomen bevryd zyn geworden , door eene heete ziekte wor-

GRAINGER ontvangen heeft. Een soldaat , die , nevens den scheurbenik , de venus-ziekte had , werd op eenen avond met eene zalf gefineerd , waar onder een dragma kwik was. Den dag daaraan volgende begon hy reeds te kwylen. De kwyling nam allengskens toe tot op den tienden dag , wanneer de mond , lippen en wangen , ongemeen gezwollen waren. Dagelyks spoog hy eene meenigte stinkende en bloedige stukken van het tand-vleesch uit. De tanden vielen meest-al uit , en waren grooter , dan te vooren. Zyne pis had eenen lelyken stank , was dik en zwart ; hy werd dikwils flauw , en bevondt zich in zulke naare omstandigheden , dat hy niet , dan met groote moeite , behouden wierd. Ook was hy na drie maanden eerst in staat , om zynen dienst weder waar te neemen.

worden aangetast; dan schieten zy gemeenelyk het leven 'er by in.

Hoe meer zich de ziekte, tot de oppervlakte der huid, met uitslag en zweeren, bepaalt, dies te minder pyn gevoelen de zieken. Van daar is het, dat zy, die op de eene of andere plaats pyn lyden, eene verligting bemerken, wanneer men eene spaansche-vlieg daar op legt; doch zoodra de huid wederom geneezen is, keerd de pyn met dezelfde hevigheid weder.

Ik gaa tot de genees-wyze zelve over, en zal daarby 't eerst opgeeven, hoe eene zwangere vrouw te helpen zy, die het ongeluk gehad heeft, door de venus-ziekte aangedaan te worden, en gevolglyk noodzakelyk haare vrugt besmet. Daar is geen tyd, zich by zulke omstandigheden lange te beraaden; 'er word eene spoedige hulp vereischt; stelt men deeze uit tot na de verlossing, dan kan de vrugt in dien tussehen-tyd sterven, of wel half verrot, of genoegzaam dood, ter waereld komen. De Moeder kan intussehen seenen mis-kraam krygen; of het veneriesch vergift kan by haar zulke gezwollen, verhardingen, uitwasfen, zweeren, en uitzettingen van het been (*Exostoses*) voortbrengen, dat zy niet kan verlossen, en gevolglyk, of de vrugt, of zy zelve, of beiden, het leven daarby inschieten moeten. De Hooggel. Heer DEYDIER verhaalt zoo een geval (*Dissertation sur les maladies veneriennes*, p. 84.), waaruit duidelyk blykt, dat Moeder en kind zouden hebben moeten sterven, indien hy haar niet aanstonds had beginnen te smeeren, waar door
beiden

beiden behouden wierden, schoon men zich zoo laat van deeze genees-wyze bediende, dat zy niet, dan drie weeken voor de verlossing, eindigde. Zulk eene zwangere vrouw moet derhalve ten eersten voorbereid, en met veel behoedzaamheid gesmeerd worden. Hoe, zoo wel 't een als 't ander, geschiede, zal ik aanstonds opgeeven.

Dat het te doen zy, en zonder eenig byzonder gevaar geschieden konne, heb ik gelegenheid gehad te ondervinden, wanneer eene vrouw, die reeds zes maanden zwanger was, my haaren toestand ontdekte, en hersteld wierd. Zy kreeg niet alleen haare gezondheid weder, maar bragt ook een gezond kind ter waereld; en na dat haar man zich insgelyks aan deeze cuur onderworpen had, heeft zy naderhand verscheide gezonde kinderen voortgebracht. HILDANUS hielp op deeze wyze eene vrouw, haare vrugt, en een haarer kinderen, 't-welk zy zoogde. De Heer DESSAULT (*Dissertation sur les maladies veneriennes*) en de Heer GOULARD (*Oeuvres de Chirurgie*) geeven nog meer waarneemingen van deeze soort aan de hand.

Indien een kind met de venus-ziekte gebooren, en nog eenigzins tierig is; dan kan het te regt gebracht worden, wanneer de Moeder zich laat smeerren, en daarby aan het kind de borst geeft; doch daartoe te zwak zynde; dan moet men eene Minne voor hetzelfde neemen, die deeze cuur ondergaat: in welk geval het raadzaam is, haar alvorens de reden daarvan bekend te maaken, ten ein-

de zy den ouden geen onaangenaam proces daar over aandoen, gelyk eens in Vrankryk gebeurd is.

Doch dewyl dikwils, ja, meest altyd gebeurt, dat, als zulk een kind zuigt, de tepels en de borst van de Moeder of Minne zoodanig zwellen en zweeren, dat het niet zuigen kan; dan is men genoodzaakt, tot een ander, en mogelyk veiliger middel over te gaan, namentlyk, het kind met gelten-melk te voeden, tot dat het de ziekte te boven gekomen is: Doch dan moet men alvorens de hairen van de geit zorgvuldig affnyden en affcheeren, en haar gelyk, eenen mensche, met eene kwik-zalf smeeren. De Heer d'AUMONT, Hoogleeraar in Valence, heeft op deeze wyze een kind binnen de vyf en dertig dagen gezond gemaakt; en de Heer LEVRET verzekert, dat hy op dezelfde wyze verscheide kinderen behouden hebbe.

Is het kind reeds gespeend; dan kan het van deeze zelfde melk gebruik maaken; maar heeft het reeds het twaalfde jaar berykt, dan kan men, als men naauwkeurig en behoedzaam te werk gaat, hetzelfde op de gewoone wyze smeeren, of men kan het den *Syrupus Mercurialis* van PLENCK (*) laten

(*) De bereiding daarvan is als volgt. *R. Mercurii vivi dr. ꝑ. Gummi Arabici dr. j. ꝑ. terantur invicem in mortario lapideo, addito medio cochleari aquæ fumarie, donec mercurius dispareat in mucum, sensim conterendo admisce syrupi violarum unc. ꝑ. aquæ florum sambuci unc. j.*

BIER.

laaten gebruiken, tot een thee-lepel vol eens of twee maalen 's daags. Ik zal daarvan in het vervolg ook spreken, en opgeeven, hoe die voor kinderen moet bereid worden.

Ik weet wel dat men zich gemeenelyk liever bedient van den *Mercurius dulcis*, de *Panacea Mercurialis*, en soortgelyke middelen, uit kwik bereid, en met een mineraal-zuur verbonden; ook sta ik toe, dat verscheide daardoor geneezen zyn: Maar ik weet ook teffens, dat zulke middelen zeer dikwils heevige buik-pynen, eenen kwaadaartigen loop, of eene onmaatige kwyling hebben verwekt, die veeltyds de geneezing gevaarlyk en vruchtloos gemaakt hebben. Deeze middelen doen hunne werking schielyker door het verminderen der toevallen, en daar uit besluit men terstond, dat zy door de kwyling;

BIERCHÉN bediend zich van een zeer welsmakend mengsel uit den sublimaat met zuiveren kwik bereid, welk hy op de volgende wyze maakt. Men wryft twee dragmaas gezuiverden kwik in een' steenen mortier met zes greinen sublimaat. Daar by doet men twee en een half of drie loot poeder van Arabische Gom, en wryft alles nauwkeurig onder een. Verder giet men langzamerhand, al omroerende, agt oncen zuiver water, twee oncen stroop van *alibea*, en twee oncen kaneelwater, welk met of zonder *Spiritus* naar maate van de omstandigheden, kan gemaakt zyn, daar by. Voor hen, die eenen lekkeren smaak hebben, kan men overgehaald roozen-water, in plaatse van kaneelwater gebruiken. Het mengsel blyft beeter, als men overgehaald, dan ander, water gebruikt.

ling, die zy verwekken, den voorkeur verdienen voor het smeeren, welk dikwils herhaald moet worden. Doch de daarop volgende instortingen, de dagelyksche ondervinding, en de schriften der Geneesheeren bewyzen, dat veele, die na herhaalde kwyling zonder hulp gebleeven zyn, door het smeeren volkomen hersteld zyn, nadat dit dikwils herhaald was, en bevestigen myne stelling. Kon men de kwyling voorkomen, als men de *calomel* of *panacea* zoo lang gebruikt, als het smeeren, dan zouden deeze middelen hetzelfde voordeel aanbrengen. Als *calomel* met *Sulphur auratum* en campher vermengt word, dan kan men het in eene vry groote quantiteit zonder kwyling gebruiken, en dan zoude de uitwerking, mogelyk met die der smeeringen overeenkomen. **BIERCHÉN** herstelde daardoor volkomen een' jongen Heer, die een *fluxus hepaticus* uit eene veneriesche oorzaak had, en het smeeren niet verdraagen kon, maar daardoor aanstonds aan het kwylen raakte, gelyk ook eenen anderen zonder kwyling, door hetzelfde middel, waarby in acht genomen wierd 't geen, waarop men anders by de kwyling let.

Hetzelfde heeft plaats ten opzigte van het rooken met *Cinnaber*. In een uitwendig toeval, by voorbeeld, wanneer verhardingen, of kwaade verceltheeden voor handen zyn, kan men daar mede hulpe aanbrengen, wanneer de rook door een tregter na het aangedaane deel des lighaams gedreeven word. Maar de regte venus-ziekte word daardoor niet met zekerheid geneezen. De waarneemingen,
over

over zulke gevallen met vlyt opgeteekend, en door den geleerden ASTRUC wydloopig in zyn werk van de venus-ziekten (pag. 181--208.) aangehaald, toonen dit overvloedig.

De kwyling (*Salivatio*) is by ons zeer in gebruik; doch ik wenschte, dat men dezelve geheel en al afschafte; want 1. gaan daar mede veele ongemakken, en 2. een groot gevaar, vergezeld; 3. is zy onzeker; 4. schikt zy zich niet voor allen; 5. is zy geene scheiding (*crisis*); en 6. kan men dezelve ontbeeren.

Dat veele ongemakken daar mede vergezeld gaan, zal elk bevinden, die bedenkt, dat een, die kwylen zal, eerst eene sterke hitte in den mond bespeurt; dat de klieren aan den hals en in den mond zwellen; het tand-vleesch, nevens de tong, tot zweeren overgaat; dat het geheele aangezicht zwelt, dat de tong dikwils zoo groot word, dat zy in den mond geen plaats genoeg heeft. Zy komt buiten de tanden uit, en zoo de lyder in den slaap den mond sluit, dan kwetst hy de tong, en leidt zwaare pyn. Men is daarom genoodzaakt, iets tusschen de agterste kiezen te leggen, en de sluiting van den mond te beletten. Heeft hy te vooren een tand verloren, dan word de tong in deeze opening geperst, waar door veel ongemak ontstaat. Men moet daarom in zulk een opening een stukje kurk steeken. Wil hy spreken, dan wryft hy de gekwetste tong tegen de tanden, en zulks is pynelyk. Gelyk ook wanneer hy lauw vogt gebruikt. Hierby komt nog, dat de lyder elk oogenblik de kwylen moet

moet uitspoegen, en in 't geheel niet slaapen kan. Raakt hy by geval in slaap; dan is men dikwils genoodzaakt, hem wakker te maaken, alzoo hy anders door de groote quantiteit toevloeiende taaije slym, ligt zou kunnen stikken, voornamentlyk, als hy op den rugge ligt; behalven, dat de tanden los worden, en ten deele gemeenelyk uitvallen; en dat zulk een op eene onnoodige wyze uitgemergeld word, zoo dat hy langen tyd noodig heeft, om zich te herhaalen. Het zou nog aangaan, wanneer eene zoo sterke kwyling, met de daar mede verknogte ongemakken, niet eerder volgde, dan tegen het einde der cuur; want dan zou men kunnen hopen, dat hy hersteld ware. Maar, volgt dezelve na de derde of vierde smeering; dan vloeit de kwik wech, de zieke stort na eenigen tyd weder in, en is genoodzaakt, op nieuws hulpe te zoeken.

Niemand zal ontkennen, dat met eene sterke kwyling gevaar verbonden zy. Komt 'er niet by eene koorts, en somtyds de grauwe of roode loop, eene bloedspoeging, of eenige andere bloedstorting? En als de cuur ten einde gebragt is, en de verzweringen in den mond geneezen zyn; dan kan de onderste kaak niet geöpend worden: het welk de Franschen *Bridure* noemen. Ik zal niet aanhaalen, dat men de tong na de cuur van binnen met het tand-vleesch samengegroeid gevonden hebbe, en soortgelyke toevallen meer, die by elk eenen afkeer van zoo eene genees-wyze verwekken moeten. Ik weet wel, dat thans niemand de kwyling zoo ver wil laten koomen; doch wie is in staat
dezelve,

dezelve, aan den gang zynde, binnen de vereischte paalen te houden?

Dat eene sterke kwyling buiten staat zy, iemand tegen eene weder-instorting te beveiligen, word, zoo wel door de ondervinding, als door de volgende waarneemingen, bevestigd; want uit de proeven, die men in 't werk gesteld heeft, blykt, dat de kwik alsdan schielijk weder uit het lighaam gaat, en meest al gevonden word in het vat, waarin de lyder gespoogen heeft; het overige gaat wech met de afgangen, met de pis, door eene ongevoelige uitwaasfeming en het zweet. Daarom bemerkt men ook, dat een gouden knop bleek word, wanneer iemand, die kwylt, hem, in den beginne der cuur, een halfuur lang, in de hand houdt; doch dit geschiedt niet, als de kwyling reeds eenigen tyd geduurd heeft; even gelyk een ducaat niet van kleur verandert, als men denzelven legt in de kwyl, die, in de midden van de cuur, en eenige daagen laater, uitgeworpen word; want de kwik is alsdan reeds uit het lighaam. Dat de kwyling, des niettegenstaande, blyft aanhouden, word veroorzaakt door de prikkeling, die de verzweringen in den mond verwekken. Hierby komt nog, dat, naardien het grootst gedeelte van den kwik na den mond gedreeven word, zeer weinig daarvan na de onderste deelen van het lighaam komt; het vergift, in den buik en de onderste deelen schuilende, kan daarom onmogelyk daardoor vernietigd worden. Daarenboven is het bekend, dat, als men eene sterke kwyling wil verwekken, het smeeren eenige keeren

kort

kort op den anderen geschiedt, 't welk altoos eene koorts veroorzaakt. Door dezelve worden de kleine vaten gedrukt, zoo dat de kwik niet daarin dringen kan; gevolgelyk kunnen vele deelen van ons lighaam, waarin zich iet van het vergift zou kunnen ophouden, door den kwik niet aangedaan worden; waarom de lyder ligt wederom kan instorten.

Dat de kwyling niet gemakkelyk kan plaats hebben by eene zwangere vrouw, by een teder kind, by zulken, die eene zwakke borst hebben, die reeds zeer uitgeteerd zyn, sterk-gezwolle klieren aan den hals, of leelyke zweeren in de keel of neus hebben, of die aan stuiptrekkingen, of aan de waare vallende ziekte onderworpen zyn, zal elk toestaan. Nu kan men immers deezen door de sineer-cuur te regt brengen, wanneer men dezelve zoo maatigt, dat zy geene kwyling verwekt; waarom zouden dan anderen niet van dit zelfde voordeel kunnen gebruik maaken?

Dat de kwyling geene scheiding der ziekte (*Crisis*) zy, besluite ik, deels, hier uit, dewyl nooit eene waare venus-ziekte door eene van de natuur bewerkte kwyling geneezen word; deels ook hieruit, omdat men door verscheide proeven weet, dat gezonde menschen, welke men, gelyk zieken, met zalf, waarin kwik was, gesmeerd heeft, eveneens aan het kwylen, met denzelfden reuk, en dezelve toevallen, als deeze, geraakt zyn. Men verlangt geen *crisis*, wanneer men den koorts-bast geeft tegen eene tuschenpoozende koorts, den staal-wyn
tegen

tegen eene zwakke maag , het lepel-blad , en de zuuren , tegen den scheurbuik.

Daarenboven is het niet noodzaakelyk , iemand te doen kwylen , alzo bekend is , dat veelen hersteld zyn , by welken men geene kwyling heeft konnen te weeg brengen. Ontelbaar veele zieken zyn na den jaare 1718. volkomen zonder kwyling geneezen ; en de ondervinding heeft geleerd , dat deeze door de cuur geenzins zyn afgemat geworden , geene gevaarlyke toevallen bespeurd hebben , niet mager , maar integendeel vetter geworden , en vervolgens gezekerd geweest zyn voor de wederkering der ziekte. Het eenigst ongemak heeft hierin bestaan , dat zy zich aan dienstige spyzen hebben moeten houden , de maatigheid in eteten en drinken in acht neemen , en binnens huis blyven : Doch hebben zy konnen op- en neêr-gaan , en hunne vrienden na genoeg by zich zien. De Heer CHRCOYNEAU , die eerst Hoogleeraar in Montpellier , en daarna eerste lyf-artz van den Koning van Frankryk was , heeft voornamentlyk deeze gemakkelijke manier , om de venus-ziekte te geneezen , in den jaare 1718. in trein gebragt. De Heer HAGUENOT , die insgelyks aldaar Hoogleeraar was , heeft dezelve vervolgens in den jaare 1732. naar alle gevallen verbeterd. Het is waarschynlyk , dat men dezelve eindelyk overal zal aanneemen , te meer , daar de ondervinding geleerd heeft , dat men op deeze wyze de zieken zoo goed in Parys , als in Montpellier , zoo wel in Londen , als in Parys , en zoo goed in Zweeden , als in eene der genoemde
plaat-

plaatsen, geneezen kan. Het onderscheid bestaat alleen hierin, dat de voorbereiding en geneezing hier wat langer tyd vereischt, en dat men, dezelve geëindigd zynde, niet ten eersten in de lugt komen mag. (*) Ons klimaat is daarvan de oorzaak.

De grond der geneezinge bestaat hierin:

1. Dat zoo veel kwik in het lighaam kome, als noodig is, om het vergift kragteloos te maaken.
2. Dat hy door alle, zelfs de kleinste, vaten van ons lighaam, loope.
3. Dat dezelve elken droppel van het bloed en der sappen van ons lighaan aanraake; en zulks wel
4. niet eens maar meêr-maalen.

De kwik moet daarom eenigen tyd in ons lighaam blyven, overal omgevoerd, en niet aanstonds weder ontlaf worden; gelyk geschiedt, wanneer hy gemengd word met purgeer-middelen, en alleen door de darmen loopen kan; of wanneer dezelve door zweet-dryvende dranken aanstonds uitgedreeven word, of, door eene gemaakte kwyling, zeer schielijk wech loopt.

Om deeze reden moet men 1. genoeg van de kwik-zalf inwryven: De quantiteit kan men niet bepaalen, alzoo die naar maate van den ouderdom, wasdom, de grootte van den lyder, en van andere

(*) In den zomer kan men dit zelfs onder de geneezing toestaan. HALLMAN en BIERCHÉN betuigen, dat men daar door de kwyling sterk tegengaat.

te omftandigheden, verfchillende is: Gemeenelyk worden zeven, agt, tot negen oncen vereifcht. Hoe langer men na elke reize, dat men smeert, wacht, des te minder zelf heeft men noodig, en omgekeerd. Zoo veel te beter en zekerder loopt ook de geneezing af. RAYMUND (*Traite des maladies, qu'il est dangereux de guerir. pag. 303.*) genas een' zieken, by wien door het veneriefch vergift een gat in het bekkeneel gekomen was, met vyf oncen zelf binnen agt maanden, de voorbereiding daar onder gerekend, op zodanig eene wyze, dat alles zeer goed ging, en de opening in het bekkeneel geflooten wierd. Doch wanneer men te vooren de geneezing had willen verhaaften, had hy byna door ftuipen het leven daar by ingefchoten. Daar nu deeze, die zich zelve dit ongemak op den hals gehaalt heeft, agt maanden noodig had, is het dan te verwonderen, dat 'er voor een', die dit kwaad geërft heeft, drie of vier maal zoo veel tyd vereifcht word. Dus blyft meenig een, die men had konnen gezond maaken, zonder hulp, alleen uit ongeduld, en om dat men de cuur te vroeg geeindigd heeft. ASTRUC genas twee zieken, die zeer ver waren, zonder kwyling, door dezelve langen tyd te smeeren. De een had te vooren twee maalen gekwyld; de ander, zonder vrugt, zweet-dryvende middelen gebruikt. Den eenen smeerde men om de vyf, zes, of zeven dagen, en hy genas volkomen in zeven maanden, de ander, die zoo flegt niet was, herftelde in drie maanden.

II. DEEL.

S

2. Men

2. Men wryft daarvan in weinig teffens , namentlyk , anderhalf tot twee dragmen.

3. Men moet het fmeeren niet verhaaften ; maar tusfchen elke reize zoo veele dagen laaten verloopfen , dat geene kwyling volgen kan. Men houdt daarom met het fmeeren op , zoodra de lyder hitte in den mond , of in het tand-vleefch begint te voelen ; en wanneer het tand-vleefch rood word , en eenigzins zweet. Men ziet daaruit ten overvloed , dat de kwik in het bloed gedrongen is.

4. Het lighaam moet te vooren zoo lange , en zoo nauwkeurig voorbereid worden , dat de kwik in hetzelfde geene toevallen verwekke , zich niet aanftonds na den mond begeeve , maar eenigen tyd in het lighaam blyve , en zich allengskens door de huid , en nieren , den afgang &c. ontlaft.

In de voorbereiding beftaat bykans het voornaamft gedeelte der geneezinge. Men moet daartoe , na de omftandigheden van den lyder , langer , of korter tyd neemen. Hoe flegt eene al te korte voorbereiding uitvallen konne , blykt uit het geval , door den Heere *Assefor STRANDBERG* , in zyne bovengemelde Redenvoering , pag. 18. aangehaald. Aldaar leeft men ook , hoe gelukkig het daar mede , na eene nieuwe en lange voorbereiding , afgeloopen zy. Gelyk het eene lighaam van het ander onderscheiden is ; alzo vereifcht ook elk eene byzondere voorbereiding. In het algemeen beftaat zy egter hierin , dat de ader geöpend , en meer of min bloed , naar maate de lyder volbloedig is ,

is, afgetapt worde. Den volgenden dag neemt men een laxeer middel in, 't geen, na een of twee dagen, herhaald word, als men reden heeft te denken, dat de maag en darmen zeer vervuild zyn. Daarbeneven moet de lyder naerftig drinken, of bier-wey, met water verlengd, of water, met een vierde of vyfde gedeelte melk vermengd, of gerften-water met melk, of een drank uit gepelde gerft, fchorzonera-cichorey-gras- of paerden-bloemen-wortelen, met water gekookt, waarby men, nadat het een weinig verkookt, en de pot van het vuur genomen is, doet een weinig zoet-hout, naar elks fmaak. (*) Ten opzigte van het eeten, moet men zorgvuldig zyn, dat men, noch te veel eete, noch spyzen gebruike, waardoor het bloed verhit of fcherp worden kan.

Een der noodzaakelykfte dingen by de voorbereiding zyn lauwe halve baden, waar mede men den dag na de ontlasting een begin maakt. De lyder moet dezelve, naar maate zyner kragten, een- of twee-maal daags, namentlyk, des morgens, en om zes uren 's namiddags, gebruiken. Hoe langer men in het bad kan blyven, dies te beter is het, voorna-

(*) Voor deezen heeft men, geduurende de voorbereiding, of de geneezing zelve, den lyder laten drinken een afkookfel uit pok-hout, fassafras, en foortgelyke; doch men is daarvan afgestapt; want het oogmerk by de voorbereiding is, het bloed te verdunnen, en de vaste deelen meêr medegeevend te maaken, maar niet, het lighaam uit te droogen.

voornamentlyk als de lyder mager en droog is. Ik zou het niet durven wagen, eene zwangere vrouw te laten baaden, uit vreeze, dat het niet wel voor haar mogt afloopen. In Montpellier, in het hospitaal voor de venus-ziekte, is men gewoon, agtienmaal in het bad te gaan: doch men kan het getal der baden niet bepaalen; de eene heeft 'er meer van nooden, maar voor een' ander' zyn deeze genoeg. Na elk bad moet men drinken, of eene slappe vleesch-soep, of een doorgedaan afkooksel van grutten. Als men met de baden ophoudt; dan overlegt men, of ook eene nieuwe aderlating noodig zy. By ons kan men dezelve meestendeels ontbeeren; doch gemeenelyk is het nuttig, het ligchaam op nieuws zacht te zuiveren.

Dikwils gebeurt het, dat wy te doen hebben met lyders, wier omstandigheden, of hevige ongemakken, eene zoo lange voorbereiding niet toelaaften. Het konnen, by voorbeeld, zulken zyn, die reeds zoo verzwakt zyn, dat zy byna niets meer vermogen; wier verzweringen in de keel met het verlies der neus dreigen; by welken de beenderen beginnen aangetast te worden; die eene kwaade borst hebben, zoodat men met reden voor eene verzwering der longe vreesst enz. By zulken is elke vertraaging gevaarlyk; men moet zoo dan aanstonds den raad van den Heere HAGUENOT opvolgen; en, hen, een' of twee dagen lang voorbereid zynde, aanstonds, dan in het bad laten gaan, dan met de zalf laten smeeren, tot dat de hevigheid der ziekte eenigzints verminderd is; 't
geen

gemeendelyk spoedig geschiedt. Alsdan houdt men zoo lange met het smeeren op, en bereidt den lyder door eeten en drinken, doch voornamentlyk door veele baden, even als of hy te vooren niet gesmeerd ware geworden. Doch daarmede begint men naderhand weder op nieuws, en zet hetzelfde zoo lange voort, tot dat de ziekte volkomen overwonnen is (*).

In

(*) De Heer GOULARD, pag. 26. heeft op deeze wyze het leven van eenen Heer behouden, die zich in zyne jonge jaaren veele veneriesche ongemakken op den hals gehaald had, en waar tegen hy alleen palliative middelen had gebruikt. Te vergeefs zegt hy in Holland hulpe. Hy reisde na Parys, om aldaar, voornamentlyk over een gezwel boven aan de borst, ter plaatse daar het sleutel-been zich met het bovenste gedeelte van het schouder-blad vereenigt, raad te pleegen. Men leide pleisters op het gezwel, en het ging over tot veretteringe; van het sleutel-been vielen stukken uit, en de verzwearing wierd geneezen: Maar hy gebruikte geene middelen, om het veneriesch vergift, dat in zyn bloed was, te verdryven. Hy reisde wederom na huis, en meende alles wederom op eenen goeden voet te staan; doch het eene ongemak volgde op het ander, namentlyk, tuschenpoozende koortsen, bloedingen uit den neus, de loop, hier en daar blaasjes, been-gezwellen aan het hoofd; waarby zich te gelyk allengskens de scheurbuik voegde. Thans liet hy zich te water na Montpellier brengen. De Heer GOULARD verschrikte, toen hy hem zag; want hy was zeer mager en bleek, had de anderen-daagsche koorts, en daarby eene onverdraagelyke pyn in alle leden. Zyne blaas-

In het eten moet men, gedurende de geheele cuur, de maat niet te buiten gaan, en in deezen eene goede verkiezing maaken. Men wacht zich voor gezoute, zure, gerookte, vette, harde en gekruide spyzen. Doch de melk-spyzen, grutten-
en

jes en been-gezwollen waren insgelyks pynlyk. Als de koorts verdreeven was, volgde eene sterke bloeding uit den neus: toendeze gestuit wierd, kwam de koorts weder; wanneer men deeze wederom verdreef, kwam 'er by een verzwakkende loop, dien men egter insgelyks overwon. Dewyl dit alles gevolgen van het veneriesch vergift, en de kragten zeer verminderd waren; zoo was het niet mogelyk aan eene ordentelyke voorbereiding, en aan de smeer-cuur te denken, schoon hy voor 't overige eene goede borst had, pas vier en dertig jaaren oud was, en men nog goede hoope tot de geneezing had. De Heer GOULARD volgde de genees-wyze van HAGUENOT, liet den lyder in een half bad brengen, waarin hy 't slegts een kwartieruur lang houden kon. Daarop smeerde men hem met eene zalf, die een derde deel kwik bevatte. Van deeze beide middelen bediende men zich beurtelings, zoodat hy zich in vyf dagen vyf-maal baadde, en tien-maal liet smeeren. By dit alles liet men hem eten soep met kruiden tegen den scheurbuik. Op deeze wyze wierd het veneriesch vergift zoo verre gedempt, dat de lyder reeds wat *manna* om te laxeeren inneemen, en vyf en veertig baden gebruiken kon, waarin hy somtyds in staat was, een geheel uur lang te blyven. Deeze geëindigd zynde, smeerde men hem vyftien-maal in vyf en veertig dagen; en daardoor kreeg hy zyne gezondheid, kragten en lyvigheid weder.

en brood-soepen, als mede de grutten zelve, zyn zeer goed. Dun-gekookte eijeren eet men fomtyds. Gekookte spenaadje, den podding daarvan, brood-podding, kan men ook eeten. Zy, die van eene zwakke en koude natuur zyn, of sterke ontlastingen gehad hebben, kunnen des middags flappe kalfs- of hoender-soep, gebraden vleesch, en hachée van vleesch, eeten. Den wyn laat men wech; zoo de lyder niet geneigt is tot den loop, want in dit geval is hy noodig.

Men moet zich ook van kwetschen, catharine-pruimen, gebrade appelen, *composten* daarvan, en voorts van het geene los-lyvig maakt, onthouden; want men moet zich niet minder voor den loop, dan voor eene te sterke kwyling, in agt neemen.

Daar en tegen zyn dezelve noodig, als de lyder hardlyvig is, want zonder maatige ontlastingen is het niet mogelyk, den kwik van den mond aftehouden.

Dat men eene kwyling te vreezen hebbe, ziet men niet alleen uit de hitte in den mond, de roodheid en zwelling van het tand-vleesch, maar ook uit de hardlyvigheid, verminderde pis-loofing, roodheid van het aangezicht, en slaperigheid. Daarom moet men, in zoo een geval, dan wat *manna* of *castia* geeven, dan lavementen zetten, en naarstig laten drinken. Verscheide dranken zyn reeds te vooren opgegeeven.

Thans moet de kwik-zalf gerceed zyn. Deeze word bereid uit een deel gezuiverden kwik, namentlyk drie oncen, en twee deelen, of zes on-

cen, reuzel. Den kwik wryft men eerst met een weinig therebinthyn, tot dat hy niet meer te zien is. Daarna mengt men denzelven allengskens met reuzel. De menging en wryving moet met vlyt en veel arbeid geschieden; drie volle dagen worden daartoe vereischt, zal ze wel bereid worden (*).

De kwik moet te vooren wel gezuiverd zyn. Dit geschiedt, wanneer dezelve met een houten stamper in een' marmer mortier gewreeven, en als ware het gewasfchen word, en wel in zoo veel water, als denzelven bedekken kan. Het water, dat onzuiver word, giet men teffens met een zwart of donker-bruin poeder, 't welk zich alsdan van den kwik

(*) Dit is van het uiterste gewigt. Want zoo veel te beeter verdeelt men den kwik, en vermengt denzelven met de reuzel, zoo dat hy niet in het bloed en de kwyl-klieren by een loopen kan. Zoo lang de zelf donker-blauw is, is zy nog niet genoeg gewreeven, en verwekt schielyk eene kwyling, doch is de kleur ligt-blauw, dan doet zy dit niet. PETIT bereide de zelf van kwik, uit de cinnaber gehaald. Hy nam daar van b. v. een pond, welk hy eerst met den geest van therebinthyn in een' marmeren mortier vermengde, hier by deed hy vervolgens ongezoute boter. Dit alles wierd twee of drie dagen lang, met alle nauwkeurigheid, gewreeven. Dan voegde hy 'er vier oncen gesmolten reuzel by. Nadat dit wat koel geworden was, wierd alles op nieuws vermengt. Het zal hetzelfde zyn, welke men van deeze zalven gebruike, als men zich maar herinnert, dat deeze de helft, de andere een derde, kwik bevat. Men kan het gebruik daar na inrigten.

kwik afzondert, wech; waarna men 'er op nieuws water opgiet, en daar mede op dezelfde wyze voortgaat, tot dat het water niet meer onzuiver, en geen zwart of donker-bruin poeder gezien worde. De reuzel moet niet gesmolten, maar klein gesneeden, en van syne vliezen en veezelen gezuiverd worden. Indien de zalf niet na behooren gemengd is, zoodat, by voorbeeld, elk dragme niet even veel kwik bevat, dan bedriegt men zich in de verwagte uitwerking. De kwik zakt in het mengfel op den grond, voornamentlyk des zomers.

Wanneer nu alles zoo verre in gereedheid is, men drooge kousfen by der hand heeft, de kamer matig warm is, en men het tand-vleesch en den mond inwendig nauwkeurig onderzocht heeft; dan kan men met het smeeren een begin maaken. De lyder plaatst zich alsdan by het vuur, ten zy de hitte des zomers zeer sterk ware. Zelden laat men toe, dat de lyder zich zelve smeere, maar men neemt daartoe iemand anders. Dees maakt zyne hand warm, en wryft het deel, 't welk men smeeren wil, zoo lange, tot dat de huid begint rood te worden. Men verspreidt alsdan voor de eerste reize, nadat de jaaren en omstandigheden het toelaaten, anderhalf of twee dragmen over den eenen voet, en het geheele been, en wryft die zorgvuldig in. Op de twee of drie volgende dagen doet men niets. Daarna smeert men den anderen voet en het been op dezelfde wyze; en het zelfde geschiedt voor de derde-maal aan de eene lende, en de vierde keer aan de andere. Bemerkt men geene verandering

dering in den mond; dan smeert men de vyfde reize de heup en liefch, en de zesde reize den geheel en rugge. De zevende keer geschied dit aan den eenen arm, en de agtste aan den anderen; vervolgens begint men op nieuw aan de plaatsen, die eerst gesmeerd zyn, en gaat op dezelfde wyze, als de eerste reis, voort, tot dat hy, die het opzigt over de geneezing heeft, begrypt, dat het genoeg zyn zal.

Daar de ongevoelige uitwaasfeming de rykelykste van alle ontlastingen is, en dus ook 't meest de vogten van den mond kan afleiden, is het best, dat men altyd, den dag, nadat men den lyder gesmeert heeft, met zeep-zop, water, en wat brande-wyn, de zalf, die nog aan de huid of haïren mag vastgekleeft zyn, afwascht, op dat de uitwaasfemende vaten geopend, en de opflorpemde in staat gesteld worden, om den kwik by de volgende smeering na zich te neemen. Den lyder in een half bad te zetten, zoude hem mogelyk vermoeijen, zoo hy daar na in sterk zweet raakte, vooral zoo hy eene weeke huid had, en zwak, of met een bedorven maag geplaagt was. Daarom komen zy 'er doorgaans wel door, die deeze cuur 's zomers ondergaan, en zich dan, als het geschieden kan, in een warme lugt in eene maatige beweeging houden.

Men moet, behalven dat, meer-maalen smeeren het deel, of die deelen, welke door de ziekte het meest geleden hebben, voornamentlyk daar beengezwollen zyn, of daar men nog een ander moeilik toeval ontdekt. Tusschen elke smeering, laat men

men twee of drie dagen verloop, voornamentlyk by kinderen, zwangere vrouwen, en zulken, die zwaklyk zyn. Na elke smeering moet men zich, een of twee uren, te bed leggen. Ik moet mede niet vergeeten te herinneren, dat het niet te bepalen zy, hoe dikwils het smeeren moet herhaald worden: Men kan daar mede ophouden, of wanneer de ziekte, en de toevallen, die zich daardoor laaten overwinnen, uit den weg geruimd zyn (*), of,

(*) Oude been-gezwollen, verzuimde gezwollen in de liefen, die zeer hard geworden zyn, en de zoogenoemde *Dartres*, kan men niet altyd daardoor geneezen: Doch zy kunnen verder geene ongemakken veroorzaaken. Uitwendige zweeren zyn gemakkeliker te geneezen, wanneer men plukfel, met den kwik-geest bevochtigd, 'er inlegt. Even eens is het gelegen met de chankeragtige zweeren. Zyn dezelve zeer onzuiver; dan maakt men gemeldengeest sterker; BIERCHÉN neemt gemeenelyk vier grein' sublimaat tot een once *Spiritus vini*; doch somtyds zyn zy zoo gevoelig, dat zy geene scherpte, hoe genaamd, verdraagen; alsdan bestrykt men hen met versche, ongezoute, botter, of met eene zalf van room, tot dat het smeeren op nieuws zyne uitwerking doen kan. De veneriesche uitslag verdwynt ook schieliker, wanneer men met lauw water gemelden geeft verdunt en zich daar mede wascht. De uitwasfen, van gedaante als een uije, laaten zich afbinden of affnyden, indien ze onder de cuur niet afvallen. Door den rook van *Cinnaber* bevordert men de verdeeling van harde gezwollen, als dezelve noodig geoordeeld word. Men leeze verder over zulke overblyffelen de schriften van ASTRUC en FABRE.

Aller

of, om my nog duidelyker uittedrukken, zoo dra de Geneesheer, uit den tyd, en gebruikte zelf, uit den ouderdom van de kwaal, uit het verdwy-
nen der toevallen, vooral wanneer de geneezing, zonder kwyling of sterke afgangen afgehoopen is, besluiten kan, dat 'er niets meer noodig is. Men laat zich alsdan met zeep en lauw water waschen, neemt eenige reizen een laxer-middel in; gaat lang-
zaamerhand tot zyne gewoone levens-wyze over; doch draagt zorg, om niet te vroeg in de lugt te komen. Zeker iemand, die in een dun zyden-kleed in de lugt kwam, eer het hem geoorloft was, kreeg daar door een colyk, waar van hy ter nauwer nood gered wierd. Een ander stierf, dewyl hy kort na de geneezing al te veel gebak gegeten had; en FABRE spreekt van iemand, die zich door rosy-
nen een' loop op den hals haalde, zoo dat hy met moeite behouden wierd.

Eenige lighaamen zyn van die gesteldheid, dat de kwik zich aanstonds na den mond wil begeeven; daarom verzuimt men niet tusfchen elke smeering den mond van den lyder te bezien. Bemerkt men, dat eene kwyling staat te volgen, dan stelt men het
. smee-

Aller noodzakelykst is het, dat men zorg draage, dat 'er geen uitwendig ongemak overig blyve, door welk de ziekte op nieuws, na verloop van eenigen tyd, zou kunnen wederom opgewekt worden. HILDANUS heeft in 1589. dit reeds gezegd, en met waarneemin-
gen bevestigd. Verzuimd men zulks, dan zal de lyder vroeger of laater wederom instorten.

sineeren uit, tot dat men wederom zeker is, en laat by zulk eenen tusfchen elke sineering, eenige dagen verloopē. Zou des niet tegenstaande; dat nogtans zeer zelden gebeurt; eene kwyling willen volgen, dan verandert men aanstonds van hembd, kousfen en lakens: het geene van de zalf aan de huid is blyven kleeven, word afgewasfchen; men gebruikt een of meêr laxeer-middelen, en ftelt, de pols vol en fterk zynde, eene aderlaating in 't werk. In Montpelier maakt men aanstonds gebruik van lauwe halve baden. Eene vermeerderde uitwaasfeming leid de vogten van den mond af. Zyn meêr menfchen in een vertrek, die ook gefmeerd worden; dan moet de een terftond in eene andere kamer gaan; want in de eerfte is de lugt met de uitwaasfemingen van den kwik gevuld, die door den mond met de ademhaling, en door de huid, in het ligchaam zou konnen dringen: Vandaar is meenig een in zulk een vertrek aan het kwylen geraakt, eer men hem eens gefmeerd had.

Ik moet insgelyks fpreken van eene andere en zeer bekwaame manier, om de venus-ziekte te geneezen, alzo ik bemerke, dat dezelve met veel nut in Engeland gebruikt word, en vernomen hebbe, dat zy met voordeel in de Fransche Armée, gedurende den laatften oorlog, aangewend is. LOCHER (*Obferv. Praët.*) berigt mede, dat hy in een der Weensche hospitaalen 4880. menfchen daardoor herfteld hebbe. GARDANE (*Recherches pratiques. Paris 1770.*) heeft allerduidelykft de onfchuld en voortreffelyke werking van dit middel bewee-

weezen , en zyn gezegde met veele waarneemingen bevestigd (*). Ik heb niet veel ondervinding daarvan, alzoo het my aan geleegenheid ontbrooken heeft, om dikwils proeven daar mede te doen; ik moet nogtans betuigen, dat zy , dien ik dit middel aangeraaden hebbe , volkomen daardoor geneezen zyn. Indien men deeze genees-wyze zeer lange voortzette; dan zoude ik gelooven, dat men voor de weder-*inf*orting zeker zou zyn. Ik weet ten minsten, dat eenige arme menschen, die ik, voor langer of korter tyd, daar mede hielp, nog gezond zyn. Hierby word geene andere voorbereiding vereischt, dan een of twee laxeer-middelen, als het noodig is, eene aderlating, welke voornamentlyk in volbloedigen, de kragten groot zynde, of als 'er toevallen van ontfteeking bykomen, nuttig is, en, zoo de lyder zeer droog en mager is, eenige lauwe baden. De ondervinding heeft geleerd, dat de zieken zich van dit middel bedienen kunnen, en hunne bezigheden egter verrigten, zelfs kan men het aan kleine kinderen geeven, mits dat het zonder brande-wyn bereid worde. By zwangere vrouwen is het eenigzins twyfelagtig, want, daar het de stonden bevordert, zoude het haar nadeelig kunnen zyn, zoo men niet te vooren door aderlatingen daar voor. gezorgd had. Voorheen heeft men

(*) Zelfs FABRE, die de kwyling zoo sterk verdedigd, erkent, dat dit middel, volgens de manier van VAN SWIETEN bereid, het kragtigste tegen de *dartres* is.

men het niet toegestaan aan iemand , die een zwakke borst had , doch herhaalde proeven hebben beweezen , dat ook deeze niets kwaads daar van te vreezen hebben. Men moet den Heer Baron VAN SWIETEN ten minsten de eere geeven , dat hy dit middel in een algemeen gebruik gebragt hebbe (i). Hetzelve word op de volgende wyze bereid :

℞. *Mercurii sublimati corrosivi in pulverem subtilissime trii gr. xxiv.*
Spiritus ardentis e frumento. ℥. iv.
Digere , subinde agitando , donec Mercurius Solutus sit. Dr. ad Lagenam Vitream.

Dit middel word in onze Apotheken *Spiritus mercurialis* genoemd (*). Wy toefden niet lange ,
 om

(i) Hetzelve is reeds zeer lange bekend geweest , en ook , volgens het getuigenis van den Heere MEDICUS , in de Palts , in den jaare 1650 gebruikt. Veelen zeggen , zeer gewenschte gevolgen van hetzelve gezien te hebben ; doch de ondervinding heeft geleerd , dat men hetzelve geenzins hebbe aan te merken , als een zeker middel , maar dat het slegts in weinige gevallen te pas kome. Ik heb hetzelve vrugtloos gebruikt in gevallen , waarin de smeersels de geneezing bevorderd hebben ; doch teffens bevonden , dat het goed is , om , na het smeeren , de overblyffels der ziekte , zoo 'er eenige in het ligchaam zyn mogten , wech te neemen.

(*) In Zweeden behoudt dit middel den lof , dien men het te Weenen gegeven heeft. Men zie AURIVILLII *Diff. de spiritu vini mercuriali.* (*Thesaur. Differt. vol. 2. pag. 307.*) en DARELIUS *Socken-Apothek p. 141. M.*

om het te beproeven, en voornamentlyk zette ik den Hr. ELF aan, om hetzelfde in het Hospitaal te Stockholm te gebruiken. Doch wy ondervonden welhaast, dat de lyders, wegens den ondragelyken smaak, niet lang daar mede voort konden gaan. Daarom lieten wy in zuiver bronwater de sublimate smelten, nadat het in een glazen mortier zeer fyn gewreeven was (*). Wy namen dan, naar maate van de meerdere of mindere aandoenelykheid des lyders, zes, agt, tot twaalf greinen, mengden die eerst in een mortier met een weinig water, en, nadat de kwik daar in volkomen gesmolten was, gooten wy het in een vles, welke twee pond zuiver bron-water bevatte, zeigden het door grauw papier, vermengden dan daar mede een weinig stroop van braambosfen, en schudden alles onder een. Dit noemde men in de Apotheken *solutio mercurialis*. Hiervan gaven wy den lyder, in de eerste dagen, een' spyslepel half vol 's morgens en 's avonds, in een théé-kopje met den gewoonen drank aangevuld. Dit gebruikt zynde, lieten wy daarop gersten-water, brood-water, of een hoender-soep drinken, of ook een afkookfel van de *sarsaparilla* met melk. GARDANE laat hen, die het verdraagen kunnen, en zeer uitgemergelt zyn, melk daar op drinken. Wat men ook verkieze, men moet veel drinken. Sommigen geeft hy het in Chocolade. Bespeurt men krimpelingen in
den

(*) GARDANE wryft den *mercurius sublimatus* met eene gelyke quantiteit ammoniak-zout, en ontbindt dit mengfel in overgehaalt water.

den buik, dan geeft men terstond drinken. Zy, die hiervan misfelyk worden, kunnen eerst den *mercurius* in vier of vyf oncen goeden brande-wyn ontbinden, en verder water gebruiken. Naar de gesteldheid van de maag moet zich de Geneesheer schikken.

Nadat wy de maag twee dagen aan dit middel gewoon gemaakt hebben, dan geeven wy 's morgens en 's avonds een spys-lepel vol, en naderhand, als het geen nadeel doet, een spys-lepel vol tegen den middag en avond. Hooger moet men niet komen, zonder toestemming van den Geneesheer. Op deeze wyze gaat men voort, niet alleen tot dat de lyder schynt gezond te zyn, en de uitwendige tekenen der ziekte niet meer bespeurt worden, maar ook naderhand; zoodat b. v., als 'er zefstien of twintig greinen noodig geweest zyn, wy hem overreeden, om nog evenveel te gebruiken, opdat hy zeker zy, niet wederom te zullen instorten. Waar is het, dat het moeiljelyk valt, den lyder daar toe te krygen, nadat hy bevindt, dat hy geneezen is; doch men moet hem opregt zeggen, dat hy anders niet zeker is. Het best is, zulks te vooren met hem af te spreken. Een Geneesheer moet nooit iemand onder handen neemen, ten zy hy in allen deele volkomen gehoorzaam zy.

Dezelfde spyzen kunnen by deeze cuur gebruikt worden, als by de vorige. Eens of tweemaal in de week moet hy een buik-zuiverend middel gebruiken. De *manna* en *pulpa castæ* zyn de besten. Arme lieden kan men de Jalappe geeven, met zuiker

ker gewreeven. De ondervinding heeft geleerd, dat de geneezing dan beter en zekerder is. Gaat men met die omzigtigheid, als gezegd is, voort, dan heeft men voor geene kwyling te vreezen, want dit middel vermeerderd van zelve de uitwaasfeming en pisloozing. Het aanhoudend drinken bevordert hetzelfde oogmerk, en de laxeer-middelen houden het lyf open. Als deeze drie wegen open zyn, volgt 'er niet ligt eene kwyling. Openbaarde zich dezelve, dan houd men eenige dagen op met het gebruik van dit middel, drinkt meêr, en zuivert den buik. In warme landen geeft men den lyderen vryheid, op den dag uit te gaan, als het weder goed en warm is; en dit staat men hun ook toe by ons tegen den middag in de zomer-maanden. Hoe eerder de toevallen verminderen en verdwynen, des te beter is het; gaat het daar mede langzaam, dan moet de gifte vermeerderd worden.

Ik heb reeds eenige middelen voorgestelt, welke tot herstel van kleine kinderen kunnen gebruikt worden. Het gemakkelijkste en zekerste is de *solutio mercurialis*. Men bereid dezelve voor hen, op genoemde manier, met dat onderscheid, dat men slegts zes greinen *mercurius sublimatus* in plaate van twaalf neemt. Men geeft het middel in melk, en die word ook daarop gedronken. De gifte is in den beginne maar een thee-lepel half vol, twee-maal 's daags. Het kind moet ook een of meêr-maalen 's weeks laxeren. In tyds en dikwils moet men den mond onderzoeken, of 'er ook slym na de keel schiet, waardoor het zoude kunnen stikken, terwyl

terwyl men door buik-zuiveringen, inspuitingen, en voortgelyke middelen, eene afleiding te weeg brengt.

De twee genoemde genees-wyzen der Venus-ziekte zyn ontegenzeggelyk, de beste. Doch het aller-voorzigtigst is, dezelve te vereenigen, op zodanig eene wyze, dat de lyder, het ongemak zeer zwaar of verouderd zynde, zoo wel zich laate smeeren, als de *Solutio Mercurialis* gebruike, gelyk zulks VAN SCHULZENHEIM en BIERCHÉN reeds voor eenige jaaren gedaan hebben. Men bereid eerst den lyder door eene goede levens-regeling, aderlatingen, buik-zuiverende middelen, en baden; beginnd dan met de *Solutio mercurialis*, en bevordert de werking door het inwryven der kwik-zalf, zuivert met zeep-zop, water, en brande-wyn de huid van de zalve, die aan dezelve kleeft. Men gaat op dusdanig eene wyze voort, dat 'er noch eene kwyling, noch sterke ontlasting van afgang volge. Zoo de scheurbuik by de venus-ziekte gekomen is, moet dezelve of te vooren, of intusfchen geneezen worden. Dikwils gebeurt het, dat been-gezwollen, been-eeters, of pynen in het gebeente, verharde gezwollen, voornamentlyk in de liefchen, door het smeeren zich niet laten overwinnen. Doch, als de *Solutio mercurialis* teffens gebruikt word, zoo verdwynen deeze ongemakken. Dus ziet men ook, dat eene veneriefche uitflag door de *Solutio mercurialis* niet verdwynen wil, doch zich niet meer vertoont, als men ook de zalf gebruikt.

Men heeft nog andere genees-wyzen voorgesla-

T 2.

gen.

gen. Ik zal flegts van eenige fpreeken. **PLENCK** (k) vereenigt zuiveren kwik met Arabifche gom , laat dezelven nauwkeurig onder een wryven , en voegt daar by *aqua fumariae* , en *syrupus kermesinus*. Of hy maakt , door middel van het *extractum conii* en zoet-hout pillen daarvan. Zal de kwik na behooren gemengt blyven , dan moet men meer Arabifche gom neemen , als **PLENCK** doet : anders valt de kwik , na verloop ven een uur , op den grond van het glas , en vertoond zich aldaar in de gedaante van een grauw poeder , vermengt met zichtbaare deeltjes van levendigen kwik. De werking van dit middel is vry langzaam. Daarom raad **GARDANE** twee pond' daarvan met zeven of agt oncen zuiver water te vermengen , waar in men vier grein' *mercurius sublimatus* gefmolten heeft. Dit kan dan even eens als de *solutio mercurialis* gebruikt worden.

GERVAISE mengt in een' lepel zoo veel zuiveren kwik , als hy op eens wil laten gebruiken , met een ftroop , en gelooft , daar door hetzelfde oogmerk te zullen bereiken.

Andere mengen den kwik met honig. **NICOLE** vermengt dien met een deeg , en maakt befchuit daar-

(k) De bereiding der middelen van **PLENCK** vindt men befchreeven in een werkje. genoemd *methodus nova & facilis argentum vivum aëris venerea labe infectis exhibendi*. In Natuur-en Geneesk. Bibliotheek IV. D. pag. 153. **ODHALIUS** heeft in het Hospitaal in Stockholm dit middel ook met vrugt gebruikt. Zie Geneesk. Verhandel. IV. D. pag. 303.

daarvan. De gifting, daar in verwekt, zoude den kwik werkzaamer kunnen maaken. Op dezelfde wyze schynen de pillen van BAIROS, en BELLOSTE te werken; over welke men GARDANE kan naflaan. Doch op zulke middelen verlaat ik my niet graag. Want of zy verwekken eene kwyling, of de kwik gaat met den afgang uit het lighaam, want doorgaans zyn purgeer-middelen daar by gevoegd. Even eens denk ik omtrent het middel van KEYSER, waar over zoo veel voor en tegen gefchreeven is, en dat uit kwik en azyn bereid word, 't welk hy mogelyk uit de fchriften van MARGGRAF zal geleert hebben. SAUVAGES en andere pryfen hetzelfde, als het kwaad zeer ingewortelt is, en op het getuigenis van deeze verlaat ik my meer, dan op dat van veele groote Heeren, welke KEYSER op zyne zyde heeft weeten te krygen. (e)

VENEL, een Hoogleeeraar in Montpellier vermenkt de *panacea* met een weinig *turpethum minerale*,

(e) KEYSER heeft voor eene belooning, van den Koning van Vrankryk ontfangen, zyn middel bekend gemaakt aan den Hr. SENAC: het recept heeft men vertrouwt aan den Hr RICHARD, met belofte, dat het niet eerder zoude bekend gemaakt worden, dan na den dood van KEYSER. Deeze nu gestorven zynde, heeft RICHARD hetzelfde bekend gemaakt in *Recueil d'Observations de Medecine des Hôpitaux militaires* tom. 2. en de Heer A. LENTFRINCK heeft in zyne *Uitgezochte Genees- en Heelkundige verbandelingen, en waarnemingen*. I. D. 2. st. pag. 248—270. deeze ontdekking vertaald geplaatst.

rale , en bediend zich dikwils daarvan in plaatse van de pillen van KEYSER.

Afkookfels uit de *radices chinæ* , *sarsaparillæ* , *sassafras* , en vooral *guajacum* , waren voorheen zeer in gebruik. ULR. VAN HUTTEN , die negen jaaren lang met deeze ziekte geplaagt geweest is , en elf reizen zonder nut gekwylt had , wierd , volgens zyn eigen bgrigt , door een afkookfel van het Pokhout geneezen. De Geneesheer van Keizer KAREL V. verzekerd , dat hy daardoor drie duizend ongelukkigen gered heeft. Een der Koningen van Vrankryk wierd , zoo als men zegt , door een afkookfel van de *bardana* geneezen. Doctor FELZ wordt verhaald verwonderlyke zaaken met zynen drank verrigt te hebben , doch hy stierf , zonder te ontdekken , waar uit dezelve bestond. Ik wil hem niet verdenken , gelyk kwakzalvers , die meestendeels de gochel-kunst verstaan , en in hunne dranken , zonder dat men het merkt , een kwik-middel doen , en daarop pogchen , dat zy deeze ziekte alleen door kruiden geneezen , daar de voornaamste werking van den kwik afhangt. Men weet , dat afkookfels van het pok-hout en de *sarsaparil* dikwils helpen , wanneer zy gebruikt worden door menschen , die zonder vrugt dikwils gekwylt hebben. Het vergift schynt by deeze veranderd te zyn , en zich onder de gedaante van jigt te vertoonen. Deeze middelen krygen wy nooit versch , van daar is het , dat zy minder nut doen , dan in *America*. Twee jongelingen , die in 1563. zeer veele middelen gebruikt hadden , en zoo elendig waren , dat de buuren 'snagts
het

het gekerm konden hooren, waren genoodzaakt, naar *America* te reizen, alwaar zy door een afkookfel van verfch pok-hout herstelden. Zie *Parallele des differentes methodes de traiter la maladie venerienne*. pag. 30. Dr. RAYMOND in Marſeille, die voorheen het ſmeeren aanraade, zonder kwyling daardoor te verwekken, en vervolgens meestendeels de *ſolutio mercurialis* voorschryft, laat zynen lyderen op het einde der geneezing een afkookfel der houten gebruiken.

By hen, die zonder voorbereiding en zonder orde, dan het eene, dan het andere, middel gebruiken, veranderd het vergift zich eindelyk op zodanig eene wyze, en hunne werktuigen worden zoo ongevoelig, dat zy door niets aangedaan worden. Men heeft voorbeelden, dat de zulken door pillen met den *mercurius ſublimatus corroſivus* hersteld zyn; derzelver werking is zeer ſterk, en zy moeten daarom niet, dan in den hoogſten nood en onder het opzigt van zeer ervaren Geneesheeren gebruikt worden. Men bereidt dezelve uit *mercurius ſublimatus corroſivus*, *mercurius dulcis*, *g. guajacum*, *ammoniacum*, *senna*, *pyrethrum*, en *syr. de ſpina cervina*. In de opgegeeve omſtandigheid worden zy zeer geroemd door GUIJON, DE LA SONE, en FABRE, bevestigende hunnen lof door de ondervinding. Van den ſublimaat komt een agt en twintigſte deel daarin, en dus niet een twintigſte, gelyk ASTRUC zegt. Daar de werking van den ſublimaat afhangt, ſchynt de *ſolutio mercurialis*

in grooter giften met meer zekerheid hetzelfde nut te zullen doen.

FABRE deelt nog een ander middel mede, 't welk hem van iemand opgegeven is, en dat hy met voordeel, gebruikt heeft, als de kwik kragtenloos is geweest, vooral in eene zwelling van de knie. Het is eene tinctuur uit brande-wyn, merg van coloquint, kruidnagelen, ster-any's, saffraan, en *terra foliata tartari* bestaande. De voornaamste uitwerking bestaat in sterke ontlastingen.

Voor eenigen tyd heeft men ons hoop gegeven, arme menschen van de venus-ziekte te kunnen verlossen door een eenvoudig middel, 't welk ook hier te lande groeit. Ik meen de dolle kervel, *conium*, *cicuta*, die door STÖRCK gepreezen is, en waar van de nuttigheid door COLLIN bevestigd word. Dit kruid kan men, als thee, in een afkooksel, in soep, in een stooving, in pillen, die uit het extract, en poeder bereid worden, gebruiken. Ik heb daar van geene ondervinding, doch verneem van eenige myner vrienden onder de Geneesheeren, dat de *cicuta* goede uitwerkingen gedaan heeft tegen de overblyfsels van deeze ziekte, welke door den kwik niet hebben kunnen wechgenomen worden (*).

In

(*) In Zweeden is de *Cicuta* veeltids zeer nuttig geweest. ROSÉN heeft my schriftelyk een geval medegedeeld, welk alhier verdiend geplaatst te worden. „Ik heb thans een nieuw bewys van de nuttigheid van het *extractum cicutæ* in pynelyke klier-gezwellen. Aan de
lin-

In keel-ziekten, uit deeze oorzaak voortfpruitende, heeft zy veel uitgeregt, wanneer dezelve als een pap, en om te gorgelen gebruikt is. (*).

Aan het *extrañum aconiti* met zuiker word den zelfden lof gegeven; en dat de *flammula jovis* veneriefche verzweringen geneeze, heeft Störck ook in een byzonder werkje getoont. Hy laat dezelve in een aftrekfel of afkookfel gebruiken, en ftrooit het poeder in de zweeren. De tyd, en proeven in Hospitaal-

linker borst vaneene vrouw, ontftond, na een ftoot, eene ontfteeking, welke tot verettering overging. De etter kwam door vyf openingen te voorscheyn welke zich van zelve slooten; doch 'er bleef een harde, ongelyke klomp over, die zoo groot was, als een vuift, en nu en dan veel pyn veroorzaakte? Ik gaf de arme vrouw pillen uit de *cicuta*, en liet een pleifter daar van aanleggen; de pyn verdween daar door terftond, en de klomp verdween langzaamerhand". De onpartydigheid vereifcht egter ook, dat ik gedenke de veele vrugtelooze proeven, over welke ACREL (*Tal om nodvändigbeten och formaonen af de chirurgiska bandalagens förkortande i utofrningen* p. 41.) klaagt gelyk ook WAHLBOM (*Medicinal werkets tillstånd i Sverige* pag. 105.), die in het kort veele leezens-waardige gevallen mededeelt. M.

De nuttigheid en fchadelykheid van dit middel heb ik, op onderfcheide plaatfen van de Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek, aangetoont, en opgegeeven, hoe de proeven in veele landen daar mede uitgevallen zyn. S.

(*) Het oordeel van COSTE en TISSOT, (*avis au peuple* pag. 669.) bevalt my zeer.

pitaalen zullen moeten leeren, of deeze genees-wyze standgrypen konne.

De Regimers-Heelmeester en Asfessor SUNDELIN laat het geheele lighaam met den *Spiritus mercurialis* waschen, en geneest op deeze wyze ingewortelde venus-ziekten. Dat de kwik dus in het bloed kome, leert men daaruit, dat in een geval de lyder aan het kwylen is geraakt. *Chirurgiska Handelser* pag. 92.

Ik heb zoo veele genees-wyzen opgegeeven, dewyl de ziekte zoo onderscheiden is, en zich onder zoo veelerley gedaanten vertoont. De onderscheidde jaaren, het temperament, geslagt der lyderen, vereischt verschillende behandelingen. Een overgeërft ongemak moet anders aangetast worden, dan een, dat naderhand verkregen is; anders een nieuw, dan verouderd. Met onderscheide andere ziekten en ongemakken gaat de venus-ziekte sommtyds gepaart. Zieken, die zoo onderscheiden zyn, laten zich niet op eenerley wyze helpen. De een verdraagt dit middel, de ander een ander. By sommigen moet men meer dan eene genees-wyze gebruiken. Een Geneesheer moet daarom verstandig, een lyder zeer gehoorzaam zyn.



VERHAN-

VERHANDELING
OVER DE GEBREKEN
WELKE DE
K I N D E R E N,
somtyds kort na de geboorte treffen,
EN TOT DE
HEELKUNDE
BETREKKING HEBBEN.

DOOR
CAREL JOSEPH OEHME,

te Leipzig uitgegeeven, in het
Jaar 1773.

VERHANDELING
OVER DE GEBREKEN,
welke de
K I N D E R E N
Somtyds kort na de geboorte treffen,
EN TOT DE
H E E L K U N D E
Betrekking hebben.

§. I.

Inleiding.



AN zyne eerste wording af is de mensch bloot gesteld aan zoo veele ziekten, dat men, deeze met aandacht overweegende, zich niet genoeg kan verwonderen, hoe nog zoo veele kinderen levend ter wacrelt komen, en, de gevaaren van hunne eerste kindsheid ontworfeld zynde, eenen volkomen wasdom bereiken.

Wat zyn 'er immers niet al zaaken van het grootste aanbelang in staat, om de kinderen, nog in hunner Moederen lighaam beslooten, nadeel aan te brengen! Tot het opnoemen van dezelve, zouden byna woorden ontbreken.

Van

Van den kant der Moeder, ziet men nu en dan kwaade gevolgen door het maakfel van de Baarmoeder, de vasthegting van den Moeder-koek, en meer andere omftandigheden; en hoe veelerley oorzaken zyn 'er niet, welke van buiten worden aangebragt, en het kind van het leeven berooven, ja ook de Moeder eene mis-kraam doen krygen?

Maar geeft men agt op den navel-ftreng, en de nageboorte, dan word men gewaar, dat een kind door dezelve in zyne eerfte beginselen op onderscheide wyzen kan worden beledigd, en bloodgefteld aan het grootfte levens-gevaar; zaaken, welke de Heer BURDACH voortreffelyk heeft behandeld (a).

Ja boven dit alles ontbreekt het aan geene oorzaken, welke de geboorte of moeijelyk, of tegennatuurlyk, doen worden, en het leven van het kind dikwils in gevaar brengen.

Maar is nu de mensch gebooren, dan word hy egter fomtyds, al bleef hy voor de opgenoemde oorzaken bevyligd, bezogt door ziekten, welke in hem ontftaan uit een smet, het welk de Ouders trof, en deeze worden *overgeërfd* ziekten genoemd; eene zaak, die, wat betreft de Venus-ziekte, de jigt, en meer andere kwaalen, over bekend is, of in een ander geval treffen hem zulke gebreken, welke ontftaan zyn in dien tyd, dat hy in de baarmoeder

(a) *Diff. de læsione partium, fœtus nutritioni infervientium, abortus causa. Lips. 1767.*

der was beflooten, en deeze noemd men *aangebore* ziekten.

Van deeze word de oorzaak, die niet zelden verborgen is in het inwendig maakfel der ingewanden, of in de menging der vogten, veeltyds kort na de geboorte openbaar, gelyk plaats heeft in de ziekten, welk haaren oorsprong afleiden van den zwarten drek, in de slymige aamborstigheid, en geel-zugt (a) der pas geboorene kinderen. Maar het

(a) De meesten leiden de geel-zugt der pas geborene kinderen af van de slym, welke de opening van den gemeenen galvoeder verstopt. Men zie VAETTERLI *de ictero, illo speciátim, quo infantes recens nati laborant.* Götting. 1753. VAN SWIETEN *Comments. in BOERHAAV. Aphor. Tom. 3. pag. 128.* Hieromtrent heeft de beroemde MORGAGNI eene nieuwe bespiegeling voorgesteld in zyn boek *de sedib. & caus. morb. ep. XLVIII. art. 59. seq.* Hy werpt namentlyk de schult op het binden van den navel-streng, en den veranderden omloop van het bloed; meenende, dat door het stilstaan van het bloed in de Navel-ader deszelfs loop door de Lever belet wordt. Van dit gevoelen is ook de vermaarde A. LEVRET, die aanraad, dat men, by het binden van den navel-streng, de navel-ader van haar bloed moet ontlasten, door den streng zagt te drukken, van het lighaam af, na de plaats, daar hy is doorgesneeden; men zie het *journal de medecine* April 1772. pag. 350., en dit had reeds langen tyd voor hem aangeraaden MAURICEAU, die meend, dat de ongemakken, welke in de lever ontstaan, hiervan hunnen oorsprong hebben, *malad. des Femmes. L. 3. f. 30.*

het gebeurt egter meermaalen dat sommige deelen kwaalyk gesteld zyn, of door dat zy anders, als natuurlyk plaats moest hebben, geformeerd zyn; of door dat zy by de geboorte, in het een, of ander, opzigt zyn beledigd.

Derwyl derhalven de ziekten, aan welke de kinderen kort na de geboorte onderworpen zyn, zoo veel in soort verschillen; is het myn voorneemen, om in deeze verhandeling alleen voor te draagen die geenen, van welke door my in de laatste plaats is gewag gemaakt, en tegen welke de Heelkunde hulp aanbied; terwyl ik met stilzwygen voorby gaa, het geen zou kunnen gezegt worden van zeldzaam voorkomende wanstaltigheden, ter geneezing van welke de Heelkunde byna niets vermag, en daar en boven de beroemde HALLER ook zeer veele voorbeelden van dezelve heeft verzameld (a). Die soorten egter, welke veeltyds voorkomen, zullen worden aangeteekend.

c. 30. p. 491. maar, dewyl SYLVIVS heeft aangetoond, dat kinderen somtyds van hunne geboorte af, met de geel-zugt zyn bezogt (*Prax. med. Lib. I. cap. 46. n. II.*), komt het my voor, dat deeze onderstelling, indien zy niet volkomen valsch is, ten minsten niet kan worden toegepast op alle soorten van geel-zugt.

(a) *Lib. de monstris. vid. ejus Opp. minor. anatom. argum. Tom. 3.*

§. I I.

*De swelling van het Hoofd. Het zamen-
gedrukt Hoofd.*

Dewyl by het behandelen van de gebreken der pas geboorene kinderen, welke tot de Heelkunde betrekkelijk zyn, het best gevolgt word die orde, welke ontleend word van de plaats der beledigde deelen, heb ik, met ter zyde stelling van alle andere, deeze uitgekozen, en ik maak een begin met de uitwendige gebreken van het Hoofd, aan welke jonge kinderen onderworpen zyn.

Van deeze gebreken is de eerste soort *zulk een gezwel, dat bestaat de zachte deelen van het hoofd, en de bekleedzelen*, en het welk in de Hoogduitſche taal genoemd word *der Vorkopf*. Dit gezwel word doorgaans aan het voor- of agter-hoofd, zelden in het aangezicht, waargenomen. Het ontſtaat, door dat het bloed, dewyl het hoofd van het kind langen tyd in de opening van het bekken blyft zitten, belet word te rug te keeren door de aderen, als zynde meer uitwendig geplaatſt; en hier uit moet volgen, dat het opgehoopte bloed of word uitgeſtort in het celagtig weefzel, of ten minſten in zulk eene groote quantiteit ſtil ſtaat in de kleinſte vaten, en dezelve zoo ſterk uitzet, dat daardoor ontſtaat een aanmerkelyk gezwel, het welk men dikwils, terwyl het onderſte gedeelte van het hoofd nog in de bovenſte opening van het bekken blyft ſtaan, buiten de deel-deelen zien kan.

II. DEEL.

V

Ik

Ik agt het niet nodig, ter deezer plaatse te verklaaren het nut, dat dit gezwel aanbrengt in het wyder maaken der wegen, en de onderscheide tekenen van het leven van het kind, welke men daaruit kan afleiden.

Dit gezwel is in geen en deele gevaarlyk voor het kind, hoe zeer ook LEVRET dat geen, het welk zich aan het agterhoofd doet zien, doodelyk reekend (a), hebbende hy misfchien hetzelfde verward met het water-hoofd, of eene breuk der hersenen. Ook behoefd men, in gevalle het gezwel niet zeer groot is, niet veele hulp-middelen aan te wenden, dewyl de kneuzingen, van welke dit eene soort is, by kinderen zeer gemakkelyk worden opgelost, ja deeze doorgaans van zelve verdwynt. Maar is de zwellung egter te groot, dan komt men de Natuur te hulp met stoovingen, uit ontbindende, en zegt versterkende, kruiden, in slapen (b), zuuragtigen, wyn gekookt, vervaardigt. Hierby moet men vooral opletten, dat men de stoovingen niet te koud aanlegt, dewyl de tedere lighaamen der kinderen daardoor zeer veel nadeel zouden lyden, en aan groot gevaar worden blood gesteld. In Vrankryk bediend men zich tot dit oogmerk van Rozen-oly met wyn; en eene ontbinding van zee-zout in

(a) *L'art des accouchemens.* §. 1248.

(b) Men doet niet wel, als men geestryken wyn aan de lighaamen der kinderen brengt; ook doet dezelve de verdwyning niet zoo wel volgen, als slappe wyn.

in zuiver water (a), word van laaterē schryvers aangepreezen; in welker plaats men by ons zoude kunnen gebruik maaken van zee- of ammoniak-zout, gesmolten in slappen wyn, of dun bier (b). Somtyds heeft men zich met nut bediend van enkel wond-water, of ook wel zeep onder hetzelfde gemengd; maar ik ben egter van gedagten, dat men niet dan in geringe gezwellen van deezen aart van hetzelfde moet gebruik maaken.

Wanneer het gezwel zeer groot is, of word men, het geen egter zeldzaamer voorvald, gewaar, dat 'er in de daad vaten gebersten zyn, dan moet men door het doen van eene insnyding het uitgestorte bloed eenen uitgang verschaffen.

Het is eene dwaaling van SMELLIE, dat hy deeze foort van gezwellen onder de etter-gezwellen reekent (c); op deeze volgt nooit eene goede ettering (d); maar men heeft rede om te vreezen zulk eene, als dikwils vuile zweeren doet ontstaan, en been-bederf verwekt, en hier van daan is het, dat

(a) *L'eau marinée*. LEVRET op de aangehaalde plaats p. 229. en *journal de medecine* 1772. p. 410.

(b) De beroemde SENNERTUS raad aan in *L. I. Prax. part. I. c. 21*. Rozen-water met het wit van eyeren, en pappen, vervaardigt uit zamentrekkende kruiden en honig; maar doorgaans zyn sloovingen alleen genoeg om de swelling te doen verdwynen.

(c) *Tom. 3. obs. 450*.

(d) Een etter-gezwel, uit zulk eene swelling ontstaan, kan men zien by MAURICEAU *obs. 257*.

dat men, indien het gezwel niet by tyds word geopend, rede heeft, om voor het behoud van het leven van het kind bedugt te zyn, gelyk SMELLIE zelfs verplicht is toe te staan (a).

Maar by het openen van zulk een gezwel moet men vooraf wel verzekert zyn van deszelfs aart, en nauwkeurig letten, dat men niet somtyds in deszelfs plaats een Water-hoofd, of breuk der hersenen, onvoorzigtig kwetze; want daarop zoude de dood volgen: ook vindt men by SMELLIE (b) aangeteekend een voorbeeld van eene doodelyke bloedsstorting, gevolgd op het openen van dusdanig een gezwel.

Wanneer men zulk eene swelling door het gevoel onderzoekt, gebeurt het dikwils, en vooral, wanneer de randen, onder welken vloeibaar bloed verborgen is, door ontsteeking zyn opgezwollen, dat men zoo iets bespeurd, als aanleiding zoude kunnen geeven, om te denken, dat het bekkeneel doorboord was; maar hier over zal in het vervolg, wanneer van de breuk der hersenen zal gehandeld worden, meer worden gezegt.

Het aangezicht van een kind heeft dikwils, in gevalle het in de geboorte voorkomt, eene pairsche kleur; ja LEVRET heeft gezien, dat kinderen uit deezzen hoofde Mooren geleden te zyn (c). Wanneer dit plaats heeft, moet men het aangezicht met lyn-

(a) Op de aangehaalde plaats pag. 451.

(b) Op de aangehaalde plaats pag. 452.

(c) *Journal de Medecine* op de aangehaalde plaats.

lynwaat, gedoopt in een afkookfel van zamentrekende kruiden in slappen wyn, zoo bedekken, dat niets, dan de mond en neus, bloot word gelaa-
ten.

Dewyl de oog-leden slapper zyn, dan andere deelen, gebeurt het ook meer-maalen, dat het bloed in dezelve stil staat, en hieruit zegt STORCH (a), dat fomtyds etter-gezwellen zyn ontstaan.

De werktuigen, welke men in de Vroedkunde gewoon is te gebruiken, gelyk by voorbeeld de Hef-boom van ROONHUYZEN, en de Tang, zyn fomtyds oorzaak, dat zich een weinig bloed onder de huid uitsort, en blauwe vlakken verwekt; maar dit ongemak word op de beschreven wyze met gemak geneezen; en het gebruik van deeze werktuigen is, wanneer eene kundige hand zich van dezelve bediend, geenzins gevaarlyk, dewyl de beenderen van een nog niet gebooren kind gemakelyk kunnen worden zamengedrukt, en medegeeven. Maar indien egter het zy door het gebruik van werktuigen, het zy door drukking in eene moeiljelyke verlosfing, iets van dien aart mogt gebeuren, gaat hier zelden gevaar mede gepaard, dewyl deeze indrukking binnen korten tyd door de natuur zelve word hersteld. My is ten minften maar bekend een geval, my door eenen vriend verhaald, in het welk aan het opperhoofds-been door dusdanig eene drukking, ontstaan door de plaatfing van het

(a) STORCH *Kinder-krankheiten*. Tom. I. p. 134.

het kind, te lang blyvende in de opening van het bekken, een etter-gezwel is geformeerd, uit het welk, na dat het door een Heelmeeſter was geopend, een ſtukje van een been, door bederf doorknaagt, te vooreſchyn wierd gebragt.

Het is eene bekende zaak, dat in alle verlosſingen het bekkeneel zoo word zamengedrukt, dat het de gedaante van eenen kegel krygt, en dat hierdoor de verlosſing ook veel ligter word volbragt. Maar dit heeft egter nog meer plaats in eene moeiljelyke verlosſing, en geeft aan het hoofd eene groote wanſtaltigheid (a), hoewel het hoofd egter doorgaans zyne natuurlyke gedaante van zelfs wederkrygt, dog dit geſchied niet, gelyk LEVRET meend (b), door de drukking van de lugt, welke het hoofd omringd, maar door de veerkragt, welke de deelen van een levend kind bezitten, en door het vermogen van de ſlag-aderen der hersenen, en van het harde hersen-vlieſ, dewyl door derzelver klopping de zamengedrukte deelen weder worden nitgezet; en hier door word aan het hoofd weder gegeven zulk eene gedaante, als met de natuur overeenkomt (c).

Kinderen, met dit ongemak bezogt, geraaken dikwils

(a) Dit noemen de Vroedmeesters in Duitsland *ein verschobener kopf*.

(b) *L'art des accouchemens* p. 228.

(c) Daar zyn egter voorbeelden van zulk eene wanſtaltigheid, welke geduurende het geheele leven by gebleeven is.

dikwils door de drukking der hersenen aan het braaken, en hierdoor kunnen zich de beenderen te ligter uitzetten, dewyl het bloed dan met grooter drift naar het hoofd gedreeven word.

Men gaat deeze wanstaltigheid te keer, door eene zachte drukking met de handen, of door middel van het verband, 't welk het driehoekige hoofd-dekzel (*coup-rechef*) genoemd word; maar men moet eene te sterke sluiting van het verband, of eene al te groote drukking, op alle wyze vermyden. Hierin dwaalen doorgaans de Vroedvrouwen, welke, terwyl zy het hoofd de behoorlyke gedaante poogen weder te geeven, door het onegaal drukken van het bekkeneel, de kinderen stuipen doen krygen, of eene andere ziekte doen ontstaan (a).

De beroemde ALLEN (b), maakt uit de lyften der gestorvenen te *Londen* gewag van een zonderling ongemak der kinderen, het welk de Engelsche *head-moult-schot* noemen, en hem zeer gevaarlyk voorkomt, dewyl zy door stuipen ellendig worden uit het leven gerukt, indien aan het hoofd niet ras weder

(a) P. ÆGINETA zegt, dat 'er een water-hoofd ontstaat, wanneer onkundige Vroedvrouwen het hoofd na de geboorte zamendrukken. *l. 6. c. 3.*

(b) *Synops. medic. univers.* Men zie de byvoegzels by de *Amsterd.* uitgaaf van 1730. p. 138. In de Fransche vertaaling van het werkje van COOKE over de ziekten der kinderen word deeze ziekte pag. 72. genoemd *crane debordant*.

weder zyne natuurlyke gedaante word bezorgt (a). Maar egter ontstaan de stuipen by kinderen kort na de geboorte niet zeer dikwils, door dat het hoofd is zamengedrukt by de verlossing, ook zyn zy voor hun niet zeer gevaarlyk; my is ten minsten verhaald van zeer geloofwaardige mannen, die zeer bedreven waren in de Vroedkunde, dat 'er van drie honderd kinderen, door moeiljke verlossingen, welke zy hadden bygewoond, ter waereld gekomen, nauwelyks een door stuipen, wegens zamendrukking van het hoofd ontstaan, was gestorven. Eene drukking van een kinds-hoofd, al is zy sterk, doet ook niet altyd stuipen ontstaan; want het gebeurd byna nooit, dat die, welke door middel van den Tang worden verloft, uit deezen hoofde door stuipen worden aangetaft. Weshalven het zoude kunnen zyn, dat zoodanige kinderen door andere oorzaken, of, het geen wel waarschyneelyk is, door de verkeerde behandeling der Vroedvrouwen, zyn omgekomen; het welk men des te eer stellen kan, dewyl men aan de Londensche lysten, die worden vervaardigt uit de berigten der oude

(a) SMELLIE zegt *vol. 3. p. 469.*, dat hy kinderen, door deeze ziekte aangetaft, nadat 'er reeds stuipen waren ontstaan, in het leven heeft behouden door het doen van eene aderiaating, en het aanleggen van een spaansche vlieg-pleister in den nek; maar hy is egter van gevoelen, dat het nog beter is, deeze toevallen voor te komen door een weinig bloed uit den doorgesneden navel-streng te laten weglopen.

de vrouwen , welke de lyders hebben opgepast , niet zoo veel geloof kan slaan , als doorgaans geschied.

Dikwils word in eene natuurlyke verlossing , de neus toegedrukt , maar zoo , dat egter de beenderen van den neus doorgaans ongeschonden blyven , uit hoofde dat de neus van zulke jonge kinderen byna plat is , en voor het grootste gedeelte uit kraakbeen bestaat . In zulk een geval moet men de stoovingen naerftig gebruiken .

Door de onkundigheid , en ongeschiktheid in het keeren , word somtyds een ander , en zwaarer , ongemak verwekt , namentlyk de ontwrigting van de onder-kaak , of de van elkander wyking der knokkels-wyze uitsteekfels , welke LEVRET meend , dat ook plaats kan hebben , wanneer het aangezigt voorkomt (a) . In dit geval moet men , nadat de deelen weder op haare plaats gebragt zyn , zich zonder uitstel van stoovingen bedienen , dewyl de toestand van deeze kinderen zeer ellendig is , omdat hun het zuigen word belet , en een pas geboren kind ook niet bevyligt is voor het doodelyk ongemak , dat eene krampagtige sluiting van de onderste kaak (b) genoemd word .

Het is niet nodig , dat ik hier nog meer gebreken , aan de hoofden der kinderen waargenomen , en tot de Heelkunde betrekkelyk , optelle , dewyl
kun-

(a) *Journal de medecine* op de aangehaalde plaats .
p. 223.

(b) STORCH op de aangehaalde plaats . p. 122.

kundige vroedmeesters tegenwoordig niet, dan door-
gaans met alle omzigtigheid, gebruik maaken van
snydende werktuigen, en dan nog niet, dan nadat
het kind gestorven is. Maar toen door een on-
voegzaam gebruik der haaken de nog levende kin-
deren zwaar gekweld wierden, zag men ook meer
kinderen met gebreken aan hunne hoofden, welke
de hulp eenes Heelmeesters vorderden, het levens-
ligt aanfchouwen.

§. III.

Opene Naaden. Het water-hoofd. Eene breuk der Hersenen.

Die ongemakken, van welke ik tot hier toe heb
gewag gemaakt, ontstonden door eene belediging,
by de geboorte toegebracht; maar daar doen zich
nog op andere, en zwaarer, gebreken, welke hun-
nen oorsprong afleiden van het maakfel zelfs van
het kind.

Indien wy immers agtgeeven op het geheele za-
menstel van het hoofd, dan worden wy gewaar,
dat de naaden van het bekkeneel by pas geboore
kinderen niet zelden van elkander afgeweeken wor-
den aangetroffen (a), en dit ongemak, het welk
in

(a) Hoofden, welke geene naaden hebben, zyn
wel oorzaak, dat de geboorte moeiljelyk is, dewyl die
hulp, welke de beweeglykheid der beenderen van het
hoofd verschaft, ontbreekt, maar na de verlossing heb-
ben zy geene hulp nodig.

in de Londensche sterflysten den naam draagt van *horse-schor-head*, zegt ALLEN (a) altyd doodelyk te zyn. Maar ik meen, dat dit onstaat; of omdat deeze kinderen te vroeg ter waereld komen, het welk men kan besluiten uit de kleinheid van het hoofd; of omdat zy een water-hoofd hebben, in welk geval het hoofd al te groot is; weshalven ten duidelyksten hieruit blykt, dat deeze alle niet zoo zeer, dewyl de naaden van elkander zyn verwyderd, als wel uit hoofde der oorzaak, welke dit ongemak deed ontstaan, of omdat zy niet na behooren zyn gevoed geworden, gevaar loopen hun leven te verliezen. Het zelfde heeft plaats, wanneer de opening der Fontanel al te groot is.

De beroemde ALLEN verhaald, dat de Engelsche vrouwen de hoofden der kinderen, met dit ongemak bezogt, zoo dra zy gebooren zyn, waschen met wyn-geest, of *rum*, waarby sommige voegen het wit van eijeren, of palm-oly. Dog hoe zeer men het gebruik van slappe geestryke middelen, wanneer zy door het byvoegen van veel water verdunt zyn, zoude kunnen toestaan, komt het ons egter twyfelagtig voor, of zy wel veel zullen uirigten, dewyl het de natuur zelve is, welke het grootste vermogen bezit, om zulke openingen te sluiten. Maar des niettegenstaande is het egter nuttig, dat men de pogingen der natuur door middel van eene zachte drukking te hulp komt, en dit kan met

(a) Op de aangehaalde plaats. COOKE noemt dit op de hier boven genoemde plaats *Crane ouvert*.

met weinig moeite geschieden, als men slegts, wanneer de naaden te wyd open zyn, het kind een nauwer mutsje op het hoofd zet; terwyl men de Fontanel, wanneer die meer, dan behoord, open is, het best beschermt tegen alle uitwendige drukking, door op dezelve een compres te leggen.

Dit alles heeft voor het grootste gedeelte plaats by kinderen, die te vroeg, of door een miskraam, ter waereld komen, als welker hoofden niet zeer groot zyn; maar, wanneer men dit gewaar word aan pas geboore, en voldrage, kinderen, dan kan men met het grootste regt zeggen, dat zy een waterhoofd hebben.

Dit ongemak word verdeeld in in- en uitwendig; en by het inwendig waterhoofd vind men het water of in de holligheden der hersenen, of tusschen het harde hersen-vlies, en de zelfstandigheid der hersenen zelve.

Wanneer van den beginne der zwangerheid af een inwendig waterhoofd reeds tegenwoordig is, vind men de hersenen geweekt, of zeer sterk zamengedrukt, zoo dat deeze kinderen, als ware het, maar een half hoofd hebben, en byna nooit langer, dan agttien, of vier en twintig, uren in het leven blyven (a). Maar in zulk een waterhoofd, het welk in de laatste maanden der zwangerheid ontstaat, zyn de naaden wyd van een, en het hoofd is grooter, en doorschynend (b).

Het

(a) DELEURYE *maladies des enfans*. p. 200.

(b) De Heer HEBENSTREIT heeft in *diff. de Capiti-
toni-*

Het is buiten het vermogen der Heelkunde, om een inwendig water-hoofd te geneezen; ook verhaast de insnyding, welke sommigen in de tweede soort van het zelve aanraaden, den dood, die ontstaat, of door dat de vogten te schielyk worden ontlast, en de vaten uit dien hoofde zamenvallen, of door dat het vuur zich openbaard, en de hersenen door het bykomen der lugt bederven. Het water word ook geheel vrugteloos ontlast, in gevalle de hersenen reeds te veel geweekt zyn. En hier van daan is het, dat zulke kinderen slegts gedurende eenen korten tyd in het leven kunnen worden gehouden door middel van zeer sterke afgang verwekkende middelen, 'en zulke, die uit zee-ajuin zyn zamengefeld, gepaard met de verdwyning bezorgende oplegzels, zoo als ook door een uitdruyend verband, hoedanig dat geen is, het welk de muts van HIPPOCRATES (LA CAPELINE) genoemd word. Men vergelyke hier mede, om van andere schryvers niet te spreken, alleen BOERHAAVE in zyne 1247 *Aphorismus*, en GEHLER in zyne *Disfertatio de partu difficili ex Hydropse fetus*. p. 28.

Het uitwendig water-hoofd is met minder gevaar verzeld, en men leerd het kennen door eene zagte zwelling, welke voor den vinger wykt.

Men

tonibus laborioso partu nascentibus. Lips. 1743. fig. 1 en 2. afgebeeld water-hoofden, welker naaden van elkander waren afgeweeken. Deeze bekkeneelen worden nu bewaard in de verzameling van zieke beenderen van wylen den beroemden LUDWIG.

Men gaat het zelve te keer, door 'er op te leggen zakjes, gevuld met drooge, de verdwyning te weeg brengende, kruiden, en fomtyds door veele en kleine infnydingen in de bekleedfelen te maaken (a), terwyl men ondertusfchen niet verzuimt gebruik te maaken van buikzuiverende, en zagte water afvoerende middelen.

Maar even gelyk by een inwendig water-hoofd de naaden der beenderen van elkander wyken, zoo vind men is een ander ongemak de beenderen zelve doorboord, en dit noemd men *Eene breuk der hersfenen*; welke is een gezwel op het hoofd, waarin verborgen is een gedeelte der hersfenen, te gelyk met het harde hersfen-vlies gedrongen door eene opening in het een of ander been van het bekeneel; en dus verschilt het van eene uitzakking der hersfenen, welke volgt op eene wond van de hersfenpan, hierin, dat dan een gedeelte der hersfenen door het kwetzen van het harde hersfen-vlies zich bloed aan het oog vertoond.

Het zy my geoorloofd, een weinig breeder uit te weiden over deeze breuk der hersfenen, dewyl ik heb gezien, dat een zeer voortreffelyk fchryver (c) nog niet lang geleden twyffelde aan dit ongemak, en het zelve niet nauwkeurig onderscheidde van eene uitzakking der hersfenen. Ik

(a) De spaansche vlieg-pleisters, door eenigen aangeraden, zouden misfchien het vuur kunnen doen ontftaan.

(b) De beroemde SWAGERMAN over het Water-hoofd. *Amft.* 1767. p. 219. en vervolgens.

Ik ga met opzot voorby zulke waarneemingen, welke oud en wat onzeeker zyn, maar egter lust het my gewag te maaken van REISELIUS (a), die het eerst beschreven heeft een gezwel aan het agterhoofd, uit het welk, na dat het geopend was, eene zeer heldere wey vloeide, en waarin, by het ontleden van het kind, gevonden wierden de kleine hersenen, die door eene, aan hun byzonder eigene, opening, welke vereenigt was met het groote gat van het agterhoofds-been, met de andere hersenen gemeenschap hadden. LE DRAN heeft nogthans dit ongemak omstandiger, en nauwkeuriger, onderzocht, en ook eene beschryving van het zelve gegeven (b), het noemende met den naam van *Breuk der hersenen*, het welk anderen door den Griekschcn naam van *Encephalocèle* hebben nitgedrukt.

Om van andere waarneemingen geen gewag te maaken, teeken ik alleen aan, dat boven genoemde LE DRAN zulk een gezwel aan een opperhoofds-been (c); TREW een soortgelyk aan elk der twee opperhoofds-beenderen (d); en CORVINUS (e) aan het agterhoofds-been, heeft waargenomen. REISELI-

(a) *Ephem. N. C. Dec. 2. ann. 2. obs. 115*
pag. 272.

(b) *Observ. I.*

(c) Op de aangehaalde plaats.

(d) *Commerc. litt. 1738. hebđ. 52. p. 412.*

(e) CORVINUS *diff. de hernia Cerebri. Argent. 1729.*

SELIUS (a), CORVINUS (b), en SANTORINUS, door MORGAGNI (c) aangehaald, hebben aange- teekend gevallen, in welke by de hersenen ook water in het gezwel wierd gevonden, en dit za- mengefteld ongemak noemen zy *hydro-encephalocèle*. DESLANDES (d) nam in zulk een gezwel alleen waar water, het welk te voorschyn kwam uit een gat in het agterhoofds-been.

In alle breuken der hersenen is het gezwel, naar mate van den aart van het ongemak, op on- derscheide wyzen gespannen; maar egter word men in het zelve altyd gewaar eene schommeling, zon- der pyn, of verandering der kleur van het vel: ten zy het door het vuur schynt aangetast te zullen worden.

Zulke breuken zyn of aangeboren, gelyk CORVI- NUS aantekend (e), of zy ontstaan door het schreu- wen der kinderen, indien 'er in het been reeds bo- ven

(a) Meer andere voorbeelden kan men vinden by HALLER *de monstros. in opp. min. anat. tom. 3. p. 11.* en by den geleerden GEHLER in de aangehaalde *diff.* Het is nog niet langen tyd geleden, dat de beroemde BOSE en GEHLER, benevens den zeer kundigen *Leipziger* Heelmeester HEBENSTREIT, zulke gezwollen ter plaatse van het opperhoofds-been hebben waargenomen.

(b) Op aangehaalde plaats.

(c) *De Sedib. & causf. morb. per anatom. indag. Ep. XII. art. 6.*

(d) *Journal de medecine* 1767. p. 74.

(e) Ter aangehaalde plaats.

ven genoemd gebrek plaats heeft, en dit gebeurt het meest. In zulk een been vind men by breuken der hersenen als ware het eene opene plaats; welke egter is gevuld met een zagt kraak-been, voorzien van een dubbeld been-vlies, (a), zoo dat men, in den omtrek van het gezwel, door middel van het gevoel duidelyk een' ronden beenagtigen rand kan ontdekken.

FERRAND (b) en LEVRET (c), twee zeer ervaren mannen, waarschuwen een ieder, dat men letten moet, van geene breuken der hersenen te verwarren met etter-gezwellen, of met buiten gevat bloed in de zagte deelen (§. 2); hoewel het my egter toefchynt, dat het niet zoo moeijelyk is, eene breuk der hersenen te onderkennen, als FERRAND voorgeeft, want eene breuk der hersenen behoort tot die gezwellen, welke langzaam, en zonder ontfteeking, voortkomen niet alleen, maar ook grooter worden door het schreuwen der kinderen, welke teekenen men niet verneemt by een etter-gezwel, het welk de opperhuid ook buiten dat van kleur veranderd; maar daaren boven, hoe zeer ik de opening in het bekkeneel niet telle onder die teekenen, welke ik reeken, dat niet kunnen bedriegen, dewyl by een been-bederf zulks ook word

waar-

(a) CAMPER in de verband. van de Holl. maatsch. te Haarlem. 7. Deel. p. 366.

(b) Thes. de Encephalocèle sub præf. SABATIER defensa. Paris. 1763.

(c) Journal de medecine 1772. p. 411.

II. DEEL.

X

waargenomen, zal men egter niet zien, dat in het laatst genoemde ongemak de opening of zoo rond is, of ook zonder pyn is ontstaan, terwyl men in tegendeel geene pyn bespeurd in het been, en het zelve eene ronde opening heeft in eene breuk der hersenen. Het teeken, dat FERRAND opgeeft, en bestaat daarin, dat alle werkingen, welke tot het leven behooren, wanneer de breuk der hersenen gedrukt word, worden beledigt, is geheel onnut, dewyl 'er nauwlyks een voorzigtig Geneesheer zal te vinden zyn, die dit zoude willen beproeven.

Dit ongemak word gemakkelyk onderscheiden van een gezwel; door buiten de vaten uitgestort bloed ontstaan, dewyl men, zich te binnen brengende, het geen vooraf gegaan is, ras kan ontdekken, of 'er heeft plaats gehad eene kneuzing, door welke zulks zoude moeten voortgekomen zyn; want, gesteld zynde, (het geen ook LEVRET op de aangehaalde plaats zeer wel aantekend, en ik hier boven ook reeds heb doen opmerken) dat een stilstaand vogt, zich tussehen de randen van het gezwel verbergende, deed vermoeden, dat 'er eene opening in het been was, zoude men egter zonder twyffel door het gevoel gemakkelyk kunnen ontdekken, dat het gezwel, als zynde bevat binnen zachte deelen, zich boven het been verheft, dewyl het niet anders kan zyn, of daar moet tussehen de randen van het gezwel en het been overblyven eene holligheid, binnen welke het vogt bewogen word.

Nu meen ik, dat ik nog met weinige woorden
mel-

melding maaken moet van de wyze, op welke eene breuk der hersenen word voortgebracht.

Het is eene beweeze zaak, dat de platte beenderen van het bekkeneel geformeerd worden door been-veezelen, welke zich van het middenpunt, tot den omtrek uitstrekken; wanneer het nu gebeurt, dat door de eene of andere oorzaak, welke men niet wel kan bepaalen, de beenwording belet word, dan blyft 'er in het been over eene opening, door welke het harde hersen-vlies, en de hersenen, die onder het zelve gelegen zyn, dikwils aanstonds na de geboorte van het kind door het sterk schreuwen te voorschyn komen; zelfs komt het my niet onwaarschynelyk voor, dat een kind door de drukking der baarmoeder by de verlossing eene geschiktheid tot dit ongemak zoude kunnen krygen.

Het gebeurt dikwils, dat het been by de randen van de opening dikker is, gelyk men dit waarnam aan dat been, het welk CORVINUS heeft beschreven, en het welk thans bewaard word, en van my gezien is, in de verzameling van wylen den beroemden LUDWIG, wiens verlies ik, en alle deugzaame menschen, van harte betreuren.

FERRAND, die een uittrekzel van de verhandeling van CORVINUS heeft bekend gemaakt, is van meening, dat 'er in zulk een geval een onvolkomen water-hoofd plaats had, zoo dat namentlyk het harde hersenvlies dan allengskens door de kragt van het water naar buiten wierd gedrukt. Dog dit heeft niet altoos plaats, maar alleen in dat geval, als 'er

by eene breuk der hersenen zich ook water bevindt, want in veele gevallen verneemt men in het geheel geen water, ook zoude de geneezing, in gevalle dit plaats had, niet zoo wel volgen.

Dewyl de hersenen door eene kleine opening dringen, zoude het vreemd kunnen schynen, dat zy zich ook niet door naaden, die te wyd van elkan- der zyn, eenen weg baanen; maar hier van is gemaklyk rede te geeven; want de hersenen schynen immers door het zysen-wyze tusfchen-scheid- zel (*falx*), en door het uitpanfel boven de kleine hersenen, welke vliezen vry sterk zyn, en door eene verdubbeling van het harde hersenvlies wor- den geformeerd, belet te worden, om verder door te dringen.

Eene breuk der hersenen is, indien zy niet bui- ten gemeen groot, en door veel water uitgezet is, niet zeer gevaarlyk (*a*), indien men zich maar wagt, om ze te openen, maar dezelve in tegendeel door middel van eene zachte drukking zoo in bedwang houd, dat de natuur de opening in het been eerst door middel van kraak-been, en daarna door been zelfs, sluiten kan. Dus leeft men by LE DRAN op de aangehaalde plaats, dat zulk een gezwel, het welk geenzins van de kleinste was, binnen eene maand, en

(*a*) Het verdiend egter opmerking, dat de meeste van die kinderen, welke zulk eene breuk hadden, maar geneezen zyn, dit ongemak hadden aan een opper- hoofds-been, daar die geene, die het aan het agterhoofd hadden, zyn gestorven.

en de opening in het been binnen den tyd van tien maanden , geneezen zyn. Maar , verzuimd men eene breuk der hersenen , dan komt het vuur ligt in dezelve. Sommige hebben eene insnyding in zulk een gezwel gemaakt (*a*), maar daar op is altyd een kwaade uitslag gevolgd , dewyl in dit geval het zelfde , dat wy van het openen van een waterhoofd gezegt hebben , plaats heeft ; daar integendeel die geen en , die het ongemak door eene zachte drukking hebben getragt te geneezen , gelyk **LE DRAN**, **TREW**, en **CAMPER** (*b*) hunne poging met eenen gelukkigen uitslag bekroond zagen ; het welk ook eenige maalen ondervonden de hier boven aangehaalde zeer geleerde mannen **BOSE**, **GEHLER**, en de Heelmeeſter **HEBENSTREIT**.

Tot deeze drukking bediend zich **LE DRAN** van linne compresſen , in brandewyn nat gemaakt ; en deeze laat hy vier en twintig uren lang leggen , ten einde zy , door het droogen harder geworden zynde , meer tegenſtand aan het gezwel zouden bieden , en dus , na zyne gedagten , de zamen-groeiing van het been bevorderen. Andere raaden aan een dunne ſpeelkaart , of een dun plaatje van lood ; maar het komt my voor , dat een zagt compres , nat gemaakt , indien men wil , in wond-water , aan dit oogmerk kan voldoen.

§. 4.

(*a*) **REISELIUS** op de aangeh. plaats , en de oude **FRIED** by **CORVINUS** als boven.

(*b*) Op de aangehaalde plaatſen.

X ;

§. I V.

De gesplete Rugge-graat.

Het komt my voor niet onvoegzaam te zyn, om op de ongemakken, zoo even beschreven, te laten volgen een ander gebrek, het welk wel verschild in plaats, maar, voor zoo verre deszelfs oorsprong betreft, met dezelve eene nauwe gemeenschap heeft, zynde de oorzaak daarvan doorgaans te zoeken in eene kwaade gesteldheid van het hoofd. Dit ongemak, het welk ik nu wat nauwkeuriger zal gaan beschouwen, word doorgaans genoemd *een gesplete Rugge-graat*, en is door SAUVAGES (a), met den naam van *Hydrorhachitis*, door LINNÆUS (b) met dien van *Spinola*, beschreeven.

Dit gezwel is altyd aangeboren, hoewel 'er egter sommige zyn, die meenen, dat het by de verlossing kan ontstaan, wanneer het hoofd, indien de holligheden der hersenen met water vervuld zyn, onder de verlossing sterk word zamengedrukt; maar dit is eene zaak, van welke ik my niet kan overtuigen, dewyl by eene gesplete Rugge-graat zulk een groot gedeelte der beenderen ontbreekt, en men somtyds in miskramen kinderen met dit ongemak ziet ter waereld komen.

Dit gezwel, het welk somtyds doorschynend is, is doorgaans geplaatst op de laatste lenden-wervelen,

(a) *Noslog. Tom. 2. p. 497. edit. in quarta.*

(b) *Genera morborum.*

len, en het bovenste gedeelte van het hylig been: in hetzelfde kan men door middel van het gevoel ontdekken, dat de doornagtige uitsteekzels, als ware het, gespleten zyn, en hier van daan is aan hetzelfde niet zonder rede den naam van gesplete 'ruggegraat' gegeven, hoewel men egter voorbeelden van eene hooger waargenome plaatting van dit gewzel vind aangeteekent (a).

In het jaar 1732. en 1733. was 'er geene geringe twist, over den oorsprong van dit ongemak, tusschen TITSING en ULHOORN, beide Heelmeesters in *Amsterdam*. ULHOORN gaf de schuld aan de legging van het kind, en aan eene zeer sterke buiging van de rugge-graat, ingevalle het hoofd van het kind belet wierd, zich na beneden te keeren; maar TITSING antwoorde hem scherp, en leide dit ongemak af, of van de inbeelding der moeder, of van een water-hoofd, of van uitwendig geweld (b). RUYSCH is onder hen, die in onzen tyd dit ongemak

(a) RUYSCH *observ.* 34. nam dit waar aan de laatste wervel van den hals. Men zie ook het aangehaalde werk van SWAGERMAN in de blad-wyzer op het woord *water-gezwel der rugge-graat*; vergelyk HALLER *op. min.* Tom. 3. p. 13. not. a. J. Z. PLATNER in *Protus. de anat. subtil. ad usum Chirurgicum non negligenda*, en GEHLER *diff. de partu difficili ex hydropse fœtus*.

(b) Vergelyk PLATNER *inst. Chirurg. rat.* §. 747. als mede HALLER op de aangehaalde plaats p. 136. en in de aantekeningen op de *Method. stud. med.* van BOERHAAVE p. 785.

mak beschreeven hebben, de voornaamste, en die heeft ten klaarsten getoond, dat het water, in het hoofd, of de rugge-graat, vergaaderd, alleen de oorzaak van hetzelfde is.

Het is eene bekende zaak, dat het rugge-merg bekleed word met eene verlenging van het harde hersen-vlies, maar egter zoo, dat zy het zelve los omvat, en tuschen dit merg en het bekleedfel, van het harde hersen-vlies ontstaan, eenige ruimte oververlaat. Wanneer zich derhalven in de holligheid van het bekkeneel dat vogt, het welk aldaar in den gezonden staat, even als in alle holligheden des lichaams, uitwaasfemd, tegennatuurlyk ophoopt, en de beenderen van het hoofd, of in 't geheel niet, of niet genoeg, worden uitgezet (a), loopt het na het kanaal, dat in de rugge-graat gevonden word, en stilstaande aan het gesloten einde van de verlenging van het harde hersen-vlies, welke niet volkomen tot aan het einde van het hylig been reikt, zet het dezelve uit; waar van daan het komt, dat de doornagtige uitsteekzels, welke uit twee deelen zyn zamengefeld; maar niet, gelyk de oude meenden, de geheele rugge-graat, en de wervelen zelve, van elkander wyken.

Mogelyk komt het sommigen vreemd voor, dat deeze uitzetting meer na agteren, dan na vooren geschied;

(a) Somtyds is namentlyk dit ongemak met een water-hoofd gepaard; somtyds neemt men het waar zonder hetzelfde. Vergelyk GEHLER op de aangehaalde plaats in *not. 1.*

geschied ; maar men kan met gemak begrypen , dat 'er van agteren , of ter plaatse , daar dit ongemak doorgaans word waargenomen , minder tegenstand geboden word , als ter plaatse van de lighaamen der wervelen , dat is van vooren : men behoeft hier ook niet veel te letten op de kragt der spieren , dewyl men zich bezwaarlyk kan voorstellen , hoe zulk eene geweldige uitzetting door tedere spieren zoude kunnen worden te weeg gebragt ; maar , wanneer men eene gesplete rugge-graat waarneemt , dan is 'er altoos een gebrek in de beenwording vooraf gegaan.

Dit verheven gezwel bestaat derhalven , buiten de gemeene bekleedselen , door welke het word omvat , uit eenen zak , geformeerd door het harde hersen-vlies , in welken zich water heeft verzameld ; maar het is niet , gelyk sommige willen , eene breuk van het rugge-merg , dewyl hetzelve in tegendeel altyd meer naar vooren toe gelegen is.

By de oude Geneesheeren vind men niet , dan duistere , sporen van deeze ziekte ; maar TULP is de eerste geweest , die eene duidelyke beschryving , en afteekening , van dit ongemak heeft verschaft (a) , geevende hy teffens aan hetzelve den naam van *gesplete Rugge-graat*. Na heeft hem SCHENCK (b) , maar vooral RUYSCH (c) , hetzelve het best beschreven ; ook heeft SWAGERMAN (d) eene vry
nauw-

(a) *Lib. 3. obs. 29. 30.*

(b) *Obs. L. 5. 48. 57.*

(c) *Obs. 34—36.*

(d) In het aangehaalde werk pag. 78. en vervolg.

nauwkeurige afbeelding van deszelfs inwendige gedaante, na TULP, aan de geleerde waereld medegedeeld.

Het gebeurd dikwils, dat zoodanige kinderen door de drukking van het rugge-merg, en der zenuwen, welke uit deszelfs onderfte gedeelte te voorschyn komen, met eene verlamming van het halve lighaam, of der onderfte leden, worden bezogt; maar fomtyds gebeurt het egter, dat de bovenfte zoo wel, als de onderfte, leden byna geheel worden beroofd van gevoel, en beweeging (a). Zy sterven byna alle door dat het gezwel met het vuur word aangedaan; maar sommige zyn egter twee, drie, ja zelfs veertien, of twintig, jaaren oud geworden (b).

De geneezing kan men nog door inwendige, nog door uitwendige, middelen te weeg brengen. FORESTUS (c), en HEISTER (d), hebben dit gezwel door

Het is te verwonderen, dat de zeer kundige ontleder MORGAGNI dit ongemak maar een maal gezien heeft *de sed. & caus. morb. Ep. XII. art. 10.* zoude het in *Italien* ook wel zeldzamer voorkomen?

(a) SAUVAGES *nosol. Tom. I. p. 763. 798.*

(b) RUYSCH meend *obs. 35.* dat zulke kinderen slechts één jaar lang in het leven zouden kunnen blyven; maar TREW verhaald in *Nov. act. A. N. C. obs. 100. p. 398.*, dat een meisje, met zulk een ongemak bezogt, veertien jaaren lang geleefd had; meer andere voorbeelden vind men by SWAGERMAN §. 121. en vervolg. §. 146. en in de blad-wyzer van het aangehaalde werk.

(c) *Obs. Chir. 3. 7.*

(d) Volgens SWAGERMAN p. 137. In dit geval wiesd

door het af te binden trachten weg te neemen, dog met eenen ongelukkigen uitflag; ook hebben veele het zelve door insnyding geopend, deeze manier verdedigd, ja zelfs aangeraaden (*a*); maar dit is, uit hoofde van de nabyheid van het rugge-merg, altyd doodelyk; niet, gelyk TULP (*b*) wil, om dat de zenuwen gekwetst worden, want deezen leggen aan den voorkant; maar om dat de lugt, by de bovengenoemde zenuwen, en het rugge-merg, komende, ja zelfs tot aan het hoofd opklimmende, alles be-derft, en den dood verhaaft.

By kinderen, welke sommige zeggen, dat, na het openen van het gezwel, en het ontlasten van het water, geneezen zyn, heeft de zwelling of maar alleen in de bekleedselen haaren zetel gehad, of, zonder dat het harde hersfen-vlies beledigt was, op hetzelfde alleen maar gelegen, en behoorde dus meer tot de rok-gezwellen, dan tot de foorten van de gesplete rugge-graat. Het eenige, dat men in het, van ons beschreven, ongemak zonder gevaar zoude kunnen beproeven, is dit, dat men hetzelfde door middel van zachte compressen tegen alle uitwendig geweld beschermd, en, ingevalle het van zelfs opengaat, de al te schielijke ontlasting van het

wierd het kind, zoo dra de draad het gezwel doorfneed, zwak, en stierf den volgenden dag.

(*a*) Voorbeelden hier toe betrekkelyk vind men by SWAGERMAN §. 147. 151. 153.—155. 157. 165. 168.

(*b*) Op de aangehaalde plaats.

het water, welke voor de ondergelege deelen zeer naadeelig is, zoo veel mogelyk belet (a).

§. V.

*Ongemakken der uitwendige zintuigen.
Zamenegroeide Lippen.*

Behalven de ongemakken, tot hier toe opgenoemd, welke of in het hoofd hunnen zetel hebben, of ontstaan, door dat het hoofd niet wel gemaakt is, moet ik thans beschouwen zulke, welke de natuurlyke openingen van het hoofd betreffen.

Deeze openingen zyn, of toegegroeid, en gesloten, of zy hebben eene tegennatuurlyke gedaante.

Tot de ongemakken van de eerste soort, breng ik de aangeboore toegroeijing der oog-leden, of het aangebooren *αγχυλοβλήφαρον*. In dit ongemak vind men de oog-leden of zamenegroeid door middel van een vlies, het welk somtyds met openingen doorboord is; of de boogs-wyze kraak-beenderen der oog-leden zyn met elkander vereenigt; of eindelyk de oog-leden aan het hoorn-vlies vastgegroeid.

In het eerste geval is het ongemak juist niet moeijelyk te helpen; ja men kan door eene Heelkundige bewerking, zoo dra na de geboorte de
zwelliing

(a) ULHOORN raad in zynen brief aan TITSING over de gesplete rugge-graat, *Amst.* 1732., een lood hoedje daarop te zetten; maar ik vrees, dat daardoor somtyds eene nadeelige vryving zoude kunnen ontstaan.

zwellling der oog-leden , welke byna altoos aan pas geboore kinderen word waargenomen , verdweenen is , hetzelve wegneemen. Maar in het tweede geval moet men de operatie , welke moeilijker is , tot de vyfde , of zesde , maand uitstellen , dewyl men het oog dan sterker vind. Zeer dikwils blyven , indien de genoemde kraak-beenderen waarlyk zamengegroeid zyn geweest , de oog-leden na binnen gekeerd. In het derde geval kan men byna in het geheel niets door eene operatie verbeteren , veel min het ongemak door dezelve wegneemen.

Wanneer men , ingevalle de oog-leden door middel van een vlies vereenigd zyn , eene operatie wil onderneemen , moet men het kind door zwagtels zeer wel bezorgen , ten einde het door het beweegen zyner leden den Heelmeester niet hinderlyk zy , en hy dus fomtyds het oog beledige ; en dit moet men ook in het oog houden by alle operatien , welke ik in deeze en de volgende afdeelingen zal aanraden.

Is het vlies , door het welk de oog-leden gesloten zyn , met gaatjes doorboort , dan moet men hetzelve op eene holle sonde , door een van dezelve in het oog gebragt , zoo doorfnyden , dat men de boogs-wyze kraak-beenderen niet kwetze ; maar , indien het vlies geheel is , dan vat men het loodregt en dubbeld , met de vingers op , en snyd het dwars door , waarna men op eene in het oog gebragte holle sonde , welkers voorste einde rond , en stomp is , zulk eene opening maakt , als met die van het oog overeenkomt : andere bedienen zich

van

van eene schaar, welkers eene punt meteen knopje voorzien is (a).

Na het verrigten der operatie moet men, om het aan elkander groeijen te beletten, een stukje goudslagers-vlies tusschen de oog-leden leggen. DELEURYE is wel van meening, dat men niets tusschen dezelve leggen moet, dewyl hy hoopt, dat de beweeging van het oog zoude kunnen beletten, dat de oog-leden zich weder aan elkander vast hegten; maar het komt my egter vyliker voor, dat men het oog na de operatie op de eene of andere wyze beschermte; ook moet men de oog-leden dikwils met melk, of een oog-water, bestaande uit het een of ander gedestilleerd water (by voorbeeld, venkel- of rozenwater,) waar onder de slym van quace-pitten gemengd is, afwassen.

De boogs-wyze kraak-beenderen der oog-leden zyn somtyds ook aan elkander vereenigd, of door middel van een tusschen-komend vlies, of zonder hetzelfde. In gevalle het eerste plaats heeft, moet men de operatie op de hierboven beschreeven wyze verrigten, maar teffens moet men de hand zoo bestuuren, dat men den binnensten oog-hoek en de traanstippen niet beledige.

Gedurende den tyd, dat men de operatie nog uitseld, moet men het oog dikwils zagties met een vinger vryven, ten einde men belette, dat de
oog-

(a) JUNCKER *Conspect. Chirurg.* p. 517. vergelyk ook omtrent deeze operatie P. ÆGINETA lib. VI. c. 15,

oog-leden aan den oog-bol vastgroeijen. Onder het verrigten der operatie moet men letten, dat men het bovenste oog-lid niet kwetze, dewyl dit zoo in het openen, als sluiten, van het oog, als ook in het bestuuren der traanen, meer nut aanbrengt, dan het onderst; hierom is het beter, dat men, in gevalle het niet anders zyn kan, het onderst, als zynde van minder nut, doorshyde. De operatie beschryft DELEURYE duidelyk (a).

In gevalle het ooglid aan het hoorn-vlies is vastgegroeid, kan men van de kunst weinig hulp verwagten. Maar egter zoude men kunnen beproeven, of men, indien de oog-leden zich over den oog-bol eenigzins konden beweegen, door middel van eene inshyding de oog-leden eerst van elkander zoude kunnen afzonderen, en vervolgens derzelver vasthegting aan den oog-bol los maaken, maar zoo, dat men het mesje meer rigt na het oog-lid, als na het harde vlies (*scelerotica*), of het hoorn-vlies.

Na dat de operatie verrigt is, legt men een lood plaatje tuschen den oog-bol, en het oog-lid; en, al voldoet de uitslag van de operatie niet aan de
ver-

(a) Men ligt een weinig op het bovenste gedeelte, en snydt met den punt van een mesje de oog-leden van elkander; dan trekt zich het bovenste oog-lid te rug, en te gelyk het boogs-wyze kraak-been, terwyl intussehen het onderst na beneden gaat. DELEURYE *Tr. des accouchemens*. p. 388. vergelyk *malad. des enfans*. p. 161.

verwagting; heeft men egter dit met dezelve gewonnen, dat men, door het in de plaats stellen van een gemaakt oog, de wanfaltigheid kan verminderen.

De *cataracta*, welke fomtyds is aangeboren (*a*), kan by pasgeboore kinderen niet geneezen worden, maar men moet de kunst bewerking uitstellen, tot dat zy langer tyd geleefd hebben.

Het zintuig van het gehoor kan niet minder by pas geboore kinderen met ongemakken worden bezogt. De uitwendige opening word, by voorbeeld, dikwils door eene te groote quantiteit oor-smeer, of door vuiligheden, verstopt; maar dit ongemak kan men, dewyl dit smeer by pas geboore kinderen vloeibaar genoeg is, gemakkelyk gencezen door het inspuiten van lauw water, hoewel dit egter, gelyk de Engelschen onlangs met voorbeelden bevestigd hebben, ook het beste middel is ter ontbinding van verhard oor-smeer.

Indien de buitenste opening van het oor door een vlies gesloten is (*b*), moet men het zelve kruis-wyze doorsnyden (*c*); maar hierby moet men letten, dat men het daar onder gelegen Trommel-

(*a*) Men zie HILDAN. *Cens. V. obs. 3.* ACREL. *Heelkund. waarn. p. 78 en vervolgens.*

(*b*) *Miscel. N. C. Dec. I. ann. VI. p. 235.*

(*c*) Bytende middelen komen hier niet te pas, dewyl zy het Trommel-vlies zelfs zouden kunnen beledigen. ÆGINETA bediend zich van een puntig mesje. L. VI. c. 23.

mel-vlies niet kwetze, het welk ligt zoude kunnen geschieden by kinderen, als welke byna geen' beenigen gehoor-weg hebben. Indien dit vlies dieper gelegen is, dan is 'er geene hulp overig, en de kinderen worden hierdoor meestentyds doof, en uit dien hoofde ook stom.

De neus-gaten worden dikwils verstopt door vuiligheden, welke men met lauw water, melk, gewoone, of eyer-olie, moet verzagten. De vroedvrouwen in Duitsland bedienen zich doorgaans van *majoran*-boter, maar melk, of olie, zyn tot dit oogmerk voldoende. Hiervan bediend men zich het best op deeze wyze, dat men een veer van een klein vogeltje daarmede bevoogtigt, en dezelve dan in den neus brengt.

Gebeurt het, dat de neus-gaten door een vlies gesloten zyn (*a*), dan snyd men het zelve door, en houd de wond open door zachte steek-wieken, welke men wegneemd, als het kind zuigt.

Ook zyn de lippen somtyds aan elkander vastgegroeid (*b*); maar daar blyft egter altyd over eene groef, welke als ware het eenen weg aan het mesje wyft.

Men

(*a*) Men zie TH BARTHOLINI *act. Hafniens. vol. 1. p. 199.* Vergelyk HALLER. *Op. min. l. c. p. 37.* de geneezing van dit ongemak, na de kinderziekte overgebleven, kan men vinden by HEISTER *Chirurg. t. 2. p. 623. seq.*

(*b*) *Act. Phys. med. N. C. tom. 2. obs. 96 p. 210.* HALLER heeft meer voorbeelden verzameld in *Elements. Physiol. lib. 29. p. 199.* en in *Opp. anat. min. l. c. p. 37. not. p.*

II. DEEL.

Y

Men behoeft geene zeer groote inſnyding ter wegneeming van dit ongemak te maaken, maar zy moet ſlegts zoo groot zyn, dat men door dezelve eenen vinger, en de minne den tepel van haare borſt, kan binnen brengen; want allengskens word zy van zelfs door het ſchreuwen van het kind wyder.

De ongemakken van den neus, en de lippen, moet men terſtond door de operatie trachten te geneezen, dewyl door dezelve de ademhaling, en het zuigen, belet word.

§. V I.

De Hazen-mond.

De geſlote lippen, een ongemak, dat by jonge kinderen ſomtyds word waargenomen, brengt ons, als ware het, tot een ander, dat by deeze ook word gezien, ja zelfs meer voorkomt, zwaarer is, en *Hazen-mond* genoemd word. Maar, alhoewel het zelve onder de ziekten der kinderen zoo uit hoofde van deszelfs gewigt, als gemeenheit, uitmunt, zullen wy egter hierover niet zeer breed uitwyden, dewyl het in alle heelkundige werken, en in veele zelfs voortreffelyk, behandeld is. Gevoeg zy het derhalven, eenige aanmerkingen betreffende dit ongemak mede te deelen.

Een *waare* Hazen-mond, te weten zulk een, die aangeboren is, (want die door eene wond verwekt word, noemt men *onaga*) ziet men alleen aan de bovenſte lip, en deeze is of enkelvoudig, of dubbeld, of dreyvoudig, wanneer in de ſpleet een
stuk

stukje vleesch, naar de lel in de keel gelykende, gezien word. Wanneer het beenig gedeelte van het gehemelte ook gespleten is, noemd men dit ongemak zamengesteld, in welk geval somtyds een of meer tanden uit de spleet zelfs te voorschyn komen. Het beenig gedeelte van het gehemelte is nu en dan van een geweeken tot aan de lel; ja men heeft die somtyds ook in twee deelen gescheiden gevonden. Daar en tegen vind men by VAN SWIETEN (a) gewag gemaakt van een kind, wiens beenig gedeelte van het gehemelte gespleten, en de lip geheel, was.

Betreffende het ontstaan, en den aart van dit ongemak, teekend de beroemde LOUIS (b) in zyne fraaije verhandeling over het zelve (c) aan, dat in een aangeboren Hazen-mond geen gebrek van zelfstandigheid plaats heeft, maar dat de spleet in de zachte deelen door de werking der spieren ontstaat, en nauwer, of wyder, word, naar mate zy met meer, of minder, kragt werken. Ook verliezen de beenderen niets van hunne zelfstandigheid, maar die van de kaak gaan alleen van elkander en hier door komt het, dat by kinderen, die dit ongemak hebben, de bovenkaak te breed is (d), uit welken hoof-

(a) *Comment. in BOERH. Aphor. tom. 4. §. 1354.*

(b) *Memoir. de l'acad. de Chir. tom. 4. edit. in 4to of tom. 12. in 12mo.*

(c) Dit ontkend VALENTIN in *Recherches critiques sur la Chirurgie moderne. Amst. 1772.* Vergelyk RICH-
TER *Chirurg. Bibl. t. 2. stuk. 2. p. 40.* en vervolgens.

(d) LEVRET in *Journal de medecine 1772. p. 249.*

hoofde de zagte deelen der lippen door de kragt der spieren ook van elkander worden afgerukt, en 'er dus eene verdeeling van de lip ontstaat.

Een Hazen-mond maakt niet alleen het aangezigt wanfaltig, maar belet ook het zuigen, dewyl een kind, wiens lip is gespleten, hier toe buiten staat is. In gevalle het beenig gehemelte ook gespleten is, word het zuigen met nog meer moeite verrigt, en al brengt men het zog met een lepel in den mond, komt het egter door den neus weder te voorschyn, of loopt in de lugttyp; en het komt hier van daan, dat kinderen, met dit ongemak geboren, al schynen zy kort na de geboorte fris en gezond te zyn, zeer dikwils egter hun leven verliezen (a).

De beroemde PETIT (b) heeft het ongemak getragt te verbeteren, door in den mond te brengen eene half opgevulde geiten-uijer, op dat door de zagtheid, dikte, en lengte, van dezelve de spleet van het gehemelte, en de opening in den neus, zouden gesloten worden; maar men is dikwils verplicht, dezelve weg te neemen, om aan de ademhaaling geene belemmering te verwekken. Veele kinderen worden aan dit ongemak gewoon, en sluiten de spleet van het gehemelte door het opligten van den rug der tong, terwyl zy met den punt van dezelve zeer wel zuigen.

In het verkiezen van eene minne moet men letten, dat de tepels van haare borsten wat lang en dik

(a) VAN DOEVEREN *Spicileg. observat. anat.* p. 55.

(b) *Histoire de l'Acad. des Sciences.* an. 1735.

dik zyn. Maar, indien het kind in het geheel niet kan zuigen, dan raad MORGAGNI (a), dat men het voedende clystceeren zal zetten, ten einde deszelfs leven ten minsten een tyd lang te verlengen.

Op de vraag, of men den Hazen-mond terstond na de geboorte kan snyden, dan of men deeze operatie eenigen tyd moet uitsstellen, zoude ik meenen, te moeten antwoorden, dat, dewyl de operatie het eenigste middel is, om de opening te doen sluiten, en het gebrek te geneezen, men-dezelve niet lang moet uitsstellen, vooral wanneer het zuigen door dit ongemak belet word; waarby nog komt, dat kinderen, hoe jonger zy zyn, ook des te minder gevoelen de ongemakken van de operatie, dewyl zy byna altoos slaapen, en wonden by hen ook spoediger worden geneezen, dan by volwasste menschen; daar en boven verloopt 'er met de geneezing der wond, door deeze operatie verwekt, vooral indien zy zonder naalden, op de wyze van den beroemden Louis, welke hierna zal beschreven worden, word verrigt, zeer weinig tyd, en, terwyl de lippen na de operatie geheeld worden, word ook allengskens de opening in het been van zelfs gesloten, en zy groeid toe (b).•

Het is wel moeijelyk, te verklaaren, op welke wyze de randen van de opening in het been door het tand-vleesch bekleed, zich kunnen vereenigen; maar

(a) *De fed. & caus. morb. Ep. 48. art. 60.*

(b) LA FAYE *mem. de l'Acad. de Chir. T.I. p. 605.*
ad. in 4to. vergelyk LEVRET *l'art des accouch. p. 243.*

maar ik weet niet, of wy ons meer moeten verwonderen over deeze zaak, als over het geen veelvuldig voorvald aan de kaaken van zeer oude menschen, die, van tanden beroofd zynde, zonder dat het tand-vleesch beledigt word, door de vryving zoo flyten, dat 'er van een been, dat voorheen dik was, slegts een dun stukje overblyft.

Hieruit besluit ik, dat men, al is het beenig gedeelte van het gehemelte van een geweeken, egter de operatie moet in het werk stellen, en dat men niet moet hooren na hen, die zeggen dat ze dan ten hoogsten moeijelyk, en onnut, is, dewyl 'er vry veele voorbeelden van geneezingen, op deeze wyze gelukkig verrigt, voor handen zyn.

Wanneer men de operatie niet aanstonds na de geboorte, maar na verloop van eenigen tyd, doet, is het niet kwaad, dat men zich van een verband, dat hierna beschreven zal worden, bediend, ten einde intuschen de opening in het been door het terugtrekken der spieren niet grooter zoude worden, maar de lippen zich in tegendeel eenigzints mogen zamentrekken, het welk men vooral moet reekenen onder de voornaamste hulpmiddelen tot eene gelukkige geneezing.

§. VII.

Vervolg.

Wanneer men tot de operatie zal overgaan, word 'er vereischt, dat men, door het afnyden der randen van de gesplete lip, eene versche wond maake, welkers kanten dan vervolgens door het aanraaken van

van elkander na de wetten der natuur aan elkander vastgroeijen. Men vind in bykans alle boeken over de Heelkunde eene breedvoeriger beschryving van deeze kunstbewerking, waarom het my toe schynt, te kunnen volstaan, dat ik ter deezer plaatse slegts eenige aanmerkingen omtrent dezelve mede deele.

De ouden bedienden zich, by het verrigten der operatie op den Hazen-mond, om de randen van de spleet weg te snyden, van eene schaar; maar **LE DRAN** (*a*) heeft egter reeds een mesje gebruikt, en latere schryvers, en onder deeze inzonderheid **LOUIS** (*b*), raaden dit vooral, en wel met regt, aan, uit hoofde, dat wonden, door eene schaar toegebracht, altyd gekneusd zyn, en daarom moeilijc geneezen worden.

Men neemt dat gedeelte der lip, het welk men kwetzen zal, in de hand; in oude tyden bediende men zich wel van eene byzondere soort van tangetjes (*morailles*) (*c*), met welke men de lippen zamendrukte, en door welke men meende, dat de bloedstorting ook belet wierd; maar deeze instrumenten heeft men, uit hoofde van de kneuzing, en pyn, welke zy verwekken, in vervolg van tyd met regt verworpen.

Tusschen de kaak en de lip moet men leggen een dun stukje hout, bord-papier, of een dun plaatje
van

(*a*) *Operat. p. 448.*

(*b*) In de aangehaalde verhandeling.

(*c*) **HEISTER Chirurg. tab. 20. fig. 6. 7** en **GARENGEOT Traité des instr. t. 1. p. 396.**

van lood, of hoorn, ten einde het mesje een vast steunpunt kryge, en men het deel, dat moet afgesneden worden, des te beter kunne wegneemen. In gevalle de lip aan het tandvleesch door banden vereenigd is, moet men dezelve by de operatie losmaaken, maar ik agt het niet nodig, dat men zich daarna om dezelve veel bekommere, dewyl de toevloed van het spoeg genoeg belet, dat zy weder vastgroeijen.

De meeste zyn, dog verkeerdelyk, van meening, dat de randen der spleet van een Hazen-mond vereeld zyn, maar dit heeft zelden, of nooit, plaats, want zy zyn meestentyds zagt, bestaande uit week, helder-rood gekleurd, vleesch, en bekleed met eene zeer dunne opperhuid, welke men geheel moet wegsnyden; want anders zoude het litteeken niet volkomen zyn, en daar zoude somtyds eene pyp-zweer, welke met mocite zoude kunnen geneezen worden, ontstaan.

De oude Heelmeesters waren gewoon, de lippen der wond door middel van de omwonde hegting te vereenigen, en deezen naad met een verband te bevestigen.

Ik meen, dat het hier de plaats niet is, om gewag te maaken van de onderscheide foorten van naalden, zoo veel in gedaante, als lengte, en stofse, van elkander verschillende; als ook niet van de onderscheide manieren, om deezen naad te maaken, dewyl hier over in byna alle Heelkundige werken breedvoerig gehandeld is; maar meen, dat ik moet zeggen, dat 'er onder de ouden reeds
zyn

zyn geweest sommige, die leerden, dat men in dit geval den voorkeur aan hegtpleisters of een zoo- genoemden droogen naad boven een' bloedigen geeven moest; en dit hebben PIBRAC en LOUIS (a) naderhand nog meer bevestigd. Andere zeggen wel, (b), dat eene wond in zagte deelen, welke ligt medegeeven, bezwaarlyk, indien men ze met geene bloedige hegting bezorgt, vast toegeheeld kan worden, zonder dat 'er een wanfstaltig lidteken overblyft, maar ik ben ten vollen overtuigd, dat, indien men een klein plaatje tusfchen de lip, en den onderften rand van de kaak, legt, de wond, als zy wel zamengedrukt, en vereenigd, is, alleen door middel van hegtpleisters naar behooren kan worden geneezen; en dit geloof ik des te meer, dewyl veele zeer voornaame Heelmeesters door proeven getoond hebben, dat men tot het vereenigen van deeze wond geene naalden nodig heeft.

De ouden waren doorgaans by een dubbelen Hazen-mond gewoon, van het middenst' uitsteekend gedeelte aan byde zyden wat af te snyden; aan het zelve eene driehoekige gedaante te geeven; en de opening vervolgens na de gewoone manier, namentlyk door naalden, gestooken door het middenste
uit-

(a) Men zie PIBRAC *comment. sur l'abus des futures. mem. de Cbir. ed. in 12 mo. tom. IX. p. 12.* en nogbreedvoeriger LOUIS in de aangehaalde verhandeling. Vergelyk ook BIDERMANN *diff. de labio leporino. Argent. 1770.*

(b) RICHTER *Cbir. Bibl. I. B. 2. §. p. 31.*

uitsteekend gedeelte , te fluiten ; maar de beroemde LOUIS (*a*) leerd dit op eene andere , en betere wyze verrigten ; hy doet namentlyk de operatie op twee verschillende tyden , maakende eerst van de twee eene opening , en dan bezorgt hy de geneezing even als by eene enkelvoudige Hazen-mond.

Men moet de tanden , die zich somtyds in de opening laten zien , niet , gelyk de meeste willen , wegneemen , als in de grootste noodzakelykheid , dewyl de ontfteeking , en pyn , daardoor zeer word vermeerderd. Men moet veel eer beproeven , of men ze in hunne natuurlyke plaats weder brengen kan , het welk LOUIS (*b*) zegt , dikwyls geschied te zyn. Dog indien men in het geheel niet kan nalaaten , een tand uit te trekken , of een uitsteekend been weg te neemen (*c*) , dan moet men dit eenige dagen , voor het verrigten der operatie , doen (*d*) , ten einde de operatie zelve niet al te pynelyk zy , en men de ontfteeking eer voorkome.

Het zy men nu de operatie met naalden , of hegtpleisters volgens de manier van LOUIS , heeft verrigt , moet men egter de lippen der wond vereenigd houden

(*a*) Op de aangehaalde plaats *obf.* 6.

(*b*) Op de aangehaalde plaats *p.* 142.

(*c*) Dit word het best verrigt door middel van het instrument , dat CHESELDEN heeft afgebeeld by de aanmerkingen , gevoegd by de Engelsche vertaling van de operatien van LE DRAN , door GATAKER in het ligt gegeven. *Tab.* V.

(*d*) BERTRANDI *Traité des oper.* *p.* 389.

den door het een , of ander , verband , hoedanige veele schryvers hebben vermeld (*a*); dus heeft by voorbeeld , VERDUC (*b*) aangeraaden een rond gebogen staal instrument ; andere drukken de wangen door middel van een balein na vooren (*c*). Sommi-ge schryven eene andere manier aan CELSUS toe , doch verkeerdelijk (*d*). Maar het nut van een verband bestaat voornamentlyk daarin , dat de lippen der wond nader by elkander gebragt worden , en de kragt der spieren , welke zoo veel vermogen hebben in het van elkander brengen der randen van de opening , verminderd worde. LOUIS raad op de aangehaalde plaats , na het aanleggen van hegt pleisters , aan het gebruik van een vereenigend verband , het welk hy door middel van daar onder gelegde compresfen gewoon is te bevestigen ; maar

Br-

(*a*) Men zie PLATNER en HEISTER *Chirurg.* op de gezegde plaatsen.

(*b*) *Traité des oper.* c. 23. hy noemd het *ferre-Tete*.

(*c*) QUESNAY by LA FAYE op de aangeh. plaats. VALENTIN beschryft op de aangeh. plaats een werktuig , bestaande uit twee tangen , die parallel aan elkander zyn , en door het welk de randen der wond na de operatie door middel van een schroef by elkander gebragt worden , bevorderende men dus de vereeniging van dezelve.

(*d*) Zy zeggen nameptlyk , dat CELSUS *lib. VII. c. 9.* aangeraden heeft , dat men by een Haazen-mond in de wangen op zyde van den mond twee insnydingen maaken moet , ten einde de huid des te beter zoude kunnen by een gebragt worden , en zich vereenigen ; dog CELSUS spreekt

BIDERMAN (a) beschryft een vereenigend verband, waarvan de einden kruislings over elkander loopen, en het welk hy van de Engelschen meend te zyn uitgevonden, hoe zeer, voor zoo verre my bekend is, de *Leipziger* Heelmeester HEBENSTREIT zich van het zelve het eerst heeft bediend (b).

Na dat de operatie verrigt is, moet men, voor zoo verre dit by kleine kinderen plaats kan hebben, het schreijen, niesfen, lagchen, en alles, dat de spieren van het aangezicht kan doen beweegen, vermijden. Zuigende kinderen moet men een' tyd lang het zog met eenen lepel in den mond brengen.

Indien het beenig gedeelte van het gehemelte, tot een meer gevorderden ouderdom, gespleten blyft, maakt het het spreken mocijelyk (c). In dit geval zoude men zich mogelyk met zeer veel nut, en met weinig verandering, bedienen kunnen
van

spreekt op de aangehaalde plaats in geenen deele van den Haazen-mond, maar leerd, hoe men een verlooren gedeelte der lippen, by voorbeeld na het wegneemen van de kanker, kan vervullen, ook snyd hy de wangen niet door, maar maakt alleen eene insnyding in de bekleedfelen.

(a) Op de aangeh. plaats.

(b) HENCKEL heeft dit verband afgebeeld in *Anweisung zum Chirurgischen verbande* fig. 104. maar hy maakt geen gewag van HEBENSTREIT.

(c) *Pfellsismus iotacismus*. SAUVAGES *Nosol. T. I. p. 783*. zy kunnen vooral niet uitspreken de letters, die in de keel geformeerd worden; maar dit ontstaat ook dikwils door eene kwaade gewoonte.

van dat werktuig, met het welk J. Beck, wien men onlangs alhier heeft kunnen zien, het gebrek in zyn gehemelte vervulde; het is namentlyk een stukje kalfs-leder, aan het welk een zagt sponsje, dat de opening na den neus sluit, wanneer men het op de plaats van het gehemelte in den mond gebragt heeft, is vastgemaakt; maar in pas gebore kinderen zoude dit, dewyl hunne neus-gaten te nauw zyn, geene plaats kunnen hebben (a). Andere hebben ook aan de hand gegeven byna zulke werktuigen, welke egter bezwaarlyk by zeer jonge kinderen kunnen gebruikt worden (b), waarom men, tot dat zy in ouderdom meer gevorderd zyn, het best doet, met gebruik te maaken van de hier boven beschreve pallieerende geneeswyze.

§. V I I I.

Ongemakken van de Tong, en Keel.

Het zuigen word den kinderen, behalven door een Haazen-mond, ook nog daar en boven belet door andere gebreken van den mond, en de keel; namentlyk door zulke, als aan de vrye beweeging van de tong hinderlyk zyn; want dezelve word van anderen, als ware het, bevestigd door eenen band, die

(a) Men zie *Eene verwonderenswaardige Herstelling van de Berooving der Neuze en verbemelte door een Beenvreter veroorzaakt. Amst. 1771.*

(b) FAUCHARD *Chirurg. densifse* eb. XX—XXIII. Tab. 38. 39 en 40.

die zamengesteld is uit eene verdubbeling van dat vlies, dat den mond van binnen bekleed, en van agteren voorzien word van eenige spieragtige vezelen. Het eigentlyke nut van deezen band is, te beletten, dat de tong niet te veel word te rug getrokken, maar wanneer zich dezelve tegennatuurlyk uitstrekt tot aan den punt van de tong, word hier door belet, dat de tong tot aan het gehemelte kan worden opgeligt, of tot aan het einde der lippen kan worden uitgestoken (*a*); en hierdoor word de tong in zyne werking zoo belet, dat pas geboore kinderen niet kunnen zuigen, en indien zy des niet tegenstaande egter in jaaren toeneemen, buiten staat zyn om te spreken, gelyk behoord. Soms tyds word de punt van de tong zoo veel na beneden getrokken, dat zy byna de gedaante van een hart krygt.

De ouden zyn reeds bedagt geweest, om deezen band, in gevalle hy te lang was, te verkorten (*b*), waartoe zy zich byna alle slegts van hunne nagels en vingers bedienden, en in sommige Italiaansche steden hadden de Vroedvrouwen aan den duim van de

(*a*) Dit ongemak noemen de Vroedvrouwen in Duitsland *die angewachsene zunge*: in Vrankryk word het, even als de band zelfs, genoemd *le filet*: by de Grieken wierd het genoemd *ἀγκυλογλίσσω*; by de Latynen *Frenum* of *linguae ligatio*; en by de Nederlanders *de Tong-riem*.

(*b*) De operatie is bekend geweest aan CICERO *de divin*, l. 2. c. 46. vergelyk P. ÆGINET. l. 6. c. 29.

de regter hand een langer nagel, dien zy op de wyze van een mes gebruikten (a). Maar my dunkt, dat men zulk eene verscheuring, welke door middel van de vingers geschied, niet kan aanraden, dewyl de wond dus dikwils al te groot gemaakt word, en altyd gekneusd is (b), waardoor somtyds vuile zweeren overblyven, hoewel deeze egter niet, gelyk het bygelovig gemeen wil, ontstaan, door dat de nagels der vingers fenynig zyn (c). Andere vrouwen bedienen zich van den rand van een stuk geld, en de Heelmeesters van een lancet, eene schaar, of een mesje.

Intusichen klagen byna alle Schryvers der Heelkunde niet te vergeefs daar over, dat de Vroedvrouwen deeze operatie verrigten aan de kinderen zonder eenig onderscheid.

Om derhalven overtuigt te worden van derzelver noodwendigheid, moet men onderzoeken, of de kinderen aan den tepel van de borst der minne, of aan eenen in den mond gestoken vinger zuigen, en de tong buiten de tanden steeken kunnen; want, indien zy dit kunnen doen, moet men de operatie niet verrigten, of, indien de ouders dezelve egter willen hebben in 't werk gesteld, dan moet men slegts voorgeeven dezelve te doen, ten einde zy niet

(a) FALLOPPIUS *instit. anat. Fr.* 1600. p. 457.

(b) FABRIC. *ab Aquapendente de operat. Chirurg. p.* 34. *in operibus. Patavii* 1647.

(c) Dit is ook de meening van LOUISE BOURGOISE *Hebammenb. p. 1. c. 25.*

niet misfchien daarna van een onkundig mensch worde verrigt. Want, al word men gewaar, dat deeze band lang is, moet men egter, indien dezelve het zuigen niet belet, de operatie uitstellen, dewyl hy dikwils van zelfs door de beweeging van de tong los word, en ook in eenen meer gevorderden ouderdom beter, en met minder gevaar, kan worden doorgesneden.

De belemmerde spraak van ouder menschen komt niet altyd voort, door dat men verzuimd heeft, deezen band los te maaken, waar aan men doorgaans de schuld geeft, maar ontstaat of door een gebrek aan de overige werktuigen, of uit eene kwaade gewoonte.

Wanneer men de operatie verrigten zal, moet men het kind plat neder leggen, en de Heelmees moet of agter hetzelfde staan, of, dat nog beter is, voor hetzelfde. Men sluit den neus van het kind, ten einde het de tong uitstecke, en men, dezelve opgeligt wordende, in staat zy om den tong-riem doortefnyden. Sommige vatten de tong met de linker hand tusfchen een doekje, en verrigten de operatie met de regter hand (*a*), andere bedienen zich van een tangetje (*b*).

Dewyl de tong, als zy naar agteren getrokken, en vast gegroeid is, met moeite kan worden opgeligt, hebben sommige hiertoe onderscheide werktuigen

(*a*) HEISTER *Chirurg. T. XXI. fig. 1.*

(*b*) FABRICIUS *ab Aquapendente* maakt op de aangehaalde plaats gewag van een tangetje.

tuigen gebruikt (a). PETIT heeft 'er uitgevonden een, dat zeer zamengefeld is; waardoor de groote aderen, welke onder de tong loopen, en uit welke, wanneer zy gekwetst worden, zeer veel bloed te voorschyn komt, beschermd worden, terwyl door een mesje, met een veer voorzien (*bistouri à ressort*) de insnyding word verrigt (b); maar naderhand heeft hy, de gebreken, welke het gebruik van dit mesje verzellen, begrypende, een ander op de wyze van eene schaar (c) uitgevonden, met het welk vereenigd is een yzer plaatje dat de tong opligt, en de vaten beschermd. PLATNER (d) heeft ook een byzonder werktuig, dat bekwaam is om, als men eene schaar gebruikt, de vaten te bewaaren, bekend gemaakt; maar veele bedienen zich tot het opligten der tong van eene gemeene holle sonde, aan welkers einde, dat men in de hand houdt, vast is een plat harts-wyze plaatje, voorzien van eene insnyding, in welke de tongriem met gemak kan gevat worden. De meeste snyden deezen band doorgaans met eene schaar door, en LEVRET raad aan zulk eene, die niet breed van

(a) Men zie MAURICEAU *mal. des femm.* L. 3. ch. 30. pag. 491. en HEISTER op de aangehaalde plaats, en *Tab. 1. let. O. en P.* als ook PETIT *mem. de Paris.* 1742. p. 347. ed. in 8°. fig. 8.

(b) als boven fig. 6. en 7. PLATNER fig. 15.

(c) Aldaar fig. 1—5.

(d) *Instit. Chirurg* fig. 14,

II. DEEL.

Z

van bladen is , en een stompe punt heeft (a); maar de beroemde DELEURYE maakt eerst met een schaar eene insnyding , vryft dan de gewonde plaats met zout , en zonderd het overige af met zyne vingeren (b). Ik agt niet zeer nodig , dat men opvolge den raad van HILDANUS (c), bestaande daarin , dat men in den tong-riem op verscheidene plaatsen insnydingen maake , dewyl dezelve , na dat hy op bovengenoemde wyze is doorgesneden , byna nooit weder aan een groeid.

By deeze operatie heeft men nergens meer voor te vreezen , als voor de bloedstorting , welke op dezelve volgt , wanneer men de insnyding te laag verrigt , en die somtyds zelfs ontstaat , geheel buiten de schuld van den Heelmeester , in gevalle 'er groote vaten door de zelfstandigheid van den tong-riem , die al te dik is , loopen (d). Deeze bloedstorting is des te gevaarlyker , dewyl men by zulke jonge kinderen de beweeging der tong niet kan beletten , en hierdoor komt het , dat veele door dezelve ellendig

(a) *Journal de med.* 1772. p. 238. Hy heeft zulk eene schaar afgebeeld in zyn *Traité sur les polypes*. Tab. IV. fig. 6.

(b) *Traité des accouch.* p. 391. en *malad. des enfans.* p. 171.

(c) *Cent.* 3. *obs.* 25.

(d) Dusdanig eene heeft SMELLIE gezien , en hy overwon ze door middel van wyn-geest. *Obs.* Tom. 3. p. 467.

ellendig omkomen: Ja het is, om van geene andere gevallen gewag te maaken, nog maar weinige jaaren geleden, dat in deeze Stad *Leipzig* een kind overleden is, door dat een ruuw, en gemeen, mensch by het losmaaken van den tong-riem ook te gelyk de tong zelve had gekwetst. Zyn de kinderen ouder, dan heeft men minder rede, om voor eene bloedstorting te vreezen, dewyl zy de tong zoo niet beweegen, en men het bloed, door hen zachte zamentrekkende middelen in den mond te doen houden, kan stuiten.

PETIT meend, dat men eene bloedstorting, ontstaan door het maaken van eene al te groote inshyding in den tong-riem, zoude kunnen tegengaan met eenen byzonderen toestel (a); hy vervaardigde namentlyk een vorkje uit een takje van zagt hout, afgesneden ter plaats, daar het zich in tweeën verdeeld, en van dit vorkje is het lighaam zelfs vier lynen, en de takken, of tanden, zyn agt lynen lang. Dit wind hy in een zagt linnen-lapje, en legt het onder de tong zoo, dat het hand-vatsel, of het lighaam, rust op de onderste kaak, en dat de hoek, die ontstaat door de zamenvoeging der takken, steund op de opening der aderen, en dezelve sluit. De takken zelve, voortgaande langs de beide zyden van de tong, houden dezelve regt, zoo dat zy zich noch herwaards, noch derwaards, kan beweegen. Dit werktuig aangelegd zynde, neemt PETIT een zwagtel van dun linnen, een el lang,

(a) Op de aangehaalde plaats

en agt, of tien, lynen breed, welks middenste gedeelte hy zoo op de tong legt, dat het de beide hoeken der lippen aanraakt, vervolgens laat hy den zelve onder de kaak voortgaan, zoo dat de einden elkander by het strotten-hoofd kruisen, waar na hy ze aan het agterhoofd vastmaakt. De beschryving van deeze uitvinding heb ik zoo breedvoerig ter nedergefteld, dewyl zy ten hoogste nuttig is, en zelfs de eiken-zwam zonder een goed verband vrugteloos word aangewend.

PETIT, van wien wy reeds dikwils met lof gesproken hebben, is ook de eerste geweest, die heeft waargenomen een ander ongemak, het welk de kinderen somtyds treft, wanneer de tong-riem al te ver word doorgesneden. Hy zag namentlyk, dat de kinderen de tong, al te veel van haaren band afgezonderd, naar agter om krulden, dezelve inslikten, en dus door het toesluiten van het strotten-hoofd stierven (a).

Het eenig middel ter hulp [van zulk een kind is gelegen daarin, dat men door een vinger in den mond te steecken de tong weder naar vooren brengt; en hierom raad hy de minnen aan, dat zy, in gevalle zy een kind hooren slikken, en gewaar worden, dat de ademhaaling belemmerd word, het zelfde ver-

(a) Op de aangehaalde plaats pag. 339. en vervolgens. Soortgelyke zaak verhaald men ook van de Neger-slaaven, als welke men zegt, dat zich door het inslikken der tong ombrengen. SAUVAGES noemt dit *Paraglossæ deglutitoria*. l. c. T. I. p. 150.

verrigten. Hy heeft ook in zulk een geval door middel van een, in den mond gebragt, compres de tong nedergedrukt, en hetzelfde bevestigd met een zwagtel, voorzien van vier hoofden, welke zwagtel hy, als het kind zuigen moest, wegnam (a).

Men bestreikt de wond met honig, in gersten-wa-
ter ontbonden, en roerd ze dikwils aan met een
vinger, dien men vooraf in honig doopt. Op dee-
ze wyze word zy doorgaans, binnen vier en twin-
tig uren, met een lidteeken gesloten.

Behalven deezcn band, die natuurlyker wyze de
tong van onderen bevestigd, en somtyds tegen-na-
tuurlyk al te lang is, neemt men nu en dan waar
zydelyke banden, die de beweging der tong be-
letten. Deeze zyn somtyds zeer vleeschig, en men
doet ook het best, als men ze met eene schaar
doorsnyd op die wyze, dat men geen tweede door-
snyd, voor dat de bloedstorting, door de wond van
den eersten ontstaan, gestuit is.

Somtyds kleeft de tong, zonder eenige klaarbly-
kelyke oorzaak, als ware het aan het gehemelte,
en belet het zuigen (b); maar ter wegneeming
van

(a) Sommige byten door brand-middelen den tong-
rijem weg, maar niet zonder gevaar; want door het
toevloeiend speeksel word het brand-middel ontbon-
den, en verwekt zwaare toevallen. Men zie SMELLIE
Obs. T. 3. p. 468.

(b) LA PIE *mem. de l'Acad. de Chir. Tom. 3. p.*
16. edit. in. 4to. Tom. VII. p. 25. edit. in. 12mo.

van dit ongemak is genoeg, dat men ze of met een spatel, of met het agterste van een lepel, nederdrukke.

Men ziet zelden, dat de keel gesloten is door een vlies, het welk, als men het waarneemd, doorgaans is een aanhangzel van het zachte gehemelte, maar egter heeft STORCH (a) van zulk een ongemak melding gemaakt. Dewyl dit nu zoo wel voor het zuigen, als het spreken, hinderlyk is, moet men het door insnyding weg nemen, en dan schynt de lei in de keel somtyds dubbeld te zyn.

Het is eene zeer bekende zaak, dat zich by volwasne menschen onder de tong zeer dikwils vertoonen gezwollen, welke men kikvorsch-gezwollen noemd; maar het gebeurt egter somtyds ook, dat niet alleen kleine kinderen, maar zelfs zulke, die pas ter waereld komen, aangetast zyn door dit ongemak, het welk LEVRET afleid van het speeksel, dat in de kwyl-buizen word opgehouden (b), en het welk hy rekent onder de rok-gezwollen: hy, zoo als ook DELEURYE (c) zyn van oordeel, dat men zulk een gezwel door middel van een brand-yzer moet wegneemen; maar dit schynt my niet toe veilig te kunnen geschieden. Ontstaat het door eene verzwearing, dan moet men het, wanneer

(a) *Kinder-krankheiten*. 1750. pag. 158.

(b) *Accouch.* p. 259. vergelyk ook *journal de med.* als boven pag. 244.

(c) *Malad. des enf.* p. 173.

meer het met etter is gevuld, openen; maar behoord het tot de rok-gezwellen, dan moet men, als het vogt is weggeloopt, den zak te niet doen, op dat het niet weder ontstaat (a).

§. I X.

Ongemakken van de Borst.

GOLLIUS (b) maakt gewag van een ander, uitwendig, aangeboren, ongemak, dat zeer zeldzaam voorkomt, en genoemd word eene aangebore keelbreuk (*Bronchocele* of liever *tracheocèle*). Het was namentlyk een zeer groot gezwel, met het welk een kind ter waereld kwam, en dat van het regter oor, en de regter wang, nederwaards hing tot de plaats, alwaar de borst en buik aan elkander raaken. Dat dit gezwel gemeenschap had met de lugt-pyp, en behoorde tot eene zeldzaame soort van keelbreuk, welke ontstond van de lugt, die uit de lugtpyp was gekomen, leerde de omtrek van het zelve, die grooter wierd by het inademen, en als het kind schreeuwde, en kleiner, als het den

(a) SMELLIE heeft gezien, dat 'er onder de tong ontstond een vlak gezwel, hebbende de gedaante van de tong, en zynde ontstaan door de drukking van de hand by het keeren van het kind. *Obs. T. 3. p. 467.* maar het verdween egter allengskens door 'er gerstenwater met honig op te streiken.

(b) *Act. med. Barol. Dec. 2. vol. VI. p. 70.*

den adem gaan liet, en niet schreeuwde; ja dan viel het gezwel zelfs toe (a).

De manier, op welke GOHLIUS de geneezing van dit ongemak zocht te bewerken, word niet beschreven, maar ik ben van gedagten, dat geefstryke, en zamentrekkende, stoovingen in zulk een geval in den beginne nuttig zouden zyn, dewyl door deeze de slapheid der deelen, welke maakt, dat de lugt des te eer in de eene, of andere, klier kan dringen, kan worden verholpen, en de natuurlyke veerkragt kan worden hersteld.

Hy verhaald ook den uitflag van dit gebrek niet; maar myne raad zoude zyn, dat men, in gevalle het gezwel al te groot mogt worden, in het zelve op verscheide plaatsen insnydingen maakte, ten einde de lugt eenen uitgang te verschaffen, en de tegen-natuurlyke opening in de lugtpyp te ontdekken, in welk geval men dezelve somtyds zoude kunnen tocheelen.

GOHLIUS maakt ook nog op de zelfde plaats gewag van een ander geval van eene aangebore keelbreuk, welke meer overeenkwam met de kropgezwollen, als zynde ontstaan van de klieren van den hals, die verstopt, en gezwollen, waren. Het schynt het best te zyn, dat men zulke gezwollen tot eenen meer gevorderden ouderdom zoo laat blyven, en dan kan men ze of tragten te ontbinden, of,

(a) Is dit de *bronchocèle ventosa* by SAUVAGES *Nof. T. I. p. 158?*

of, indien men hiermede zyn oogmerk niet kan bereiken, dan kan men ze wegneemen.

Aan de Borst komen weinige aangebore gebreken voor (a); alleen kan het misfchïen fomtyds gebeuren; dat de ribben, of het onderste gedeelte van het borstbeen, by het keeren ingedrukt worden, of door de kwaade legging van het kind in de baarmoeder, of een kwaad maakzel van den beginne af, reeds ingedrukt zyn.

In zulk een geval moet men zorgvuldig vermijden zoo de drukking met de handen, door welke de vroedvrouwen dit ongemak trachten te verbeteren, als het te styf zwagtelen; en, terwyl men het kind maar los zwagteld, moet men alles aan de hulp der Natuur overlaten, door welke dit ongemak fomtyds volkomen word hersteld; hoewel het egter nu en dan het geheele leven door byblyft, en eene mocijelyke ademhaling, en andere ongemakken, veroorzaakt (b).

Ik kan niet nalaaten, ter deezer plaats gewag te maaken van een ongemak, dat wel niet is aangeboren, maar egter terstond na de geboorte zich openbaard, bestaande in een gezwel, en daarop volgend

(a) STORCH maakt op de aangehaalde plaats T. I. p. 44. gewag van eene zonderlinge keel-breuk, of liever longe-breuk (*Pneumonocèle*), waargenomen by den oxel, in welke de lugt, door de ademhaling in de long gekomen, uit dezelve drong: deeze lyder stierf volwasfen zynde aan eene borst-waterzugt.

(b) SCHENK *obs.* I. 2. p. 295.

gend etter-gezwel, der borst; want het is eene bekende zaak, dat de borsten der pas geboore kinderen van byde sexen vervuld zyn met een weyagtig vogt, het welk men door drukking uit de tepels ontlafst; en dat sommige daar van hebben afgeleid het ontstaan van het water, in het Lamvlies bevat (*Liquor Amnii*). (a).

Veelen hebben, meenende, dat men het na de geboorte moet uitdrukken, het verzuim daarvan gehouden voor de oorzaak van deeze gezwellen, en beflote verzweringen; ook ontken ik niet, dat de borsten, door het stilstaan van dit vogt, kunnen zwellen, en dat in de zelve, door het bykomen van eene ontsteeking, een etter-gezwel kan worden geformeerd; maar ik vrees, dat alle deeze ongemakken dikwils moeten worden toegeschreven aan het al te styf zwagtelen, of aan eene ongeschikte, en al te sterke, uitdrukking van deeze wey. Men moet derhalven de borsten maar zagtjes drukken, of dit, het welk nog beter is, geheel nalaten, en zuigen de wey liever nit, bedekkende dezelve vervolgens met een zagt compres; maar, is 'er een etter-gezwel in ontstaan, dan bevordert men de etter-wording door verzagtende pappen, stoovingen, of pleisters, en, na het etter-gezwel geopend te hebben, geneest men het op de gewoone wyze.

§. X.

(a) *Comm. litt. Nor. a. 1734. p. 122.*

Ongemakken aan den Navel.

Nu gaan wy over tot den buik, en vooreerst zullen wy beschouwen dat gedeelte, het welk by eene vrugt van het grootste gewigt is, dog onnut aan een pas gebooren kind, dat ophoud een groeiend leven te leiden, maar tot een dierlyk leven is overgegaan, en daarom door de Natuur zelve, als ware het, word weggeworpen, en vernietigd, ik meen, den Navel-streng.

Deeze word eenige dagen na de geboorte afgezonderd ter plaatse, daar een gedeelte van het vel, en de opperhuid, in de gedaante van een ring, zynen wortel bekleed (a). Dit loopt by pas geboore kinderen, die nog niet hebben geschreeuwd, eenige lynen ver over den streng voort; maar, nadat zy geschreeuwd hebben, word het zoo veel naar agteren getrokken, dat het nauwlyks buiten den buik zich laat zien.

De streng vald, waar men ze ook mag gebonden hebben, altyd af op eene, en dezelfde, plaats; maar men is egter gewoon, denzelven een eind wegs van den buik af te binden, om, ingevalle de band mogt losgaan, eenen anderen, nader by deszelfs wortel, te kunnen aanleggen. Deeze band moet egter niet zoo dicht aan den buik gelegd worden, dat de bekleedselen, welke, gelyk gezegt is, een eind wegs over den streng voortloopen, in denzelven worden bevat, dewyl door het binden

van

(a) HALLER *Elem. Physiol.* vol. VIII. p. 216:

van dezelve het vuur ligt zoude kunnen ontstaan ; ook moet men het gedeelte van den navel-streng , dat dreigt af te vallen , maar nog een weinig aan den buik vast zit , niet met geweld afrukken , want daar door ontstaat gemeenlyk eene verzwearing , en daar word niet zelden door verwekt eene bloedstorting , welke nog door drukking , als welke ter dier plaatse niet kan geschieden , nog door de gewoone zamentrekkende middelen , als welke weinig nut aan brengen , kan gestuit worden , en uit dien hoofde meest altyd doodelyk is (a).

In zulk eene gevaarlyke omstandigheid legt LEVRET (b) op de wond een stukje eiken-zwam , en bevestigt dat door middel van een klevende pleister. Zy , die , wanneer de navel-streng is afgebroken , de bekleedselen toebinden , zyn oorzaak , dat het vuur ontstaat , en daarop de dood volgt (c). Het is eene zaak , van welke de uitslag onzeker is , de bloedstorting te keer te gaan door een brand-middel , gelyk DELEURYE (d) aanraad , dewyl de roef ligt afvalt , en 'er dan wederom ontstaat eene bloedstorting , welke men in het geheel niet kan stuiten ; uit deezen hoofde moet men ook den eiken-zwam boven deeze manier den voorkeur geven ,

(a) Somtyds komt het bloed slegts alleen met drop-pelen door de bekleedselen te voorschyn , en zulk eene bloedstorting is niet gevaarlyk. STORCH. I. IV. p. 28.

(b) *l'Art des acc.* p. 244.

(c) LA MOTTE L. V. p. 941.

(d) *Traité des acc.* p. 395. *malad. des enf.* p. 180.

ven ; maar , na het aanleggen van deezen , moet men egter nauwkeurig letten ; dat de kinderen niet te veel schreeuwen , en men moet ze niet baakeren , ten einde men des te nauwkeuriger hen zoude kunnen in agt neemen , en de drukking hun geene pyn verwekke.

Indien de ring , geformeerd door de bekleedselen , en peesagtige veezelen , den wortel van den navel-streng , en de vaten , daar zy uit het lighaam gaan , niet bekleed , gelyk somtyds gebeurt , dan vallen , door het schreeuwen van het kind de ingewanden buiten het lighaam , of daar ontstaat , ingevalle de streng word af-gezonderd , eene doodelyke bloedstorting , dewyl , van hoe sterke drukking men ook mag gebruik maaken , het bloed egter onder de bekleedselen word uitgestort.

Maar , gelyk 'er somtyds , wanneer de streng al te vroeg word afgescheiden , eene verzwearing ontstaat (a) , zoo word dezelve ook dikwils onzuiver , en daar doet zich in dezelve weelig vleesch op , ja veeltyds komt 'er het vuur by , dat men in het geheel niet kan bedwingen. De vroedvrouwen in Duitsland strooijen in deeze zweer tot poeder gestote

(a) Dit ontstaat ook uit de kwaade gewoonte der vroedvrouwen , om den navel na binnen te drukken. Men zie STORCH. I. IV. p. 30. , die ook gezien heeft , dat door deeze drukking inwendig eene verzwearing ontstaat. MAURICEAU maakt gewag van eene vleeschbreuk aan den navel , mischien hier door ontstaan , welke hy genas door afbinden *obs.* 634.

stote bladen van roode Roozen, of het zaad van de Wolfsklauw; maar andere bedienen zich van gepoederde aluin, die door zyne zamentrekkende kragt oorzaak is, dat 'er een lidteeken word geformeerd.

In gevalle het vuur schynt te zullen ontstaan, dan moet men verrotting tegengaande stovingen beproeven, hoewel deeze egter zelden voordeel aanbrengen; maar in eene verzwearing, welke niet te slim is, bereikt men zyn oogmerk met wondwater, en het niet al te styf aanhaalen der zwagtels; terwyl men het overige aan den tyd moet overlaten.

§. X I.

Verscheide soorten van gezwellen aan den Navel. Een gezwel in den Beneden Buik.

Die gezwellen aan den Navel, welke niet ontstaan van eene verzwearing, worden met den gemeenen naam van gezwellen, buiten den Navel zich opdoende, (*exomphali*) benoemd; en hier uit kunnen wy begrypen, dat 'er van dezelve onderscheide soorten zyn, dewyl het woord, waarmede zy worden aangeduid, zoo wel eene uitzakking der ingewanden, als eene breuk, beteekend.

De darmen vallen uit, of door dat het buik-vlies berst, en dan zyn zy blood, of zy worden door het zelve nog bedekt; maar egter dwalen niet zeer die

die geenen, die deeze foort tot de breuken reekenen; hoewel in eene eigentlyke breuk de navel, met de bekleedfelen bedekt, alleen gezwollen is.

Het is juist niet zeer raar, dat de darmen door een aangeboren gebrek bloed te voorschyn komen, en buiten het lighaam vallen door den Navel-ring. In zulk een geval beschuldigen de moeders de vroedvrouwen byna altyd onregtvaerdig, als hadden zy by de verlossing hiertoe gelegenheid gegeven door eene te ruwe behandeling; want MORGAGNI (a) heeft dit zelfde ongemak waargenomen by eene miskraam, in welke het ey ongeschonden met alle vliezen te voorschyn kwam, ook leerd het vastgroeijen van den Navel-ring met de buiten het lighaam gevallen darmen, gelyk doorgaans by zulke vrugten plaats heeft, dat het ongemak reeds in de baarmoeder is ontstaan: FRIED de Zoon heeft ook (b) beschreven zulk een kind, in het welk het buik-vlies, onder de bekleedfelen aan de darmen vastgegroeid zynde, eenen ring had geformeerd. Maar het gebeurde egter meer malen, dat ook andere deelen, by voorbeeld het Net, ja de Lever, Maag, milt, en andere ingewanden, in deeze uitzakking te gelyk met de darmen worden bevat.

Hoe

(a) *De Sed. & caus. morb. ep.* XLVIII. art. 53.

(b) *Diff. de fœtu, intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus*, Argent. 1760. vergelyk ook de aangehaalde *Diff.* van GEHLER. p. 15. FRIED haald pag. 6. meer soortgelyke voorbeelden aan, gelyk ook HALLER doet *Op. anat.* T. 3. p. 8. seq. en *Opusc. Patbol. obs.* 33.

Hoewel nu zulk eene uitzakking der ingewanden doorgaans is aangeboren, en dan mischien word verwekt door water, dat den buik van de vrugt uitspand, en den witten streep doet openbersten, ontstaat zy egter niet zelden, eenige dagen na de geboorte, door het afbreken van den navel-streng kort aan den buik (*a*), en zy is altyd vroeg of laat oorzaak van den dood; want zelden blyven zulke kinderen langer, dan vier en twintig uren, in het leven.

De tweede soort van uitzakking hebben wy gezegt te zyn zulk eene, in welke een gedeelte van het buikvlies, de darmen bekleedende, om dat door de eene of andere oorzaak de bekleedselen en de spieren van den buik ontbreken, te gelyk met dezelven uitzakt, zoo dat men de wormswyze beuewing der darmen, nog besloten in den ongeschonden zak van het buikvlies, duidelyk kan zien (*b*). MORGAGNI heeft in zulk eenen zak besloten gezien de Lever, welke in dat kind dubbeld was: het stierf, nadat het gezwel door het vuur was aangedaan, op den vyf en dertigsten dag na de geboorte. Hiertoe behoord ook zonder twyfel die soort van eene aangebore Navel-breuk, in welke de Lever bevat was, en die beschreven is in eene

(*a*) Men zie de voorgaande §.

(*b*) Men zie, behalven de hier boven aangehaalde schryvers, FRIED op de aangehaalde plaats p. 10. en het aangehaalde werk van MORGAGNI *op.* XLVIII. *art.* 54.

eene verhandeling te *Straasburg* verdedigd (a); in deze zag men de Lever, vastgegroeid aan het uitgezakte buik-vlies, de spieren wierden niet gevonden, en de bekleedselen waren zamengesrokken, en formeerden een ring, buiten welken dit gezwel, dat een pairsse kleur had, uitpuilde.

De derde soort van gezwollen aan den Navel is de *Navel-breuk* (*omphalocele*), welke, indien zy darmen bevat, genoemd word *enterocele umbilicalis* of *enteromphalus*, en van deeze vind men veele voorbeelden (b).

De breuken van deeze soort zyn of *aangeboren*, of zy ontstaan na de geboorte, en worden dan *verkrege* breuken genoemd. De aangeborene komen zeldzamer voor, de andere neemt men meer malen waar, en deeze moeten worden toegeschreven aan het al te sterk schreeuwen, en het verzuim van de drukking van den navel, die eenigzins uitpuild; maar zy kunnen bezwaarlyk worden toegeschreven aan de onkunde der vroedvrouwen, en het niet afbinden van den streng, of aan het te dicht afnyden van den zelve aan den buik (c); want de Navel-streng word, gelyk hier boven reeds is aange-merkt, altyd op dezelfde plaats afgezonderd, en het

(a) BUCHOLZ de *bepatomphalocele congenita*. *Argentor.* 1768.

(b) Men zie de aangehaalde schryvers, en daar ook boven HALLER *Elem. Physiol.* Tom. VIII. p. 216.

(c) Deeze dwaaling van het gemeen heeft reeds PUZOS wederlegt *Traite des Accouch.* p. 316.

het voorbeeld der Mooren, die men meend, dat door het nalaten van het afbinden van den streng, dikwils navel-breuken krygen, bewyft niets; dewyl flegts weinige Mooren met dit ongemak zyn bezogt, en het by hen ontftaat door het zwaar werk, het welk zy van hunne kindsheid af moeten verrigten (a).

Het natuurlyk lidteken van den Navel is doorgaans by eene groote Navel-breuk geplaatft aan de regter zyde, en dit ontftaat misfchien, door dat de kragt van de navel-ader en flagader van deeze zyde dit lidteken daar heen trekken.

Somtyds bevatten deeze breuken de Lever (b), maar egter meer malen het Net. Daar komen fomwylen ook voor Navel-breuken, welke het buikvlies niet omvat (c), maar by welke dit geberften is, zonder dat de bekleedfelen zyn befchadigt; hoewel ik egter zeer twyfel, of men ooit by jonge kinderen dit heeft waargenomen, daar het doorgaans door uitwendig geweld ontftaat.

Dewyl het peezig uitfpanfel der fpiereu, het welk den ring van den Navel maakt, vry fterk is, wykt het dikwils niet voor de darmen; maar eene breuk, welke

(a) Men zie CAMPER in de *Verhandelingen vande Hollandfche maatschappye der wetenfchappen te Haarlem* 7-Deel. pag. 363.

(b) *Hepatocele umbilicalis*. SAUVAGES *Nof. T. I.* p. 208.

(c) *Enterocoele Omphalorixis* SAUVAGES *Nof. T. I.* p. 200.

welke naaft denzelfven gelegen is, verdiend eer den naam van eene buik- dan navel-breuk.

Sommige breuken kan men met gemak binnen brengen, andere, te lang verzuimd zynde, worden geklemd, maar deeze klemming kan men egter by kinderen, welker lighaamen meer medegeeven, met gemak door verzagtende pappen, en clysteren, overwinnen.

Een ieder begrypt ook ligt, dat men voor onderscheide soorten van navel-breuken ook verschillende wegen ter geneezing moet inslaan.

Zyn de darmen buiten het lighaam bloed te voorschyn gekomen, dan zal men met voordeel gebruik maaken van lauwe melk, op de wyze van eene stoo-ving, of van het net van zoo even geflagte beesten; en verder moet men de darmen voorzigtig binnen brengen, en door middel van een verband op hunne plaats houden (a); hoewel zulke kinderen egter des niet tegenstaande doorgaans binnen korten tyd sterven. Zyn zy daar en tegen met het buik-vlies bekleed, dan moet men ze binnen brengen, en door middel van eene zachte drukking op hunne plaats houden, gelyk wy van eene waare breuk zoo aanstonds zullen zeggen (b); op zulk eene wyze is

(a) TREW raad aan de darmen door te snyden, en het bovenste einde aan de bekleedfelen vast te hegten, ten einde 'er een aars door de kunst worde geformeerd. *Comm. litt.* 1735. p. 91. Het komt my twyfelagtig voor, of dit zoude gelukken.

(b) Alle kinderen, aan welke RUYSCH dit ongemak heeft

A 3 2

is de breuk, welke de lever bevatte, en van welke hier boven is gewag gemaakt, binnen eene maand veel kleiner geworden; dog dit kind is egter aan eene andere ziekte gestorven (*a*).

Eene waare navel-breuk word in kinderen met zeer veel gemak geneezen (*b*). Indien zy aangeboren is, moet men den streng eenige lynen van het gezwel af binden, ten einde de band het buikvlies niet somtyds insluite, waar door, in gevalle de draad het doorsneed, de darmen bloed buiten het lighaam zouden vallen; daar in tegendeel, indien dit geheel blyvende, de darmen worden binnen gebragt, en aldaar door een verband worden gehouden, hetzelfde in den buik van zelfs te rug gaat. Daarna moet men het gezwel, of zoo 'er eene breuk ontstaan is, dezelve, na dat zy naar de kuint is binnen gebragt, binnen houden met een lood-plaatje, of met de helft van een rond stukje wasch, zoo groot als een muscaat-noot, of met traps-wyze druk-doeken, welke LEVRET (*c*) zoo aanlegt, dat het breedste van onder is, uit vrees, dat zy, anders

heeft waargenomen, zyn gestorven. Men zie zyne *obs. anat. Chir.* 71. p. 92., en hierom raad hy, dat men met een pleister, die niet al te sterk kleeft, het ongemak zoude tragten te verminderen.

(*a*) BUCHOLZ als boven.

(*b*) PARÉ beschryft droevige voorbeelden van Heelmeesters, die door dwaling zulke gezwollen hebben geopend. *L.* 23. c. 66. vergelyk MAURICEAU *T.* I. p. 497.

(*c*) *Traité des accouchemens* p. 246

ders aangelegt zynde, even als eene wigge, de opening van den ring, welke zy moeten zamendrukken, nog wyder zouden maaken. Na dat de compresfen aangelegt zyn, moet men het kind zwagtelzen, maar egter niet te ftyf, op dat het door de drukking niet beledigd worde. PAULUS ÆGINETA raad aan tot eene volkome geneezing, dat men de darmen binnen brenge, door de bekleedfelen draaden, door middel van naalden haale (*a*), en dezelve vervolgens afbinde, ook heeft MURALTO (*b*) een geval van eene op deeze wyze gelukkig te weeg gebragte geneezing, vallende na verloop van agt dagen het vel reeds af. Hiervan fchynt men egter geen gebruik gemaakt te hebben by tedere kinderen, en eene wel aangelegde zwagtelt zal het zelfde doen. TREW was ongelukkiger, in het behandelen van zulk een gezwel, welks aart hem onbekend was; hy bond het namentlyk af, en, gelyk men ligtelyk kan befluiten, het kind verloor zyn leeven (*c*).

Somtyds doet zich op eenig water in zulk een gezwel, welk ongemak men noemt *Exomphalus aqueus*, of *hydromphalus*, hoewel men zulk een ongemak zelden waarneemt, als wanneer zich eene darm-breuk in den navel, en teffens eene buikwaterzugt, zamenvoegen. Zulk een gezwel is zagt, en doorfchynend, in het zelve word men eene fchom-

(*a*) *Lib. VI. c. 51.*

(*b*) *M. N. C. Dec. 2. ann. 3. 164. vergelyk SAVIARD. obf. 9. en SCHARP Inquiry. p. 52.*

(*c*) Op de aangehaalde plaats.

A 2 §

schommeling gewaar, en men kan het niet binnen brengen. Geneest men de buik - waterzugt, het welk egter by kinderen zelden gelukt, dan verdwynt het ook van zelfs. Men moet derhalven de buikwaterzugt, door het gebruik van inwendige middelen, of, indien het niet anders mogelyk is, door het aftappen van het water, trachten te geneezen, of te verligten, hoewel het aftappen egter by tederen kinderen bezwaarlyk plaats zal hebben.

Het schynt my ook niet ongepast, ter deezer plaatse gewag te maaken van een ander ongemak, het welk somtyds de kinderen eenige dagen na de geboorte treft, en waarvan, voor zoo verre my bekend is, geen een Schryver iets heeft aangetekend.

Zy worden somtyds op den derden, of vierden, dag na hunne geboorte onrustig, en krygen koorts, ook word men teffens gewaar een hard gezwel, dat van het schaam-been af tot aan den navel voortgaat, den kinderen, op het aanraaken, zeer zwaare pyn verwekt, en niet zeer diep onder de huid gelegen is. De meeste, die met dit ongemak bezogt waren, zyn gestorven; maar, dewyl het den Geneesheeren, volgens werker waarneeming ik dit heb ter neer gesteld, tot hier toe niet heeft mogen gebeuren, om door de ontleding den aart van het ongemak te ontdekken, ben ik buiten staat, om met zeekerheid meer daarvan ter neder te stellen.

Ondertuschen behoort het voorzeker onder de ontstoke gezwellen, en het schynt zynen zetel te hebben

hebben in het buik-vlies, en in de spieren van den buik. De hardheid, welke dikwils in de lengte voortloopt, en aan het gevoel zich opdoet, even als koorden, geeft mogelyk te kennen eene ontsteking, ontstaan door verstopping der navel-flagaderen, in welk geval ik de schuld zoude leggen op het verzuim, om het bloed, by het binden van den streng, nit te drukken, wordende hetzelfde niet zelden verkeerdelyk na den buik toegedrukt (a). Zy, welke dit ongemak niet heeft in het graf gesleept, zyn behouden door lavementen, en door op den buik te leggen verzagtende stoovingen, en by den nagt soortgelyke pleisters.

§. X I I.

Aangebore Lies- en Balzaks-breuken.

De lies- en balzaks-breuken, welke zich of by de geboorte reeds opdoen, of kort na dezelve ontstaan, zyn wat zeldzamer, dan de ongemakken van den navel-streng. In dezelfen vind men doorgaans een gedeelte van een dunnen darm, en, in gevalle zy niet in de eerste kindsheid worden geneezen, blyven zy het geheele leven door. Zy worden van andere breuken vooral onderscheiden daardoor, dat de deelen, die in dezelfen befloten zyn, in gevalle men deeze breuken door de operatie tragt te geneezen, niet gevonden worden in eenen.

(a) Men zie §. I. not. b.

A a 4

nen byzonderen zak, maar by den bal zelfs (*a*). Men meende oudstyd, dat het buik-vlies dan waarlyk gebersten was (*b*), en daarvan is het woord *Breuk* ontstaan; en, dewyl de aangeborene breuken, van welke ik thans spreek, van latere schryvers voornamentlyk zyn behandeld, en in de meeste werken over de Heelkunde nog niet voldoende zyn beschreeven, agt ik het der moeite waardig, van dezelve ter deezer plaatse wat breedvoeriger te spreken.

By een ongeborn kind van het mannelyk geslacht, worden de ballen nog niet bevat in den bal-zak, maar zy leggen in den buik, en worden gevonden op de lenden-spiere, omkleed door het buik-vlies, gelyk de overige ingewanden van den buik. Van hen gaat tot aan het onderste gedeelte van den bal-zak een kegel-vormig canaal, geformeerd van het cel-agtig weeffel, afkomende van het cel-agtig weeffel van den bal-zak; maar in aart, en zamenstel verschillend van het overige: in dit canaal geeven sommige voor eenige vleesch-vezelen ontdekt te hebben.

HUN-

(*a*) Met zulk eene aangebore breuk is voorheen bezocht geweest de beroemde ZIMMERMANN, die eger in het laatst verlopen jaar te *Berlin* de operatie gelukkig ondergaan heeft, en volkomen geneezen is. Men zie MECKEL *de morbo hernioso congenito singulari & complicato, feliciter curato. Berol. 1772.*

(*b*) SCHARP *Inquiry. p. 39.*

HUNTER meend, dat door dit canaal de nederdaling van den bal bevorderd en bestuurd word; want, wanneer de tyd der geboorte naderd, gaat de bal naar beneden door den ring der buik-spiereu, zoo dat men denzelven by pas geboore kinderen, doorgaans in de lies, en zelden reeds in den balzak, vind. Deeze nederdaling, welke, indien 'er water stilstaat in de holligheid van den buik, wat eerder pleegt plaats te hebben, schryft HALLER toe aan de beweging van het middenrif (a). Maar dewyl deeze spier by een nog niet gebooren kind niet word bewogen, zoude ik dezelve liever toefchryven daaraan, dat de bal nederwaards getrokken word door het canaal, het zy dit ontftaa door deszelfs spier-vezelen, gelyk HUNTER wil, het zy het te weeg gebragt worde door de vereeniging van het canaal met het cel-agtig weeffel van den balzak, die zich in de laafte maanden der zwangerheid meer ontwikkeld.

Wanneer nu de bal nederzakt, voerd hy met zich het buik-vlies, dat hem omwind, zoodat dit formeerd een kegelvormig aanhangfel, van onderen gefloten door den bal, maar naar den buik toe open, zynde dus een canaal van den buik af tot in den balzak, in het welk men met gemak kan brengen een ftilet, dat de dikte van een lyn heeft.

Dit canaal word niet lang na de geboorte gefloten, en maakt, zich vafthegende aan den zaadftreng,

(c) *Opusc. anat.* op de zoo even aantehaale plaats.

A a 5

streng, den schedevormigen rok. Deeze vasthegting begint van boven by den ring der buik-spiieren, alwaar, als ware het, een klap-vlies, of eene halve maans-wyze vouw, voor deeze opening is geplaatst (*a*); maar van onderen, alwaar het rust op den opper-bal, groeit het niet toe, zoo dat de bal eenigzins los, en beweeglyk, binnen hetzelfde is.

Dikwils kan men dit geheele kanaal, zelfs by volwassene menschen, met gemak opblazen, gelyk ik zelfs dit aan beide zyden gezien heb in het lyk van eenen gehangenen; weshalven het te verwonderen is, dat de ontleedkundigen niet eerder ontdekt hebben den waaren oorsprong, en de natuur, van den schedevormigen rok.

Dewyl nu by het nederdalen van den bal, of kort daarna, de weg uit den buik na den bal-zak open is, gaan de darmen, en het net, niet zelden mede na beneden, en doen eene aangebore breuk ontstaan. Dit zoude egter nog meermalen plaats hebben, indien hiervoor niet eenigzins was gezorgd door de legging der ingewanden, van ongeboore kinderen, als zynde voor het grootste gedeelte in den omtrek der navel geplaatst, en gehegt aan een zeer kort darm-scheil.

Is de buik met water gevuld, dan ontstaat, als hetzelfde in den bal-zak nederdaald, eene waare aangebore water-breuk, welke verdwynt, wanneer de kinderen op den rug liggen, dewyl het water
als-

(*a*) MECKEL ter aangehaalder plaatse. p. 39.

alsdan te rug keerd door den weg, langs welken het is nedergedaald. Deeze is zonder twyfel de *pneumatocele* der ouden, of dat ongemak, aan het welk men doorgaans den naam van *Wind-breuk* geeft.

Blyft het canaal open, dan kan de bal, al is 'er ook geene breuk by, egter uit den balzak weder in den buik te rug keeren, en hiervan is het, dat men ook zulke voorbeelden aantrest.

By de meisjes vind men ook eene soortgelyke verlenging van het buik-vlies, welke egter nog minder is beschreven, en den ronden band der baarmoeder tot aan de lies verzeld, zynde, nadat zy by den ring der buik-spieren is toegegroeid, van binnen open, hoewel zy na de geboorte geflooten word, en eene holligheid doet ontstaan, welke NUCK genoemd heeft *diverticulum* (a). Dit canaal geeft zoo wel, als by de jongetjes, gelegenheid tot het ontstaan van lies-breuken, dewyl by de meisjes beneden den ring der buik-spieren ook gevonden word eene, door het cel-agtig weefsel geformeerde, schede, en hier van daan komt het, dat by pas geboore meisjes meer lies-breuken, en by volwasfe vrouwen meer dey-breuken, worden waargenomen, wat of LEVRET ook mag zeggen (b). Tot hiertoe heb ik egter nog geen voorbeeld van zulk eene aangebore breuk by een paster waereld gekomen meisje gezien; maar men word ze eerst na de geboorte gewaar. Dat in deeze verlenging zich

(a) *Adenograph.* p. 134.

(b) *Accouch.* p. 248.

zich ook by de meisjes kan opdoen eene soort van water-breuk , in gevalle zy niet overal vastgroeid aan den ronden band , doet my vermoeden eene waarneeming , onlangs op het theater der ontleedkunde te *Leipzig* genomen, in het lyk van eene oude vrouw , in het welk men even onder den ring der buik-spiieren eene blaas , gevuld met helder water (a), ontdekte.

Wat

(a) Het hier boven beschreven canaal heeft reeds *GALENUS Admin. anat. L. VI. c. 13.*, in mannen, en na hem *NUCK* op de aangehaalde plaats in vrouwen, hoewel onduidelijker, opgemerkt. *BIDLOO* heeft het van een man afgebeeld *Tab. XXII. f. 3. 4.*, en van dieren, vooral honden, hebben dit verscheide andere gedaan. *HALLER* is de eerste geweest, die de legging vanden bal in den buik nauwkeurig heeft beschreven, en aan hem was ook niet onbekend de oorzaak, uit welke de aangeborene breuken ontstaan. Men zie *Comm. litt. 1735. p. 105. a. 1737. p. 3.* en *progr. de bernis congenitis. a. 1749.*, het welk geplaatst is in zyne *Opusc. Pathol.* Door de zeer fraaije waarneemingen van *HALLER* aangespoord, heeft de beroemde *Londensche* Geneesheer *HUNTER* eene zeer nauwkeurige beschryving van het canaal, en de overige deelen, welke hiertoe behooren, aan de geleerde wereld medege-deeld. Men zie zyne *Medical Commentaries. Lond. 1762.*, welke beschryving de Heer *ARNAUD* ook geplaatst heeft in het eerste deel van zyn werk, getyeld *Memoires de Chirurgie Lond. 1768.* ook verdiend gelezen te worden het geen de Heer *CAMPER* geplaatst heeft in de *Verhandelingen der Maatsch. der Wetenschappen, te Haarlem. 6. Deel. p. 233. en 7. Deel. p. 58.*

Onder

Wat betreft de genees-wyze van de aangebore breuken; sommige doen niets, maar wagten, tot dat de kinderen ouder zyn geworden, wanneer zy eenen breuk-band aanleggen, welke men by tederre, en pas geboore, kinderen niet zoo wel kan gebruiken, zoo uit hoofde van den schielyken groei der deelen, als ook, van wegen de vuiligheid; Maar dewyl door het verzuim van dit ongemak zeer veele kwaade toevallen zouden kunnen ontstaan, en de geneezing hoe spoediger zy geschied, des te ligter kan worden te weeg gebragt, zoude ik geene zwaarigheid maaken, om het kind terstond een verband aan te doen, en dat des te meer, dewyl ik gezien heb, dat kinderen, die eene breuk hadden, zwak waren, en niet wel gevoed wierden, maar, na het geneezen van dezelve, veel beter

Onder de laatst waereldkundig gemaakte waarneemingen zyn de beste die van LOBSTEIN in *Diff. de hernia congenita, in qua intestinum in contactu testis est. Argent. 1771.* en van MECKEL in de aangehaalde verhandeling. Byna ter zelve tyd, dat HUNTER zyne waarneemingen aan zyne vrienden mededeelde, gaf de beroemde POTT ook uit een boekje over deeze aangebore breuken, tot tytel voerende *An account of a particular kind of rupture, frequently attendant upon new-born Children. &c. Lond. 1757.* uit welken hoofde 'er tuschen hem en HUNTER een verschil ontstond over den roem der uitvinding van dit ongemak. Maar men geeft dezelve egter met regt aan HUNTER, hoewel POTT deeze zaak met waarneemingen verder heeft bevestigd.

beter groeiden. Men legge dan traps-wyze compressen aan, op de wyze van LEVRET (§. 11.) by eene navel-breuk aangeraden, en men doe vervolgens een verband om, dat het lies-verband (*Spica inguinalis*) genoemd word, het welk men egter dikwils moet veranderen uit hoofde van de onzuiverheid, welke by kinderen niet kan vermeid worden, en intusschen houd men met de hand de darmen zagtjes tegen.

Wy gaan voorby het nut, dat voortvloed uit de nauwkeurige kennis van deeze aangebore breuken, by de geneezing in volwasfe menschen, wyzen de den Lezer na de hier boven aangepreze verhandeling van den Hoogleeraar LOBSTEIN.

§. X I I I.

Ongemakken van den Bal-zak, de Pissbuis, en de Roede.

Uit het geen in de voorgaande § gezegt is, meen ik, dat duidelyk genoeg blykt, dat de ballen uit den buik nederdalen, maar dewyl dezelve by pas geboore kinderen somtyds of in den buik, of in den ring der buik-spiereu, nog blyven zitten (*a*), moet men op alle wyzen letten, dat men ze niet drukke, in gevalle zy daar nog gevonden worden;

(*a*) SAUVAGES, en andere Schryvers, noemen dit ongemak, als ware het eene dwaaling van plaats, *Parorchidium*. *Nof. T. 1. p. 222.*

den; want, indien het kind, by voorbeeld, te styf gezwagteld word, krygt het ingevolge van zeer veele waarneemingen, zwaare pyn, daar ontstaat ontfteeking, en zelfs doet zich fomtyds eene vleeschbreuk op.

Neemt men derhalven by een pas gebooren kind een gezwel in de lies waar, dan moet men altyd onderzoeken, of de bal reeds is nedergezakt, of nog binnen den buik besloten is, en men moet de uiterste omzigtigheid aanwenden, dat men een gezwel, door eenen bal verwekt, niet verwarre met eene breuk, of met eenig ander ontfoken gezwel, dat tot ettering moet gebragt worden.

Blyft de bal zitten in den ring, dan raad LÉVRET (a) aan, dat men ze met eenen vinger daaruit haale, of liever na beneden drukke, terwyl men het kind teffens aanzet, om te schreeuwen, ten einde de bal hierdoor na beneden zakke; maar, wat my betreft, ik zoude dit, uit hoofde van het gevaar, aan het welk de lyder door de pyn, en de toeneeming van het gezwel, zoude worden bloedgesteld, niet ligt verrigten, maar liever gebruik

(a) *L'art des accouch.* p. 247. Hy wil ook, dat men, al vind men reeds twee ballen in den bal-zak, zal onderzoeken, of 'er ook fomtyds een derde in den ring word opgehouden; maar, dewyl menschen met drie ballen, indien zy ooit gevonden worden, ten minsten zeer zeldzaam voorkomen, meen ik, dat deeze omzigtigheid niet zeer noodzaakelyk is.

gebruik maaken van weekmakende stoovingen, en plicifers (a), op dat de bal, door het verslappen van den ring, allengskens door het canaal neder daalen zoude.

De teel-deelen kunnen in alle verlosfingen, maar vooral wanneer het kind met de voeten voorkomt, of wanneer de billen voorkomen, te veel gedrukt, en door onkundige vroedvrouwen kwalijk behandeld worden, zoo dat daardoor ontstaan harde gezwellen, die niet zelden tot verettering overgaan. In zulk een geval moet men gebruik maaken van verdeelende kruiden in wyn gekookt, welke ook nuttig zyn in harde gezwellen der ballen, als ook van drooge zakjes, gevuld met Camillen- en Meliloten-bloemen, en een weinig campher.

By pas geboore kinderen neemt men tweërley foort van Water-breuk waar. In de eene foort, welke de onegte genoemd word, is het geheele celagtig weeffel van den bal-zak met water gevuld; en daardoor gezwollen, welk ongemak veeltyds in een meerder, of minder, graad reeds by de geboorte zich doet zien (b), of allengskens ontstaat na de geboorte, en van het welk sommige als oorzaak

(a) LOBSTEIN *l. c. p. 20.*

(b) Dikwils is de bal-zak aanstonds na de geboorte gezwollen, zonder dat 'er eenig kwaad op volgt; my is bekend een geslagt, in het welk de jongetjes, zoo dra zy geboren worden, een zeer sterk gezwollen bal-zak hebben; maar deeze zwelling verdwynt allengskens weder, zonder het gebruik van eenig middel.

zaak opgeeven, dat het wateragtig vogt door het sterk schreeuwen belet word terug keeren, zoo dat Puzos (a) zegt, dat zulk eene water-breuk door het veranderen van minne is verdweenen. De andere soort, of de waare water-breuk, ontstaat door water, verzameld in het hier boven beschreven, kanaal van het buikvlies.

Ter geneezing van de eerste soort, welke dikwils van zelfs, als het kind ouder word, verdwynt, zyn nuttig stoovingen, vervaardigd van zamentrekkende kruiden, in wyn gekookt, of afkookzels van bittere kruiden, of stoovingen, bestaande uit gelyke deelen van kalk-water, en brandewyn. In de tweede soort van water-breuk is het somtyds goed, het kind op den rug te leggen, namentlyk in gevalle het kanaal van het buikvlies nog niet is toegroeid, want dan gaat dus het water uit dit kanaal weder in den buik, alwaar het ligter word opgeslorpt; en hoewel men op deeze wyze slegts voor een oogenblik hulp aanbrengt, word egter de volkome geneezing daardoor geholpen, indien men zich ondertuschen van drukking, en zamentrekken- de middelen bediend.

Hier boven (pag. 379.) hebben wy reeds gezegt, dat eene wind-breuk en deeze water-breuk een en het zelfde ongemak zyn, en dit kan men ook besluiten uit de manier, op welke dezelve, volgens het getuigenis van veele schryvers, geneezen is, want dit is van alle uitgewerkt door de aangepreeze legging

van

(a) Als boven p. 317.

II. DEEL.

B b

van het kind, en door middel van verdeelende, en zamentrekkende, stoovingen.

Maar, indien, door het verzuim van de middelen ter geneezing, in het onderste gedeelte van het canaal eene waare water-breuk overgebleven is, moet men, als de kinderen wat ouder zyn geworden, door de doorbooring het water ontlasten, en vervolgens zich bedienen van uitwendige versterkende middelen; of, in gevalle het gezwel zich weder opdoet, de kanten van deezen tegen-natuurlyken zak door insnyding, of brand-middelen, tot ettering brengen, en dus maaken, dat de vliezen van den schedevormigen rok aan elkander groeijen, op dat 'er niet weder buiten de vaten water zoude kunnen worden uitgestort.

De roede is by veele kinderen, als zy geboren worden, op onderscheide wyzen, kwalyk gesteld. Voor eerst kan de voorhuid al te ver voor het hoofd der roede uitsteeken, of aan het zelve vastgegroeid zyn. Kinderen op de eerstgenoemde wyze geschapen, maaken met moeite hun water, en dat geen, dat van het zelve tusschen het hoofd der roede, en de voorhuid, blyft staan, geeft somtyds gelegenheid tot het formeeren van steentjes; in welk geval men de besnyding moet beproeven (*a*), of ingevalle men niets van dien aart waarneemt, moet men dezelve tot eenen meer gevorderden onderdom uitstellen. (*b*); maar indien, door het toegroeijen

van

(*a*) Vergelyk SCHENK. *Obs.* 525.

(*b*) DIONIS *cours de Chirurg.* in de uitgaaf van LA FAYE Tom. I. p. 265.

van de voorhuid, de opening geheel gesloten word, moet men door eene insnyding den weg openen. Ten Tweede is hy pas geboore kinderen de voorhuid, en het hoofd der roede, niet zelden zeer gezwollen, vertoonende, als ware het, eene heldere blaas; en deeze soort van *Phimosis* is of een waterzugtig gezwel, ontstaande uit de drukking der deelen, of uit eene algemeene waterzugt tussehen vel en vleesch, of uit eene al te groote vergadering van die smeeragtige stoffe, welke aan den wortel van het hoofd der roede word afgescheiden, tussehen de voorhuid en het hoofd der roede.

Deeze, alleen in de oorzaak, uit welke zy ontstaan, verschillende, soorten kan men gemakkelyk onderscheiden; want ontstaat dit ongemak door waterzugt, dan begint het van het onderste gedeelte van de roede, maar komt het voort van de smeeragtige stoffe, dan begint het van der zelve punt (a); het eerste word door zakjes, gevuld met verdeelende kruiden, en door het inneemen van een zagt buik-zuiverend middel, en den zee-ajuinshonig-azyn, verminderd, en volkomen geneezen door het wegneemen van de ziekte, uit welke het ontstond; maar het laatste geneest men door het wegdoen van de smeeragtige stoffe met een stilet; ook doen dit de minnen door middel van het zuigen aan het hoofd der roede.

Wy hebben gezegt, dat de pis door deeze ongemak-

(a) LEVRET *l'art des acc. p.* 249. DELEURYE *malad. des enf. p.* 186.

gemakken dikwils word opgehouden, maar dit is nog veel gevaarlyker, indien het ontstaat, door dat de pis-buis verstopt is; want gelyk, indien der zelve opening door slym, gelyk somtyds gebeurt, verstopt word, de pis, na het inbrengen van een stilet, en het wegdoen van het beletzel, aanstonds word ontlast, zoo doen zich ook op andere gevallen, ter welker hulp men veel meer moeite moet aanwenden; by voorbeeld het gebeurt somtyds, dat de pis-buis van pas geboore kinderen, of alleen van vooren, of een eindwegs verre, zoo is zamengegroeid (a), dat door de belette ontlasting van het water, indien niet een Heelmeeester zeer ras hulp tragt aan te brengen, de dood noodwendig volgen moct.

Somtyds baand zich egter de Natuur eenen weg door het pis-vat (*urachus*), het welk zy in den navel opend (b), en zelfs heeft men verscheide voorbeelden van zulke kinderen, welke tot jaaren van onderscheid gekomen zyn, en deezen weg altoos open hebben gehouden.

Is de opening der pis-buis wel klein, maar egter open, dan moet men dezelve door een stukje van het merg van een takje van de vlier, of eene spons, of, dat nog beter is, door middel van dunne waschkaarsjes (*bougies*) allengskens wyder maaken: hoewel andere egter ook in zulk een geval de natuurlyke ope-

(a) HALLER *Opusc. Anat. T. 3. p. 35.*

(b) Voorbeelden van een openen *urachus* vind men by HALLER. *Elem. Phys. T. VIII. p. 313.*

opening door middel van een dun mesje, na beide zyden verwyden (*a*). Word zy van vooren alleen met een dun vlies gefloten, dan moet men het zelve doorsnyden, en de opening open houden door middel van een steek-wiek, van zagt plukzel gemaakt, met olie doortrokken, en aan een draad bevestigd; of met een wasch-kaarsje (*b*). HEISTER meend, dat tot de doorbooring het best geschikt is zulk een naald, als men gebruikt by de operatie op de *cataracta* (*c*), of een mesje; maar, in gevalle het vlies dikker is, maakt hy gebruik van een *troisquart*.

Indien het hoofd der roede van vooren niet is doorboord, vind men egter fomtyds in het zelve ergens elders eene opening, of aan den wortel van het toompje, of nog wat verder naar agteren by het *perinaeum*, door welke de pis wegloopt. Sommige raaden (*d*), dat men deeze tegennatuurlyke opening moet laten blyven, voorgeevende, dat menschen, met dit ongemak bezogt, zelfs in staat zyn, om kinderen voort te teelen (*e*); maar eg-
ter

(*a*) DIONIS als boven. *p.* 269.

(*b*) Sommige steeken 'er een pypje in, maar dit is even wynig, als de steek-wieken, nodig, dewyl door het weglloopen der pis de weg word open gehouden, en men zelfs van steek-wieken, van wegen de kleinheid der roede, niet wel gebruik kan maaken.

(*c*) *Chirurg. T. 2. p.* 818.

(*d*) PAULI in *annot. ad HORNII microtechn. p.* 460.

(*e*) HEISTER op de aangehaalde plaats. CAMPER

B b 3

in

ter zyn de meeste van een ander gevoelen, en, dewyl het eene zonderlinge afwyking van de natuur is, dunkt my, dat de Heelmeesters zich wel mogen toelleggen, om dit ongemak te verbeteren. Men zoude, by voorbeeld, door deeze tegen-natuurlyke opening kunnen binnen brengen een stilet, het zelve naar vooren toe keeren, en vervolgens op het zelve ter plaats, daar natuurlyker wyze eene opening pleegd te zyn, het hoofd der roede openen; of indien de pis-buis niet door het hoofd der roede voortgaat, zoude men met een *troisquart* een nieuw kanaal kunnen maaken; het welk men dan of door steek-wieken, of, gelyk DIONIS wil, door middel van een pypje, moet open houden, en dit pypje moet zoo lang zyn, dat het verder voortgaat, dan de plaats, alwaar de tegennatuurlyke opening zich bevind. MERCURIALIS doorboorde op eene wreede wyze het hoofd der roede met een rond, en gloeiend, yzer, om de bloedstorting voor te komen, en het eeld van het nieuwe kanaal harder te maaken (a); maar deeze manier zal tegenwoordig niemand navolgen.

Nadat men een nieuw kanaal gemaakt heeft, moet men de opening, welke de natuur op eene vreemde plaats had gesformeerd, door de kunst geneezen. Dit tragten sommige te doen met brandmiddelen, met welke zy der zelve vereelde randen

ver-

in de *Verband. der maatsch. te Haarl* 7. Deel. p. 369.

(a) *De morb. guer. L. 1 cap. 9.*

verteeren (a); maar de beroemde mannen DIONIS en HEISTER scarificeren dezelve, en deeze manier bevald my beter, dewyl door de brand-middelen fomtyds eene zeer zwaare ontsteeking word verwekt. Sommige hegten de kanten door een bloedigen naad, maar, daar eene drooge hegting voldoende is, is dit onnodig. De oude meenden, dat men in dit geval het hoofd der roede moest afzetten (b); andere sneden het zelve geheel in de lengte door, ten einde de pis, en het zaad; vooruit zouden ontlafst worden; maar ik meen, dat men dit beide moet verwerpen.

Kinderen, welker pis-buis in het geheel niet doorboord is, moeten, gelyk hier boven is gezegt, zeeker sterven, indien het pis-vat niet open is, of de pis-buis zich ontlafst in den endel-darm. In zulk een geval heeft de pis, vergaderd ter plaatse, daar wy gezegt hebben, dat zy dikwils door eene tegen-natuurlyke opening ontlafst word, fomtyds een gezwel doen ontstaan, en dit moet men dan, dewyl een twyfelagtig middel beter is, als in het geheel

(a) BARTENSTEIN *de morbis infantum recens nator.* Argent. 1701. pag. 11.

(b) PAULUS ÆGINETA *L. VI. cap. 54.* Nadat men het mensch heeft agter over gelegd, moet men het hoofd der roede tuschen de vingers van de linker hand neemen, en sterk na zich toehaalen, vervolgens moet men het met een mesje aan zynen ondersten rand affnyden, en dat niet schuins, maar zoo, dat in het midden eene bolle rondheid, even als het hoofd der roede, uitsteke.

Bb 4

geheel geen, doorboren, ten einde het leven van het kind te behouden, al blyft 'er dan eene tegen-natuurlyke opening over. HEISTER heeft wel zyne gedagten laten gaan over de doorbooring van de blaas in den bilnaad, maar hy zegt nothans, dat hy deeze operatie in dit geval nooit in het werk heeft gesteld, en my is geen voorbeeld van eenig ander Heelmeester, die dit verrigt heeft, bekend.

§. X I V.

Sluiting van de Teel-deelen der meisjes. Een gesloten Aars.

De teeldeelen der meisjes worden somtyds niet minder, dan die der jongetjes, kort na de geboorte door ongemakken aangedaan.

De lippen der teel-deelen, en de schede, zyn by voorbeeld somtyds ontfoken, en verzworen; en, in gevalle dit ontstaan is door kneuzing, of belediging, van deeze deelen, dan word de geneezing doorgaans binnen korten tyd door stoovingen te weeg gebragt; maar indien zulk eene oorzaak niet is voorafgegaan, dan moet men onderzoeken, of de verzwearing ook somtyds ontstaat door de scherpte van die slym, welke deeze deelen, en de pis-wegen, natuurlyker wyze, bekleed: en in zulk een geval ziet men veel nut van dezelve dikwils te wasfen met lauw water, en van het gebruik van zachte opdroogende middelen.

Wanneer zulke zweeren by meisjes, of byna voortgelyke ongemakken by de jongetjes, uit een over-

overgeërfd Venus-smet zyn ontstaan, of door eene besmette minne zyn medegedeeld, dan moet men voorzigtig, volgens de regelen der kunst, kwikmiddelen ingeeven, maar des onaangezien kan men niet ontkennen, dat de meeste van zulke kinderen ellendig omkomen.

Eindelyk, gelyk by de jongetjes de pis-buis op onderscheide wyzen toegroeid, zoo neemt men ook by de meisjes waar, dat de teel-deelen zamen-groeijen, en zulke noemd men doorgaans *gestotene (atreta)*.

Van dit ongemak heeft men onderscheide voorten, en trappen, gezien.

Dus bespeurd men somtyds voor eerst, dat de geheele opening der teel-deelen zoo is toegegroeid, dat in 't geheel geene pis kan ontlafst worden, en men slegts alleen ontdekt eene groef, aanduidende de plaats, alwaar de opening der teel-deelen zich moest vertoonen, en in dit geval word dit gebrek doorgaans geholpen door eene insnyding, volgens den loop van deeze groef gedaan.

Sommige zyn van gevoelen, dat het beter is, dat men deeze operatie niet, als na verloop van eenige dagen na de geboorte verrigt, meenende, dat de pis, die opgehouden word, door het uitzetten der deelen, welke moeten doorgesneden worden, den weg beter aan het mes wyzen zal; dog, opdat men, door het hulpeloos laten van het kind, geene gelegenheid geeve tot zwaarer toevallen, moet men deeze geringe, en, indien zy met de

vereischte omzigtigheid word ondernomen, geheel niet gevaarlyke, operatie niet uitstellen (a).

Een weinig anders is het met de zaak gelegen, indien men wel vind eene opening der pis-buis, maar deeze egter zoo groot niet is, dat door dezelve al de pis kan worden ontlaf, waardoor dan ook volgt, dat zy, vergaderd zynde agter het vlies, het welk dezelve gedeeltelyk fluit, leelyke ontvelingen verwekt, ja zelfs fomtyds den endel-darm beschadigt (b). Men moet derhalven ook in dit geval de operatie niet uitstellen, maar ze integendeel verrigten, zoo dra men dit ongemak bespeurd. Men brengt ten dien einde eene holle sonde in de overgebleve opening, en volgens derzelver leiding snyd men met een mesje het vlies zoo na boven, als beneden, door; dog zoo, dat men zorg draagd nog de blaas, nog den endel-darm te beschadigen, dewyl het een ieder bekend is, dat wonden van deeze deelen gevaarlyk zyn.

De derde soort van toegroeijing heeft dan plaats, als de schede wel maar alleen door het maagden-vlies gesloten is, maar de pis-buis door een tegen-natuurlyk dik vlies geheel is verstopt. Dit ongemak kend men gemakkelyk daardoor, dat de pis, hoezeer de schede open is, egter niet word ontlaf, en men

(a) *DIONIS operat. de Chirurg.* met de aanmerkingen van LA FAYE *Tom. 1. p. 272*, die daar toe gebruikt een mesje of *troisquart*.

(b) *Miscel. N. C. Dec. 1. ann. 3. obs. 124.*

men, door het inbrengen zelfs van een zeer dun sfi-let, egter geenen weg voor de pis kan ontdekken. Zulk een vlies kan men zonder ongemak met eenen zeer dunnen driekanten naald doorbooren. HEISTER verhaald (*a*), dat CABROLIUS (*b*) zulk een meisje, dat tot haar twintigste jaar toe, de pis door het pis-vat was kwyt geworden, door het doorhyden van het vlies, dat de pis-buis sloot, zoo had geneezen, dat hy een uitsteeksel, gelykende na den kam, of bek, van een kalkoenschen Haan, ter lengte van vier duimen buiten den navel hangende, afbond, en de plaats vervolgens brande, waarop zich de wond binnen twaalf dagen met een lidteken sloot.

Is de pis-buis open, maar de spleet in het maagden-vlies geheel gesloten, dan is het veiliger, dat men de operatie tot den tyd, dat de maandstonden zich opdoen, uitsstelle, op dat men de bygelege deelen, welke in zeer jonge kinderen ligt kunnen gekwetst worden, niet beledige. Wanneer de maandstonden op handen zyn, dan duiden de toevallen, welke gewoonlyk ontstaan, als zy niet worden ontlast, en eene zachte zwelling, verwekt door het bloed, dat agter het gesloten maagden-vlies stil staat, den aart aan van dit ongemak, het welk men, volgens de leer van byna alle Heelkundige Schryvers, moet geneezen door eene insnyding, welke of in de lengte, of kruis-wyze moet

(*a*) *Chirurg. T. 2. p. 954.*

(*b*) *Observ. anat. XX.*

moet worden in het werk gesteld, en deeze operatie word dan ook veeltyds met eenen gelukkigen uitflag bekroond.

Het maagden-vlies kan daarenboven wel doorboord zyn, maar teffens zoo dik weezen, dat in het byslaapen het zaad niet tot de baarmoeder komen kan, en dus de vrouw niet bevrugt kan worden, of, in gevalle, zonder dat het maagden-vlies word gescheurd, de vrouw wezentlyk zwanger word, (a), zy egter niet kan verlossen. Indien in den gehuwden staat daardoor eenig beletzel word geboren, moet men het door eene langwerpige, of kruis-wyze, insnyding wegneemen (b); maar zoo dezelve eerst by de verlossing word vereischt, dan moet zy gedaan worden op die wyze, welke word voorgeschreven in de werken, die over de vroedkunde handelen (c).

Men vind ook voorbeelden van een dubbeld maagden - vlies, waarvan een laag, en het ander wat hooger, was gelegen.

Zulk eene toegroeijing der schede, en teel-deelen,

(a) Vergelyk BOEHMERI *progr. de naturalibus feminaram clausis. Viteb. 1768. p. 6.*

(b) CELSUS *L. VIII. p. 29.* vergelyk DIONIS als boven, en HEISTER *Tom. 2. p. 953. seq.* HILDANUS *Cent. 3. obs. 61.* deed de insnyding op eene holle fonde.

(c) Vergelyk ook WEISII *Diff. Historia partus impediti, ex membrana tendinosa, os uteri internum arctante. Alt. 1761.* RUYSCH *Observ. anat. Cent. obs. 22.* BOEHMER als boven *p. 8. seq.*

len, als niet zelden na eene moeiljelyke verlossing ontstaat, waneer namentlyk de zyden der schede, door de eene, of andere, oorzaak onder de verlossing gekwetst, en verzworen, zynde, zamen-groeijen, behoeft hier even min, als derzelver geneezing, behandeld te worden.

Het is ten laatste een zeer gevaarlyk, en geheel ongeneeslyk, ongemak, als de schede by pas geboore meisjes of geheel is toegegroeid, of zy van dezelve geheel zyn beroofd; in zulk een geval volgt 'er, na het verrigten der operatie geen bloed, maar de dood (a).

Ik gaa met stilzwygen voorby zulke tegen-natuurlyke gevallen, in welke by voorbeeld de schede zich opend in den endel-darm, of op eene verkeerde plaats van den buik, dewyl ter verbetering van dezelve in de Heelkunde geene hulp bekend is.

Gelyk de teel-deelen, en pis-wegen, fomtyds gesloten zyn, zoo word ook nu en dan by pas geboore kinderen of de aars gesloten waargenomen, of fomtyds ontbreekt deszelfs opening geheel, en dan ontstaan 'er nog gevaarlyker toevallen door den zwarten drek, die binnen de darmen word opgehouden; want de buik zweld op, word opgespannen, en verwekt veel ongemak; waarop volgen scherpe pyn, en braakingen, ontsteeking, enkoorts, en, indien

(a) Vergelyk DE HAEN *Rat. med.* T. VI. p. 53. seq.

dien men geen hulp aanbrengt, de dood, doorgaans binnen zeven dagen (a).

Deeze toefluiting van den aars is even, als de belette pis-ontlasting, en de fluiting der deel-deelen, onderscheiden in soort. De eerste heeft dan plaats, als de darm, samengetrokken zynde, de afgang niet naar behooren, maar als ware het slechts drop-pels-wyze, doorlaat. In zulk een geval zag ROONHUYSEN (b) een gezwel by den aars, het welk zonder twyfel ontstaan was door de drukking, en maakte, dat het kind geheel verstopt was. Dan is het mischien nuttig, dat men dikwils verzagende clysteeren zet, en in den endel-darm voorzigtig wasch-kaarsjes brengt, zeer omzigtig lettende, dat men het kind, als het zich beweegd, geen nadeel aanbrengt. SCHULTETUS (c), die in een soortge-lyk geval aanraadde, den samengetrokken endel-darm door insnyding wyder te maaken, heeft den-zelven egter ook zonder mes zeer wel wyder gemaakt door een stukje van een gentiaan-wortel daarin te steeken; en ROONHUYSEN, die den aars met een lancet opende, verwydde de insnyding aan beide zyden met eene schaar, en genas de wond na behooren (d); maar dewyl my het doorsnyden van den vereel-

(a) Deeze is de ziekte, welke SAUVAGES noemd *ileus imperforatorum*. *Nof. T. 2. p. 349.* vergelyk HEISTER. *Chir. T. 2. p. 1040.*

(b) *App. observ. P. 2. obs. 1.*

(c) *Armament. obs. 71.*

(d) Vergelyk HEISTER *Tom. 2. p. 1043.*

vereelden endel-darm zeer gevaarlyk toefchynt, zoude ik liever steek-wieken, of wasch-kaarsjes aanraden te gebruiken. My zyn ook bekend voorbeelden van gevallen van deezen aart, welke zoo zwaar waren, dat men geen clysteer kon zetten, of hetzelfde, nadat het was binnen gebragt, door dat de darm wat hooger was samengetrokken, weder wegliep; en egter zyn deeze ongemakken na verloop van eenigen tyd van zelfs verdweenen.

De zaak is nog moeiljeker te verhelpen, in gevalle de endel-darm zelfs volkomen gesloten schynt te zyn, en dit kan weder op verscheide wyzen geschieden. Want indien de darm door een dun vlies aan zyn einde gesloten is (*a*), moet men denzelven door eene insnyding openen, en deeze maaken sommige in de lengte, andere kruis-wyze; LEVRET raad met regt, dat men dezelve in het ronde ver- rigte (*b*), dewyl de doorgesneede lippen der wond door de daarop volgende ettering dog altyd verloren gaan, en deeze opening dus terstond eene natuurlyke gedaante krygt.

Sommigen brengen, nadat de insnyding gedaan is, den vinger in den endel-darm, en voelen, of de weg open is; maar, dewyl hierdoor van wegens de natuwheid der wegen aan het kind zeer zwaare pyn

(*a*) AETIUS slootte het met een vinger door. *Lib. VI. cap. 81.*

(*b*) *L'art des acc. p. 235.* SCHULTETUS heeft deeze operatie ook afgebeeld. *Armament. tab. XLI. fig. 6. edit. Ulm. 1655.*

pyn word verwekt, agt ik het beter, dat men van een wasch-kaarsje, of een fileet, gebruik maake; terwyl het ontlasten van den zwarten drek het beste teeken is, dat de weg is geopend; en, geschied deeze ontlasting niet na behooren, dan moet men ze door het zetten van een zagt lavement te hulp komen; vervolgens moet men, nadat de zwarte drek volkomen is ontlast, eene steek-wiek binnen brengen, en deeze telkens, nadat het kind is afgeweest, vernieuwen. HILDANUS (a) is, na myne gedagten, al te zorgvuldig geweest, toen hy een lood pypje, met een opdroogende zalf bestreken, binnen bragt; want de afgang kan niet wel door het pypje ontlast worden, en de wond word door de natuur van zelfs geneezen. Tot het verband bediend men zich het best van een compres, na de plaats geschikt, en van het verband, dat de gedaant van de letter T heeft.

Somtyds is het vliesje, dat den darm sluit, hooger in het darm-canaal geplaatst, en in zulk een geval is het moeilijker, en gevaarlyker, hetzelfde met een mesje te openen, maar men kan het beter, en veiliger, doorbooren met een *troisquart*, of *pharingotomus*. De Heelmeeesters moeten egter vooral letten, dat zy de zyden van den darm, of eenige bygeleege deelen, niet kwetzen, by het doen van deeze insnyding.

De opening van den darm word somtyds ook zoo gefloten met een dikker vlies, onder het welk moge-

(a) *Cens. 1. obs. 73.*

mogelyk eenig cel-agtig weeffel is gelegen, dat men met het oog geen blyk van den aars kan ontwaar worden; en uit dien hoofde is ook moeilijker te ontdekken de plaats, welke men moet doorsnyden; maar egter kan men nog al vry duidelyk dezelve erkennen door eene pairsche zwelling, en eene zachte schommeling, welke medegeeft, als men met den vinger daar op drukt, maar wederkomt, na het te rug trekken van denzelven. Als men derhalven door de opgegeeve teekenen de plaats ontdekt heeft, moet men op de meer maalen gezegde wyze dezelve openen.

Oudstyds waren de vroedvrouwen te *Padua* gewoon (a), den tegen-natuurlyk toegegroeyden aars slegts met een naald te openen, en deeze opening door middel van een stuk van een Gentiaanwortel wyder te maaken; welke manier, om langzamerhand eene opening te maaken, dan aan het bedoelde oogmerk schynt te beantwoorden, als dikke vliezen, en het celagtig weeffel, den aars sluiten; maar, als zulke vliezen zich niet by de opening van den aars, maar wat hooger in het darmcanaal, opdoen, dan is het veel beter, dat men zich van een *troisquart*, of allerbest dat men zich van een *pharingotomus*, bediend, even als hier boven is aangeraden, zeer omzigtig lettende, dat men de vliezen van den darm niet kwetze.

Dit ongemak is nog veel erger, indien de opening van den endel-darm niet, volgens gewoonte,
in

(a) SCHULTET. *obs.* 77.

II. DEEL.

C 6

in den bilnaad voor het staart-beentje, maar ergens elders, word gevonden. Van deezen aart vind men zeer veele voorbeelden, hebbende men somtyds in de roede, in den navel (*a*), in de blaas (*b*), of in de schede (*c*), dezelve ontdekt. In gevalle deeze darm zich opend in de blaas, of de roede, maakt de dood noodwendig een einde van dit ongemak (*d*), dewyl langs deezen weg de afgang niet kan worden ontlast, en het vuur een noodzaakelyk gevolg hiervan is: opend hy zich in de schede, dan loopen de lyderessen wel niet zulk een groot levens-gevaar, maar met dit ongemak blyven zy egter al haar leven lang bezogt, dewyl er geen middel, om haar hulp toe te brengen, bekend is.

Somtyds eindigt de Endel-darm by het hylig been in een blinden zak, en word, als ware het, gesloten met een knoop, van welken tot aan den aars een toegegroeid canaal, naar een touwtje gelykende, nederdaald. Men onderscheid dit ongemak van het voorgaande daardoor, dat in het eerst gemelde de drek, zich op eene vreemde plaats ont-

(*a*) HALLER *Opusc. T. 3. p. 25.* SCHENCK *Obs. lib. IV. p. 527.*

(*b*) HILDAN. *Cent. 1. Obs. 75.*

(*c*) MAURICEAU *P. 1. L. 3. c. 29.* STORCH *kin-der-krankheiten. T. 1. p. 179.* SCHENCK *als boven L. 3. p. 392.*

(*d*) Dit gebeurde op den elfden dag in het geval, dat SCHENCK vermeld op de aangehaalde plaats.

lastende , te kennen geeft de plaats , alwaar de aars tegen-natuurlyk geopend is , welk teeken hier geheel ontbreekt. Maar indien egter een Heelmeester , onkundig van de plaats , alwaar zich de Endel-darm opend , in zulk een geval eerst ontdekte na het doen der operatie , dat hy in de blaas by voorbeeld eindigde , zoude men dit aan hem niet als een misslag kunnen toerekenen , dewyl zulk een kind , zonder dat deeze operatie was verrigt , egter voorzecker zonde gestorven zyn.

Dat deeze darm geheel zoude ontbroken hebben , gelyk sommige willen , meen ik zeer zeldzaam te zyn waargenomen , dewyl 'er byna altoos een gedeelte van den zelve , naar een touwtje gelykende , en zonder opening , is overgebleven , zelfs dan , wanneer men hem , als ware het , omhoog met een knoop gesloten , en toegegroeid , gevonden heeft. Daar nu ook in zulk een geval het uitsluit met gevaar gepaard is , moet men door middel van eene insnyding den weg openen , en de plaats , welke men daartoe verkiezen moet , leerd men uit een onduidelijk overblyfzel van den aars ; maar in-gevallen dit ontbreekt , moet men met alle zorgvuldigheid omzien naar eene bekwame plaats voor de operatie , in het oog houdende , dat by pas geboore kinderen de opening van den aars niet gevonden word , ter plaatse , daar men ze by ouder menschen waarneemd , of dat dezelve ten minsten geheel anders schynt geplaatst te

E e z

zyn

zyn (a); want by tedere kinderen is een groot gedeelte van het staart-beentje alleen kraakbeen, en men kan het door het gevoel van de zachte deelen bezwaarlyk onderscheiden; waardoor het ook komt, dat het overblyfzel van den aars verder af van het been zelfs word waargenomen, als natuurlyker wyze pleegt te geschieden.

Ten einde nu de operatie wel gelukke, moet men vooral letten, dat men, na het maaken van de uitwendige insnyding, het hooger gelegen einde van den darm juist doorboord ter dier plaats, alwaar in welgeschape menschen de sluitspier van den aars word gevonden; maar vooral moet men den darm niet op zyde openen, het welk egter ligt kan geschieden, dewyl hy door den zwarten drek is opgezwollen, en uitgespannen; want, doorboord men denzelven op eene verkeerde plaats, dan word al de zwarte drek niet ontlast, en alle toevallen houden niet op, gelyk behoorde; ja, indien de uitwendige insnyding het geflote einde van den darm niet bereikt, maar wat hooger langs denzelven voortgaat, zakt somtyds de darm, door den zwarten drek uitgespannen zynde, in de wond, en maakt eene soort van uitzakking, of breuk, welke, door eenen Heelmeester geopend zynde, den lyder heeft doen sterven (b). Word daar en tegen de darm

(a) PETIT *mem. de l'acad. de Chir. Tom. 2. edit. in 12mo. p. 243.*

(b) PETIT op de aangehaalde plaats. p. 240. Obs. 2.

darm ter regter plaatse, aan zyn onderste gedeelte, geopend, het welk men ziet uit het weglloopen van den zwarten drek, dan gelukt de operatie, zelfs in gevalle een groot gedeelte van den darm scheen te ontbreken, naar wensch. En ten bewyze van dit gezegde, zal ik, met verzwyging van veele andere voorbeelden, welke men overal kan vinden, slegts gewag maaken van een geval, dat, eenige jaaren geleden, alhier te *Leipzig* aan den beroemden Heelmeester **HEBENSTREIT** is voorgekomen; het kind namentlyk, aan het welk hy zoo gelukkig de operatie verrigtte, ontbrak het onderste gedeelte van den endel-darm, en wel eenige duimen verre, en egter had men rede om te hoopen, dat het, na het geneezen der wond, geen ongemak zoude hebben overig gehouden, indien het niet kort daarna aan eene andere ziekte was overleden.

My dunkt, dat men niet kwalyk zoude doen met, indien, na het maaken van de uitwendige insnyding, de zwarte drek niet aanstonds te voorschyn komt, of de darm ontdekt word, van die plaats af, op welke de uitwendige insnyding is gemaakt, wat naar agteren naar het hylig been toe nog eenige kleine insnydingen te maaken, om te vermeiden de zyden van den darm, die naar het hylig been toe minder kunnen worden uitgezet, en daarom meer naar vooren worden uitgespannen; en dan zoude men vervolgens den knoop, in wiens plaats een sluitspier had behooren geformeerd te worden, zoo veel mogelyk is, in het midden moeten doorbooren.

Die door het inbrengen van den vinger in de wond de plaatfing van den darm willen onderzoeken, moeten hier mede zeer voorzigtig te werk gaan, om de bygelegen deelen niet te kwetzen; maar nog veel meer zyn te berispen die geenen, die met een' vinger den darm doorbooren, dewyl zy de kinderen, welke zy tragten te heipen, in het grootfte levens-gevaar brengen; want men kan ligt begrypen, dat de banden van het celagtig weeffel, door welke de darm aan het hylig been, of de blaas, bevestigd word, door zulk eene ruuwe behandeling kunnen worden verscheurd, en dat de darm zelfs zwaar gekwefst kan worden, ter bevestiging van welke zaak geene voorbeelden ontbreken.

PETIT heeft beschreyen een *troisquart*, tot dit oogmerk vervaardigd (a), met het welk de darm, wanneer hy wat ver van den aars is afgelegen, met gemak kan worden doorboord: dit instrument is wat dikker, als naar gewoonte, en het is zoo gemaakt, dat het pypje, in het welk de naald bevat word, door middel van een fleuf, welke in het zelve word gevonden, na het te rug trekken van den naald, als de doorbooring is verrigt, een mesje kan bestuuren, en men dus de insnyding na beide zyden kan vergrooten: maar deeze manier is egter zoo veilig niet, of verscheide kinderen, aan welke men dezelve heeft in het werk gesteld, zyn gestorven.

De

(a) Op de aangehaalde plaats pag. 247.

De vrees van hen , die meenen , dat na deeze operatie de afgang niet zoude kunnen worden opgehouden , uit hoofde , dat 'er geen sluitspier van den aars gevonden word , is ongegrond ; want de onderste kringswyze veezelen van den endel-darm maaken , na de operatie , den inwendigen sluitspier van den aars uit , terwyl de uitwendige eenigzints hersteld word door de bekleedselen. LEVRET teekend derhalven met regt aan (a) , dat geen van alle kinderen , aan welke de operatie van een gefloten aars met een goed gevolg was verrigt , geplaatst is geweest met eene onwillige ontlasting van den afgang.

De natuur behoud ten laafsten zulke ellendige kinderen , aan welke men in het geheel geene opening van den aars bespeurd , en de operatie ook niet word verrigt , somtyds nog , ten minsten eenigen tyd in het leven door een zonderling hulpmiddel , namentlyk door hen den afgang te doen uitbraaken. Men heeft een voorbeeld van zulk een kind , dat zes maanden oud is geworden , ja , andere hebben zelfs hunnen volkomen wasdom bereikt (b).

Ik

(a) *l'Art des Accouch.* p. 235.

(b) Vergelyk SCHENCK pag. 391, en aldaar de waarneming, uit PANAROLUS ontleend. Zie ook LAMURE in *journ. de medecine* 1770. p. 510. en BAUX in het zelfde werk Tom. VIII. p. 60 , die verhaald het geval van een meisje , oud twintig jaaren , het welk geene schede , pis-buis , of aars , hebbende , de pis door de borsten , en den afgang door den mond , kwytt raakte. Mo-

Ik meen, dat ik ter deezer plaatse nog gewag moet maaken van een ander, niet min doodelyk, ongemak, het welk niet zelden voorkomt, en van het welk men zelfs in deeze stad verscheide voorbeelden heeft gezien, ja dit meen ik des te meer te moeten doen, dewyl maar zeer weinige schryvers over het zelve iets hebben aangeteekend.

Het ongemak, dat ik bedoel, is *een aangebooren kronkel in den darm*, door welken de endel-darm, niet ver van zyn einde, word verstopt, hoedanig een geval de beroemde LUDWIG, en GEHLER, in een meisje van zes maanden hebben waargenomen. In den beginne van haar leven had zy naar behooren afgang; maar, als zy denzelven ontlastte, en ook op andere tyden by tusschenpozen, haalde zy haaren adem meer maalen, en sterker. Langzamerhand wierd egter de ontlasting van den afgang belet, zoo dat men eindelyk door geene middelen, hoe genaamd, dezelve kon te weeg brengen, en het kind ten laatsten in de zevende maand van zynen ouderdom stierf, na dat het, kort voor zynen dood, veel, helder, met slym vermengd, bloed was kwyt geworden. De clysteeren, welke men zette, kwamen niet naar behooren in het darm-canaal, maar liepen aanstonds weder weg, en door middel van een wasch-kaarsje, van het welk zich de

gelyk verhaald SAUVAGES het zelfde geval. *Nosol. T. I. p. 349.*; raakende de lyderesse, van welke hy spreekt, alle twee, of drie, dagen den afgang door braaking kwyt.

de Heer HEBENSTREIT bediende , ontdekte hy eenen tegenstand wat hooger in den darm.

By de ontleding van dit meisje , zag men , dat de kartel-darm in het onderfte gedeelte van de linker zyde , ter lengte van omtrent zes duimen , was zamengetrokken , maar , toen men ze had ontwonden , zag men , dat de geheele kartel-darm door plooijen zich zelven had verftopt , en naar binnen in zich zelven was gekeerd , zoo dat zelfs de blinde darm niet was overgebleven , en de kartel-darm , nadat hy was ontwikkeld , langer was , dan een el , en eenige duimen (a). Dat deeze kronkel , die den darm vernauwd , ja byna geheel verftopt , had , aangebooren , en door den tyd flegts erger geworden was , wierd ten klaarften beweezen door de zeer fterke zamengroeijing van deeze deelen , welke , als ware het , door middel van peezige draden was gefchied. Byna een foortgelyk geval heeft de beroemde HEBENSTREIT in een ander kind waargenomen.

§, X V.

Ongemakken der leden, en der bekleedselen.

Na dat ik byna het geheele lighaam van een kind beschouwd heb , gaa ik nu over tot die ongemakken,

(a) Men zie LUDWIG *diff. de caufis obftructionis alvinæ*. Lipf. 1770. p. 32.

ken, welke de leden van pas geboorene kinderen treffen.

De ongemakken der leden kunnen omtrent tot drie soorten gebragt worden, te weeten, eene afwyking van het juiste getal, eene ongewoone plaatsing, en vereeniging, en eene tegenatuurlyke van een scheiding; want hoe zeer men somtyds by kinderen, welke met moeite zyn ter waereld gebragt; kneuzingen, en gezwellen, door stilstaand bloed veroorzaakt, waarneemd, worden alle deeze ongemakken egter zonder moeite door het gebruik van stoovingen geneezen; en hier toe behoord vooral de zwellung van den arm, die by de geboorte het eerst te voorschyn komt, indien men het kind niet aanstonds keerd, en meer andere ongemakken van soortgelyken aart.

Dat sommige deelen dikwyls in een te groot getal by kinderen zyn waargenomen, inzonderheid de vingeren en teenen, is eene zeer bekende zaak; want daar zyn kinderen ter waereld gekomen, die zes, ja zelfs zeven, of agt, vingers hadden (a). Van deeze vingers, en teenen, welke boven het gewoon getal worden waargenomen, zyn sommige welgemaakt, bestaande uit been, spieren, en bekleedselen, zoo dat 'er zelfs somtyds zes beentjes in den navoet zyn; andere zyn onvolkomen, wanstaaltig, en zoo gemaakt, dat of de duim, of de een
of

(a) Men kan voorbeelden vinden by HALLER. oper. anat. min. T. 3. p. 27.

of ander der vingeren gespleten, of voor de helft dubbeld, is, of uit een wel gemaakten vinger een ander, die kleiner, en onvolkomen, is, even als een doorn, of tak, van een boom te voorschyn komt (a).

Maar behalven de vingeren, zyn 'er ook nog andere deelen, welke somtyds in een te groot getal worden gezien. Dus maakt HALLER op de aangehaalde plaats gewag van een neus, en oor, dat te veel is waargenomen, en deeze neus was zoo gesteld, dat behalven den neus, die natuurlyker wyze aldaar zyn moest, een andere, zonder been, meer paar agter geplaatst was.

Wanneer men nu zoodanig iets waarneemd, moet men vooral eerst onderzoeken, of deeze deelen, die te veel zyn, de gezondheid van het kind, of de werkingen, welke het noodzaakelyk moet verrigten, benadeelen, of eene groote wanstaltigheid veroorzaaken, en vervolgens, of men ze zonder gevaar, en zonder dat men hun eenig slimmer onheil toebrenge, kan wegneemen; en, dit alles wel overwogen zynde, moet men deeze operatie of nalaaten, of verrigten.

In gevalle men meend, dat het goed is dezelve te verrigten, is het best, dat men ze, zoo ras mogelijk is, in het werk steld, dewyl zy, hoe langer men

(a) Die onvolmaakte vingers, welke als uit een knoop voortkomen, kunnen in het geheel niet bewogen worden. P. ÆGINETA L. VI. c. 43.

men met dezelve wagt, des te moeilijker word verrigt (*a*); de wonden by kinderen gemakkelijker worden geneezen; en zy niet zoo zeer van pyn worden aangedaan, dewyl zy mogelyk nog minder bewustheid hebben.

Die deelen, welke boven het gewoone getal zich opdoen, en zonder been zyn, moeten eerder geteld worden onder de uitwassen, als onder de werktuiglyke deelen, en worden gemakkelijk afgebonden.

Die beentjes, welke voortkomen uit de zyden van de waare vingers, laat HEISTER (*b*) wegneemen met een schaar, boven welken ik een mesje den voorkeur zoude geeven.

Men vind veele voorbeelden, dat by pas geboore kinderen eenige deelen tegen-natuurlyk aan elkander zyn gegroeid, vooral neemd men dit waar aan de vingers, en teenen (*c*). Deeze zamengroeiing bevat de spieren, ja zelfs nu en dan de beenderen, dog somtyds zyn de vingers, en teenen, egter slegts alleen door middel van een vlies, en dat wel of in hunne geheele lengte, of maar voor een gedeelte, zamen vereenigd, in welk laast genoemd geval alleen men kan gebruik maaken van de operatie, door welke men de vingers, met het doorfnyden van het vlies, van elkander afzonderd, terwyl men vervolgens onder de geneezing zorg draagt, dat zy niet weder

(*a*) LEVRET *l'Art des accouchemens*, p. 239.

(*b*) Op de aangehaalde plaats. *T. I. p. 466.*

(*c*) HALLER op de aangehaalde plaats p. 37.

der aan elkander vastgroeijen; ten welken einde HEISTER aanraad (a), dezelve te omwinden met een zwagtel, die zoo breed, als een vinger, en met kalk-water en brandewyn doortrokken, is.

De juiste plaatting, en vereeniging, der deelen, welke tot de leden behooren, word voornamentlyk door ontwrigting, en breuken, veranderd; want hoe ervaren, en kundig, de vroedvrouwen ook wezen mogen, kan het haar egter in eene moeilijke verlossing, en by het keeren, gebeuren, dat zy, onaankezien alle aangewende zorg, en vlyt, egter een der leden van een kind ontwrigten, of breeken (b); en hier mede gaat geen zoo groot gevar gepaard, dat de vroedvrouw, of de ouders, daar over bekommerd behoeven te zyn, dewyl het ongemak, indien de wreede behandeling van een ruuw Heelmeeſter geen zamengeſtelde breuk heeft doen ontſtaan, zonder veel moeite ras word herſteld.

Eene ontwrigting, van welke ik het eerſt ſpreken zal, moet men ſchielyk herſtellen, waarna men zulk een verband, als de Heelkunde aanraad, moet aanleggen. By het herſtellen van eenen ontwrigten ſchouder moet men vooral, gelyk LEVRET (c) wel aanmerkt, letten, dat 'er niet een gedeelte van den beursband door het herſtelde armbeen gedrukt word,

(a) Als boven p. 465.

(b) SMELLIE verhaald, dat hem dit door de duistheid van het been is overkomen. *Cas. T. 3. p. 455.*

(c) *L'art des acc. p. 322.*

word, als waar door zouden ontstaan zulke toevallen, welke volgen, wanneer peesagtige deelen beledigd, of gedrukt, worden; en dit kan egter ligt gebeuren, dewyl de gewrigts-holte van het schouderblad vlak, en klein, en daar en tegen het hoofd van het opper-armbeen groot, en de band vry slap is.

Nog een ander ongemak, het welk men aan de voetzoolen der pas geboore kinderen waar neemt, is, dat zy dikwils of alleen door de legging van het kind in de baarmoeder, of door eene kwaade formeering, of door het ongeschikt zwagtelen (*a*), naar binnen gekeerd worden (*b*); en dit maakt, dat de kinderen, ouder geworden zynde, niet wel kunnen gaan; dewyl ze dan altyd rusten op de buitenste enklaauwen. Alle zwagtels, en werktuigen, welke men ter geneezing van dit ongemak heeft aangeraden, brengen weinig hulp aan; maar het best is, dat men, volgens den raad van SMEL-LIE (*c*), den voetzool van elken voet met zachte zwagtels zoo vastmaakt aan een stukje buigzaam leder, en tusfchen de enklaauwen druk-doeken legt op zulk eene wyze, dat de eene voet ten steunfel van den anderen strekke. Deeze manier verdiend den

voor-

(*a*) Dezelfde Schryver als boven p. 231.

(*b*) De Engelsche noemen dit ongemak *club-foot*. Men zie het aanhangfel van CHESELDEN, gevoegd by de Engelsche uitgaaf der operatien van LE DRAN. *Tab. VIII.*

(*c*) Als boven p. 454.

voorkur boven die van CHESULDEN (*a*), volgens welke men linnen-lapjes, doortrokken met een mengfel, uit het wit van eijeren, en meel, zamengefteld; tegen den voet legt, en denzelven in eene rechte plaatfing houd, tot dat deeze lapjes droog, en hard, geworden zynde, den zelven naar behooren vafthouden.

Hier boven heb ik gezegt, dat de leden der kinderen, als zy ter waereld komen, maar voornamentlyk onder het keeren, kunnen gebroken worden, zonder dat egter de vroedvrouwen daar omtrent, even min, als over het laaftt verhandeld ongemak, altyd behooren befchuldigt te worden; maar, dewyl zy egter dit ongemak dikwils tragten te verbergen, uit vrees, dat haar goeden naam daardoor nadeel zoude lyden, hebben zy daardoor de kinderen veeltyds benadeeld, zoo dat 'er voorbeelden zyn, dat zy hun leven lang zulk een lid niet hebben kunnen gebruiken, of door dat 'er ontfteking by de breuk kwam, geftorven zyn (*b*).

Men kan altyd, en zeer fpoedig, een middel ter herftelling aanwenden, als men flegts zich be- diend van fpeelkaarten, dezelve in de lengte door- fnyd; en ze van boven; en onder, uitsnyd; deeze vervolgens, nadat men ze in lauw water, of wyn, heeft natgemaakt, op het deel, welks been gebro- ken is, nadat men het alvorens naar de kunft ge- zet

(*a*) CHESULDEN op de aangehaalde plaats.

(*b*) SMELLIE als boven p. 456.

zet heeft, behoorlyk legt, en vervolgens om het zelve wind een zwagtel, wel vast, maar egter niet al te styf, ten einde deeze kaarte-bladen, nadat zy styf zyn geworden, behulpzaam mogen zyn tot het geneezen van het been, het welk men behoorlyk gezet, en, bevestigd heeft; en dit geschied dan doorgaans binnen vyftien, of twintig, dagen.

Deeze eenvoudige manier hebben LEVRET (a), en na hem zeer veele andere schryvers, aangeraden; hoewel andere egter, by voorbeeld SMEL-LIE (b), zich van compressen, en zwagtels, bedienen (c).

Eindelyk moet ik nog handelen van de huid-gebreken, maar uit deeze alle zal ik slechts alleen gewag maaken van die, tegen welke de Heelkunde iets vermag, terwyl ik de overige met stilzwygen zal voorbygaan.

By pas geboore kinderen ziet men veele *Moeder-vlakken*, (over welker oorsprong ik ter deezer plaatse niet zal handelen); en van deeze zyn de ge-

(a) Als boven p. 232.

(b) Op de aangehaalde plaats. p. 455.

(c) FORESTUS maakt gewag van de beenderen van eenen arm, welke by de verlosfing zoo week waren, dat men ze op allerley wyzen buigen kon. L. XVIII. obs. 15. Maar dit was egter een zeer zeldzaam geval, en het ongemak wierd binnen drie weeken van zelfs geneezen, want de pleister, van welke hy zich bediende, was voorzecker onnut.

gemeenste die, welke niet veel boven de huid verheven zyn, maar egter is 'er ook nog eene andere soort, welke niet zoo veel voorkomt, en ontstaat door dat een slymig vogt, zich in het sponsieus lighaam van het kind in eene te groote meenigte bevindende, zich op de eene, of andere, plaats van het celagtig weeffel zoo vergaderd, dat 'er ontstaat een gezwel, aan het welk de eenvoudigheid der oude wyven zulke namen geeft, als zy meend, dat, van wegen zyne overeenkomt met andere zaaken, aan het zelve toekomen, by voorbeeld, een kruis, een worst, een muis &c.

In gevalle zulke uitwasfen eene wanftaltigheid verwekken, moet men overwegen, of men ze met een mes zal wegneemen, of afbinden; dog, indien zy diepe wortelen hebben geschoten, en men ze niet kan wegneemen, zonder dat 'er teffens veel van het vel, of vleesch, zoude verloren gaan, is het beter, dat men ze onaangeroerd laat zitten; het welk ook plaats moet hebben; indien de vaten in den omtrek van dezelveu gezwollen zyn, en schynen te kennen te geeven, dat zy van een' kankeragtigen aart zyn (a). Brand-middelen, welke hier altyd met schroom moeten gebruikt worden, moet men in gevalle het gezwel kankeragtig is, geheel vermyden.

De andere soort van moeder-vlakken, welke met de huid gelyk zyn, worden moeiljeker, dan die, wel-

(a) HEISTER als boven. T. 1. p. 457.

II. DEEL

Da

welke boven dezelve verheven zyn, weggenomen; maar egter heeft de beroemde *Lubekſche* Geneesheer en Heelmeeſter Z. VOGEL (a) voorgeſchreven een middel, dat in ſtaat is, om dezelve te verdryven, en beſtaat uit ſpaanſche zeep, en ongebluſte kalk, onder elkander gemengd, en tot een deeg gemaakt. Wanneer men dit nu wil gebruiken, moet men de omliggende deelen eerſt beſchermen met een klevenden pleiſter, in welken men eene opening ter grootte van de Moeder-vlak geſneden heeft, en op de vlak zelfs legt men dan dit middel, waardoor dezelve, na verloop van twaalf uren, met eene roof, welke door de daarop volgende ettering eindelyk afvald, word bedekt. VOGEL roemd dit middel boven alle andere, en verbied het gebruik van verdeelende pleiſters, en van ſtoovingen van lauwe wyn; want door dezelve zwellen, behalven dat 'er nog andere ongemakken ontſtaan, de moeder-vlakken op; ook kan men daarna niet zoo gemakkelyk dezelve wegneemen.

Na het verhandelen van dit alles, komt het my voor; niet kwaad te zyn, met een woord te gewaagen van twee huid-ziekten, welke wel ſchynen veroorzaakt te worden door eene ongeſteldheid der vogten, maar over welke de Heelmeeſters egter dikwils worden geraadpleegt.

De

(a) *Merkwürdige krankengeſchichte. Roſſock. 1756. Obf. 15. p. 179. 180. vergelyk THEBES. Hebammenkunſt. p. 583.*

De eene is de *Ontveling* (a), welke men by jonge kinderen waarneemd op verscheide plaatsen van het lighaam, vooral onder de oksels, in de liefsen, en somtyds ook agter de ooren. Deeze zoude men wel zeer gemakkelyk door middelen, uit lood vervaardigd, kunnen geneezen; maar veele menschen zyn beschroomd, om dezelve te gebruiken, en bedienen zich daarom van deeze niet by tedere kinderen. Zulke moeten derhalven wondwater bezigen, en vervolgens het deel met het poeder van de Wolfsklauw bestrooijen, of gebruik maaken van een middel, uit de *Zinc* bereid. *LEVRET* (b) pryft aan een fyn poeder van vermolfemd hout (c), en styfzel, maar by beveeld ook, deeze plaats, nadat ze daar mede bestrooid is, met het zog van de minne te bevogtigen. Voor het overige is het ten uitersten noodzaakelyk, dat de zuiverheid, en zindelykheid, omtrent alles in agt genomen worde, en dat men zorg draage, dat niets van het scherp vogt aan het linnen, en de zwagtels, blyve hangen.

Eene andere soort van huid-gebrek, aan jonge kinderen veelyds voorkomend, bestaat uit grooter blaasjes, welke een vuil water bevatten, en welker ran-

(a) *Erythema intertrigo*. SAUVAGES als boven T. I. p. 139.

(b) Als boven p. 260.

(c) SAUVAGES raad op de aangehaalde plaats inzonderheid aan het stof, dat van een vermolfemde wilgenboom komt.

D d a

randen onttoken zyn. Zy laten zich het eerst zien in de liefen, vervolgens in den omtrek van den navel, by de oxels, en aan de vingers; en na verloop van drie, of vier, dagen vallen zy droog weder af (a) Het is zeer opmerkenswaardig, dat dit uitflag zich fomtyds, even als eene *epidemische* ziekte, vertoond, en in het eene jaar veel meer, en overvloediger, voorkomt, als in een ander jaar. Hier mede gaat byna geheel geen gevaar gepaard, ten zy het zich in eene zeer groote meenigte laat zien; maar, dewyl het egter doet blyken, dat de vogten sekerp zyn, is het goed, dat men van zachte buik-zuiverende middelen gebruik maakt, ook is het niet kwaad, de blaasjes te openen, ten einde het vuile water wegloupe; daarna de wond uit te wasfen met wond-water, onder zuiver water gemengd; en vervolgens te bestroijen met het zaad van de wolfsklauw, ten einde zy gezuiverd worde, en de geneezing beter worde volbragt.

(a) Zoude dit ongemak ook zyn die verscheidenheid van Wind-pokjes, van welke SAUVAGES gewag maakt, en die by de inwoonders van *Languedoc* genoemd word *Burgueirole*. *Nofol. T. I. p. 423?*

E I N D E.



R E 4

REGISTER.

Door I word het Eerste, en door II het Tweede
Deel aangewezen: a betekend de aantekeningen.

A.

Aal-besfen (zwarte). Dezelfen zyn zeer nuttig in de keel-ziekten. I. 417.

Aangezigt (het) der kinderen heeft by de geboorte fomtyds eene pairfche kleur. II. 308. Hoe men dit te hulp komt. 309.

Aars (de) is by pas geboore kinderen fomtyds gefloten. II. 397.

Aars-maaden (de) zyn eyer-leggende dieren. II. 40.

a. waar dezelfen zich ophouden. 39. 40. a. zy zyn

fomtyds in een zeer gering getal tegenwoordig. 40.

a. kentekenen van deeze wormen. 71. hoe zy het

best verdreven worden. I. 153. II. 76. zy bewe-

gen zich alleen des avonds 72. a. en waren, vol-

gens BISSET, by tedere vrouwfperfonen, twee maal

in de maand, laftiger dan anders. 73. a.

Abrotanum Campestre verdiend gebruikt te worden in de plaats van het zever-zaad. II. 83. a.

Acari (de), zeeker foort van infecten, zyn oorzaak van de fchurft. II. 222.

Aconitum (het) is aanprezen tegen de venus-ziekte. II. 297.

Aethiops Martialis. Hoe volgens de Apotheek van Parys bereid word. I. 185. a.

Aethiops mineralis (de) is van LOBB aanprezen tegen de pokjes. I. 309. en van COTUNNI met voordeel in deeze ziekte gebruikt. *ibid.* a. gedagten van ROSÉN omtrent dit middel. 310.

Afgang, waardoor het komt, dat dezelve by kinderen,

na evenredigheid, veel rykelyker is, dan by volwasfe menfchen. I. 79 95. *a.* waar voor de Geneesheeren vreezen, als de afgang, ten tyde, dat de kinderen tanden krygen, zeer fchielyk groen word. 120. *a.* waardoor de gewoone ontlafting word te weeg gebragt. 169.

Ammoniak-zout. gebruik van hetzelfde in de tufchenpoozende koorts. II. 29. *a.*

Arcuccio wat daar door verftaan word 37. *a.*

Argentum Hydragogum BOYLEI vel ANGELI SALE (het) is fomtyds tegen de wormen gebruikt. II. 135.

Afa fetida (de) word tegen de wormen aangepreezen. II. 130.

———— gebruik van dezelve tegen den kinkhoest.

I. 470. *a.*

Ascaris lumbricoides, overeenkomt van deezen worm met de aars-maaden. II. 52. hy verſchild egter in lengte van dezelve. *ibid.* ook komt hy niet overeen met de gewoone lange ronde wormen. *ibid.* *a.* men heeft hem ook in viſſchen waargenomen. 53. *a.*

B.

Bacca Norlandica. Berigt van de plant, welke deeze vrugt geeft. I. 146. *a.*

Baden. Nut der koude baden in de Engelfche ziekte. II. 155.

Bakery. Het bakery der kinderen word afgekeurd.

I. 31. wat in des zelfs plaats zoude voldoen. 32. *a.*

Bal. By kinderen blyven de ballen fomtyds in den buik, of den ring der buik-fpieryn, zitten. II. 382. waar voor men in zulk een geval zorgen moet 383. wat men moet doen, als een bal in den ring blyft zitten. *ibid.*

Balzak (de) is fomtyds kort na de geboorte, zonder eenig nadeelig gevolg, gezwollen. II. 384. *a.*

Bal-

Balsamum Sulphuris RULANDI. Hoe bereid word.

I. 90. a.

Balfem van SCHERZER, Bereiding van denzelven I. 98. a.

Barbados. Op dit eiland zyn de kinderen zeer onderworpen aan stuipen. I. 167. a.

Been. Een der Beenen van jonge kinderen word ligt krom, wanneer de minnen dezelve altyd op eenen en den zelfden arm draagen. I. 29. a. middel daartegen. ib.

Beenderen. Dezelve worden week, en ontbonden, zoo door mineraal-zuuren, als door azyn, en door wey, die met stremfel gemaakt is II. 151.

Been-breuk. Kan in eene moeilijke verlossing ligt ontstaan. II. 415. hoe zy moet behandeld worden. *ibid*.

Bekken. Waardoor het bekken der meisjes fomtyds vernauwd word I. 30. a.

Bier-wey. Hoe dezelve vervaardigd word. I. 190. a.

Bloedstorting (eene), door het snyden der Tongriem veroorzaakt, is fomtyds doodelyk. I. 53. II. 354. hoe zy gestuit kan worden. 54. II. 355.

Borst. Gebreken van dezelve, met welke jonge kinderen fomtyds ter waereld komen. II. 361. of die zy kort daarna krygen *ibid*.

Borsten. Vereifchtens van goede, en tot het zoogen bekwaame, borsten I. 7. a. het uitmelken van dezelve is niet goed. 25. der zelve tepels worden doorgaans beschadigt, als de kinderen de sprouw hebben. 123.

Braaking. Ontstaat uit veele oorzaaken: uit eene overlading van de maag. I. 426. *ibid*. a. uit koude. 427. door den damp van koolen. *ibid*. uit onderscheide rauwigheden in de maag. *ibid*. door spyzen, in onvertind koper vaatwerk bereid. 433. door de pokjes en mazelen. 434. vande naar binnen gedreven schurft. 435. van

wormen *ibid.* van den kinkhoest, en andere soorten van hoest. *ibid.* door eene geklemde breuk. *ibid.* door een' kronkel in den darm. 439. van gemoeds-aandoeningen. 443. aanmerkelyke waarneeming daarvan. 445.

Braak-middelen. Worden beter van kinderen, dan volwassenen, verdraagen. I. 471. voortreffelykheid van dezelve tegen alle soorten van wormen. II. 73. en a 74. 76. en a.

Brek der hersenen. Gaat somtyds met een waterhoofd gepaard. II. 177. bevat een gedeelte der hersenen. *ibid.* 318. hoe zy ontstaat. 318. 320. 323. en word gemakkelyk onderkend 320—322. moet niet geopend worden. 178. 324. is somtyds geneezen. 178. 324. en op welk eene wyze. 325.

— **Aangeboore lies- of balzaks-brek.** Wat men doorgaans in dezelve vind. II. 375. waardoor zy van andere breuken onderscheiden word *ibid.* op welke wyze zy ontstaat. 377. hoe zy ook by meisjes kan worden geformeerd. 379. behandeling van deeze breuken 381.

— **Darm- of Net-brek.** Waarom kinderen vooral met den zelve in de lies geplaagd zyn. I. 436. a. moet wel onderscheiden worden van een gezwel in de lies door een der balletjes veroorzaakt. *ibid.* hoe binnen gebragt moet worden. 437.

— **Wind- of water-brek.** Oorzaak van dezelve. I 90. a. II. 379. 384. middel daar tegen. 81. 91. a. 385. by meisjes kan zich waarschynelyk ook eene water- of wind- breuk in de lies opdoen. II. 380.

Breken. Waardoor het komt, dat by pas geboore meisjes meer lies-, en by volwasfe vrouwen meer dey-breken worden waargenomen. II. 379.

Buik-pyn. Kentekenen van dezelve. I. 94. is gemeenelyk

nelyk gevaarlyk. 97. middelen daar tegen. *ib.* hoe de minne zich te gedraagen hebbe, als het kind met deeze ziekte geplaagd is. 102. word veeltyds veroorzaakt door het zuur; dog ook door andere oorzaken. 105. en *a.* 137. en *a.*

Butyrum Cerae. Hoe het zelve, volgens de *Pharmacopæa Bateana*, word vervaardigd. I. 195. *a.*

— *vel Unguentum Majoranæ.* zamenstelling van dit middel. I. 93. *a.*

C.

Calomel (de) weerd de pokjes af. I. 315. en *a.* dezelve, vereenigd met het *Sulphur Auratum* en Campher, doet geene kwyling ontstaan, al gebruikt men ze in eene vry groote quantiteit. II. 266.

Campher (de) bezit het vermogen, om de pokjes af te weeren. I. 314. dezelve kunnen de wormen niet verdraagen. II. 90.

Castoreum (de) is met den koorts-bast tegen den kinkhoest voorgeschreven. I. 469.

Cataracta (de) is somtyds aangeboren. II. 336. maar kan in zulke tedere kinderen niet geneezen worden. *ibid.*

Ceruis. Het gebruik van het zelve op ontvelde plaatsen is nadeelig. I. 87. *a.*

Cicuta. (de) ter geneezing der verstopping, en verharding, der klieren van het darmscheil aangeraaden. I. 204. kragteloosheid van dit middel. *ib.* *a.*

— nut van dezelve in pynelyke klier-gezwellen. II. 296. *a.* in de venus-ziekte. 296.

Confectio japonica Edinburgensis. Hoe dezelve word bereid. I. 210. *a.*

D.

Darmen (de) komen somtyds bloed te voorschyn

Dd 5

bul

buiten den Navel by de geboorte. II. 367. zy zyn veelytyds van andere ingewanden verzeld. *ibid.* waar van dit misfchien ontftaat. 368. dit gebrek komt ook voor na de geboorte, en waar door. *ibid.* hoe het moet behandeld worden. 371.

Decoftum Pectorale. Hoe het zelve volgens de *Londensche* apotheek bereid word. I. 291. 419. a.

Diacaffia Pharm. Edinb. Hoe zy word vervaardigd. I. 289. a.

Droppelen van Dr. DYRIETZ. Voorschrift van dezelve. II. 75. a.

E.

E*clampsia.* Zie vallende ziekte der kinderen.

Electuarium lenitivum. Bereiding van het zelve volgens de *Edinburgfche* Apotheek. I. 297. a.

———— *de Manna.* Hoe volgens de *Wittenbergfche* Apotheek bereid word I. 76. a.

Elixir amarum HÆRNERI. Op welke wyze het doorgaans vervaardigd word. II. 114. a. 115. a.

———— *Hepaticum.* voorschrift van het zelve. I. 487.

———— *Paregoricum.* Zamenftelling van het zelve volgens de *Londensche* Apotheek. I. 277. a.

———— *Proprietatis cum aceto.* Gebruik van het zelve tegen de wormen. II. 83. 132.

———— *purgans MICHAËLIS.* Dus word de *Tinctura Catholica purgans ROTHII* by LOESEKE genoemd. II. 93. a.

———— *Salutis.* Voorschrift van het zelve volgens de *Edinburgfche* Apotheek. I. 260. a.

———— *Viscerale* van ROSÉN. Zamenftelling van dit middel. I. 431.

Emplastrum attrahens. Hoe het zelve volgens de *Londensche* Apotheek bereid word. I. 457. a.

Em-

Emplastrum diasulphuris RULANDI. Hoe het word vervaardigd. I. 90. a.

———— *vesicatorium*. Bereiding van het zelve volgens de *Londensche* Apotheek. I. 457. a.

Emulsio Arabica. Hoe dezelve na de *Edinburgsche* Apotheek word bereid. I. 191. a.

Endel-darm. Des zelfs opening is in eerstgebore kinderen somtyds zeer nauw. I. 69, a. II. 398. of geheel gesloten. *ib.* a. II. 399. hoe dit toeval te behandelen zy. *ibid.* II. 398. wat de natuur somtyds doet. II. 407. ——— (de) ontbreekt somtyds. I. 73. a. gedag- van OEHME daaromtrent. II. 403. is ook waargenomen, zich in de blaas, en andere deelen, openende. I. 75. a. II. 402.

———— uitzakking van den zelve. I. 83. oorzaaken van dit ongemak, en middelen daar tegen. *ib.* en a. 85. a.

Engelsche ziekte. Wanneer zy zich het eerst geopenbaard heeft. II. 140. word het meest waargenomen aan vogtige plaatsen. 141. is somtyds aangebooren, *ibid.* a. teekenen, en toevallen van deeze ziekte. 139. 142. oorzaaken van dezelve. 146. waardoor dezelve kan te keer gegaan worden. 152. hoe zy moet geneezen worden. 154.

Essentia Scillæ. Hoe dezelve volgens de *Wittenbergsche* Apotheek word bereid. I. 422. a.

Eiter (de) word somtyde uit gezwollen door de aderen opgenomen, en met de pis, of den afgang, ontlast. I. 206. voorbeelden daarvan. 207.

Extractum Thebaicum. Hoe het volgens de *Londensche* Apotheek word vervaardigd. I. 438. a.

Eijeren. Dooijers van Eijeren zyn den kinderen niet voordeelig. I. 82. wanneer zy somtyds nuttig zyn. 99. a. 101. a.

F.

Faba Peaburei. Beschryving van deeze boonen, en der zelve nut in den loop. I. 197. a. 214.

Fasciola intestinalis (de) word in de braasfems gevonden. II. 33. en is ook in menschen waargenomen. *ibid.* a. ja in een gekookten braasfem levendig gevonden. 35. en a. gedaante van de zelve. 53. waardoor het komt, dat 'er snydingen in het lyf ontstaan, eer zy ontlast word. 54. is in een sterk koolen-vuur meer, dan twee minuten, in het leven gebleven 35. a. 54.

Flammula Jovis (de) word tegen de venus-ziekte aangeraaden. II. 297.

Fluxus coeliacus. Zie grauwen loop.

Fontanel. Hoe zy het best beschermd word, als zy te wyd open is. II. 316.

G.

Gal. nut van dezelve tegen de buik-pyn. I. 98. a. 104. ter ontlasting van den afgang. 170. hoe zy al te veel ontlasting kan veroorzaaken. 171.

Geelzugt. Sommige kinderen hebben dezelve mede ter waereld gebragt. I. 477. a. oorzaak van deeze ziekte 478. II. 303. a. de steenen der gal-blaas zyn geene oorzaak van dezelve. *ibid.* a. gedagte van MOR-GAGNI omtrent de oorzaak van dezelve in kinderen na de geboorte. 479. a. II. 303. a. toevallen. 481. kentekenen. 483. geneezing. 484.

Gezwel op het hoofd der kinderen. Gaat somtyds met een water-hoofd gepaard. II. 177. bevat een gedeelte der hersenen. *ibid.* moet niet geopend worden 178. is somtyds geneezen. *ibid.* zie ook Breuk der hersenen.

Ge-

Gezwel. Hard gezwel van het schaambeent tot den navel by sommige kinderen kort na de geboorte waargenomen. II. 374. Aart van het zelve. *ibid.* het is aan veelen doodelyk geweest. 375. waar door sommige egter zyn gered. *ibid.*

Gierst-uitslag. Hoe de vlakken in deeze ziekte gesteld zyn. I. 411.

Globuli martiales. Hoe zy volgens de *Wittenbergse* Apotheek bereid worden. II. 162. a. der zelve gebruikt. 162.

Gordius. Gedaante van den zelve, II. 54. waar hy in vischen gevonden word. 55. door welke tekenen men hem by menschen ontdekt. *ibid.* hy is waargenomen in verscheide bronnen in *Wesgoibland.* 56. a.

Grauwe-loop. Meening van veelen omtrent deeze ziekte. I. 199. gevoelen van VOGEL. *ibid.* toevallen van dezelve. 202. oorzaken. *ibid.* geneezing. *ibid.*

Gummi Gutta (de) is tegen den lint-worm zeer nuttig bevonden II. 93. a. gelyk ook tegen de ronde wormen. 94. a.

H.

Hazen-mond. Hoe verdeeld word. II. 338. gedagten van LOUIS omtrent dit ongemak. 339. het maakt het zuigen zeer moeijelyk, en belet dit somtyds geheel. I. 63. II. 340. hoe PETIT dit tragtte te verbeteren. *ibid.* de operatie, in dit ongemak nodig, moet niet lang worden uitgesteld. 341. dog, zoo men ze uitsfeld, moet men zich intusfchen van een verband bedienen. 342. wat men by de operatie moet in agt neemen. *ibid.* en vervolgens.

———— (de) was in zeeker geslagt erfelyk I. 64

Heesheid. Waardoor veroorzaakt word. I. 454.

Het

Helleborus fœtidus LINNÆI. Gebruik van dit middel tegen de wormen. II. 84. en a.

— *niger* (de) word tegen de wormen aangeraden. II. 89. 136.

Herba Brittannica. Het zelve word in *Zweeden* zeer hoog geagt, en tegen veele ziekten, en ongemakken, gebruikt. II. 158. a.

HERRENSCHWAND. Waaruit zyn middel tegen den lint-worm bestaat. II. 108.

Hoest (de) ontstaat uit veelerley oorzaaken. I. 447. des zelfs zitplaats is in kinderen gemeenelyk de maag. 448. hoe dezelve van andere foorten onderscheiden word. *ibid.* genees-wyze van deeze. 449. Hoest uit verkoudheid, 450. oorzaak daarvan. *ibid.* hoe geneezen word. 453. word ook verwekt door na binnen gedreeven schurft. 456. middelen daar tegen. *ibid.* zie ook kink-hoest; kittel-hoest; maag-hoest.

Hoofd. Zwelling der zagte deelen van het zelve II. 305, aan welk gedeelte zy word waargenomen. *ibid.* waardoor zy ontstaat. *ibid.* nut van dezelve in de verlossing. 306. zy is ook voor het kind niet gevaarlyk. *ibid.* hoe men egter de natuur somtyds moet te hulp te komen. *ibid.*

— (het) word in de geboorte zamengedrukt II. 310. maar krygt van zelve doorgaans zyne behoorlyke gedaante weder. *ibid.* hoewel men egter somtyds eenige hulp moet aanbrengen. 311. deeze drukking is zeer zelden gevaarlyk 312.

— de naaden worden by pas-geboore kinderen somtyds van elkander afgeweeken gevonden II. 314. hoe de Engelsche vrouwen zulke hoofden behandelen. 315. hoe men moet te werk gaan. *ibid.*

Huid. Zeeker huid-gebrek, by jonge kinderen veeltyds voorkomend. II. 419. hoe het moet behandeld worden. 420.

J.

J.

Jenever- besfen. Een afkookzel van dezelyen zuiverd ras de handen, met fchurft befmet. II. 229.

Inenting der Pokjes. Hoe fomtyds van de Chineezen word verrigt I. 317. Zy is het zekerfte middel om de fchadelyke gevolgen der pokjes voor te komen. 321. algemeene raadgeving omtrent dezelve 322. *a.* wie dezelve het eerft in *Europa* heeft bekend gemaakt. *ibid.* wie in *Zweeden*. 323. *a.* uitflag van dezelve in dit ryk. 324. *a.* ingeënte pokjes komen niet weder. 330. waardoor men volgens **GANDOGGER DE FOIGNY**, geruft gefield word, al heeft zich geen zichtbaar uitflag vertoond. *ibid.* *a.* wanneer men niet kan zeggen, dat iemand de pokjes door de inenting gekregen heeft. 330. waardoor men, volgens **HEBERDEN**, fomtyds gemeend heeft, dat de pokjes ten tweeden maale iemand aantasten. 331. *a.* wanneer de inenting vrugteloos afloopt. 332. wat omtrent de inenting in acht te neemen zy. 335. voorbereiding tot dezelve. 307. 335. *a.* 337. 339. of men ziekelyke menfchen moet inenten. 342. *a.* de inenting kan op alle tyden van het jaar verrigt worden. 348. maar moet niet worden in het werk gefield, als eene andere heerschende ziekte regeerd. *ibid.* waar zy word gedaan. 349. en hoe zy gefchied. *ibid.* voorzigtigheid van den fchryver daarby gebruikt, en de redenen van dezelve. 352. teekenen van gevat te hebben. 354. uit het een of ander teeken moet men dit niet terftond besluiten. *ibid.* *a.* of de ingeënten na de uitbotting niet meer in gevaar zyn. 355. *a.* zy moeten eene goede levensregel blyven houden. 358. en den arm, waarop de inenting verrigt is, niet veel beweegen. 359. hoe de wond veranderd. *ibid.* eene fpoedig herhaalde inen-

inenting is zonder gevaar. 360. en *a.* de ingeënte word niet altyd op den zelfden tyd ziek. 360. by volbloedigen is eene aderlating nodig. 362. welke geneesmiddelen fomtyds nodig zyn. 363. uit welke teekenen men eene bloeding uit den neus te gemoed ziet. 364. hoe men de braakingen stuit. *ibid.* en andere toevallen behandeld. *ibid.* middelen na het droogen der pokjes nodig. 366. beantwoording eener gewigtige tegenwerping. *ibid.* *a.* andere foorten van inenting. 367.

Inenting der maazelen. Zy is het eerst door HOME ondernomen I. 399. manler, op welke hy dit verrigtte. *ibid.* zyne waatneemingen worden opgegeven. *ibid.*

Julepum e moscho. Hoe hetzelfde volgens de *Londense Apotheek* bereid word. I. 457. *a.*

K.

Kaak. Ongemakken, welke dezelve fomtyds by de verlossing worden toegebracht, hoe te helpen. II. 313.

Keel (de) is fomtyds, dog zelden, by pas geboore kinderen gefloten. II. 358.

Keel-breuk. Eene zeldzaame foort van dezelve by een kind waargenomen. II. 359.

Keel-ziekte. Zeekere foort van dezelve, welke in *Schotland* CROUP genoemd word. II. 188. Zy komt zeldzaam voor. *ibid.* Hoe men derzelver waaren aart heeft ontdekt. 189. zy regeerde in *Zweedem* in de jaaren 1761 en 1762. 190. En in *Schotland* in het jaar 1765. *ibid.* Waarin de ziekte bestaat. 121. 214. toevallen van dezelve. 191. 213. Zy is fomtyds fchielyk doodelyk. 162. Zy is onderscheiden van eene andere doodelyke keel-ziekte. *ibid.* En is eigentlyk

lyk eene ziekte der kinderen. 193. welke kinderen, volgens HOME, doordezelve het meest worden aangetast. *ibid.* Dog zyn gevoelen heeft men in *Zweeden* niet bewaarheid gezien. *ibid.* Waarneemingen van deeze ziekte. 193.—213. Het is nodig, de tweetyd-perken in deeze ziekte te onderscheiden. 216. Waardoor men dit kan doen. 217. Middelen ter geneezing aangewend. *ibid.*

Keel-ziekte met het vuur verzeld (de) is onderscheidende van die keel-ziekte, welke in *Schotland* CROUP word genoemd. II. 192. In dezelve scheid zich het inwendig vlies dikwils van de lugt-pyp af, en word uitgeworpen. 214.

Keurslyven. Nadeel, welk dezelve veroorzaaken. I. 33. a.

Kikvorfch-gezwel (het) kan het zuigen moeiljelyk maaken. I. 63. II. 358. Hoe het best geneezen word. *ibid.*

Kikvorfch-vaten (de) kunnen, by het snyden der tong-riem ligt gekwetst worden. I. 52. Waardoor een gevaarlyke, ja doodelyke, bloedstortig ontstaan kan. 53. Maar welke egter door de kunst kan worden gestuit. *ibid.* 54.

Kina. Hoe het best beproefd word. I. 276. Is van groot nut in de pokjes. 274. word zelfs gezegt de menschen voor dezelve te bewaaren. 320. Gedagten van MEDICUS omtrent dit middel in de mazelen. 396. a. Het is somtyds in deeze ziekte volstrekt nodig. *ibid.* Deszelfs nuttig gebruik in den kink-hoest. 474: en a. Hoe in detusfchenpoozende koorts gegeven moet worden. II. 22:—29. Stroop van kina. 25. a. Uitwendig gebruik van dezelve tegen deeze koorts. 26—29.

— (de) is dikwils tegen de wormen met vrugt gebruikt. II. 131.

Kind. Het zog van de Moeder is voor een kind de beste spyze. I. 1. Middelen, ter voeding van het
II. DEEL. E zelve

zelve aangewend, wanneer men het niet kan laten zuigen. 11. Men moet het by tyds aan ander voedsel gewennen. 19. Hoe men de Fontanel bezorgen moet. 35. II. 428. Hoe men het hoofd, en lighaam zuiveren moet. 36. Waardoor een kind fomtyds leerd scheelzien. 38. En niet goed zuigt. 39. Hoe het kort na de geboorte moet behandeld worden. 67. Wanneer men by hetzelfde voor buik-pyn te vreezen heeft. 94. Hoe men het, als het buik-pyn heeft, kan doen zuigen. 97. Waardoor het, het best, geholpen word, als het met te dik/zog de maag overladen heeft. 138. a.

Kinderen zyn los-lyviger, dan volwasfen menschen. I. 176. En slaapen ook meer. *ibid.* Gewoonte der Zweedsche vrouwen, als de kinderen een ongemak in de maag krygen, of braaken. 446. Hoe men aan dezelve alles met gemak in een ouwel kan ingeeven. 458. Zy verdraagen de braakmiddelen beter dan volwasfen menschen. 471.

———— Werktuig uitgedagt om het dood drukken der kinderen in het bed te verhoeden. 37. a.

Kink-hoeft. Is geene ziekte oorspronkelyk in Europa, maar is na alle waarschyndykheid uit Africa, of Oost-Indien, gekomen. I. 459. Wanneer zy zich het eerst in Vrankryk geopenbaard heeft. *ibid.* Oorzaak van dezelve. 460. 464. Zy is eene heerschende ziekte. *ibid.* Taft de kinderen niet meer, dan eens, aan. 461. Waardoor zy weder kunnen instorten. *ibid.* a. Deeze hoeft besmet op dezelfde wyze, als de mazelen, of pokjes. 460. Begin, voortgang, en einde van denzelven. 463. Hy is veeltyds doodelyk. 465. Geneezing van denzelven. 466. Voornamentlyk door braak-middelen. 470. Middel door Closs tegen deeze ziekte voorgesteld. 471. a. Zy komt, volgens denzelfden Schryver, met de pokjes en het roodvonk zeer veel overeen. 472. a. teekenen van beterschap in deeze ziekte. 475. Kit-

Kittelen. Het kittelen der kinderen is gevaarlyk. I. 165.
Kittel-hoeft. Oorzaak, en geneezing, van denzelven. I. 455.

Kneuzingen worden by kinderen zeer ligt geneezen. II. 306.

Knoflook (de) is zeer nuttig tegen de wormen. II. 89. 129. en inzonderheid tegen den lint-worm. 119.

Kool-bladen. Wanneer derzelver uitwendig gebruik in de schurft nuttig is. II. 228.

Koolen. Schaadelykheid van der zelve damp. I. 36. 427. middel daartegen. 38.

Koorts (tusfchenpoozende) Is by kinderen, voor de eerste reize, van zeer langen duur. II. 1. Verscheidene foorten van deeze ziekte. 2. Wordt ligt ongereegeld. *ibid.* aanmerking omtrent de koude in deeze koorts. 3. a. wat men door een herfst- en voorjaarskoorts verstaat. 4. a. eene langduurige koorts is by volwasfenen fomtyds heilzaam geweest. 5. en bevordert by kinderen den wasdom. *ibid.* herfst-koortfen houden dikwils zeer lang aan. 6. wat men verstaat door de *placenta febrilis*. *ibid.* en a. Deeze koorts week in zeeker geval voor de pokjes, en in een ander geval voor de inenting der pokjes. 6. zy verbergt zich fomtyds onder andere ziekten. 7. voorbeelden van zulke ziekten. *ibid.* waar door men ontdekt, dat zich eene tusfchenpoozende koorts onder dezelve verbergt. *ibid.* wanner zy gevaarlyk is. *ibid.* is geduurende de koude niet doodelyk. 8. geneezing deezer ziekte. *ibid.*—17. 21.—29. hoe dezelve kan worden voorgekomen. 17.

— (tusfchenpoozende). Hoe het met dezelve gaat, wanneer een kind de pokjes krygt. I. 231. en a.

Kraak-besfen. Nut van dezelve. I. 254. *ibid.* a. hoe men water van dezelve vervaardigd. 255. a. her

kruid van deeze plant is met nut tegen den steen gebruikt. *ibid.*

Kronkel in den darm. Wat dit ongemak eigentlyk is.

I. 440. *a.* middelen daar tegen. 439. 440. 441.

a. 443. *a.* gelukkig volbragte geneezing. 442.

———— is fomtyds aangeboren. II. 408.

Kruiden (zwitserfche). Welke foorten het meeft in gebruik zyn. I. 209. *a.*

Kwaad-zeer. Word in kinderen veeltyds veroorzaakt, wanneer de ouders de venus-ziekte gehad hebben. II.

248. *a.* op welke wyze het het fchielykt geneezen

word. *ibid.* wat volgt op eene kwaade geneezing *ibid.*

Kwik word zeer tegen de wormen geprezen. II. 131.

hoewel deszelfs nut egter twyfelagtig is. 132. een

afkookfel van den zelven word tegen de aars-maaden

aangepreezen in een clyfteer. 78. word ook gedron-

ken. 81. tegen de fchurft is de kwik insgelyks van

nut. 226.

— Hoe men den zelven in de venus-ziekte, zon-

der kwyling te verwekken, tot smeering ge-

bruikt. II. 272. middel door PLENCK uit den zel-

ven vervaardigd. 264. *a.* 292. middel van BIER-

CHÉN. 265. *a.* 283. *a.* de *spiritus mercurialis*. 285.

deszelfs nut in *Zweeden*. 287. *a.* raad om het lighaam

daar mede te wafchen. 298. hoe sommige anderen

den kwik gebruiken. 292—294.

Kwik-middelen zyn in eenen zwaaren fcheurbuik na-
deelig. II. 260. en *a.*

Kwyling. Dezelve is, ter geneezing der venus-ziekte
verwekt wordende, aan veele ongemakken onder-

worpen. II. 267. en word door gevaar verzeld. 268.

is buiten ftaat, iemand tegen eene wederinfstorting

te beveiligen. 269. zy fchikt zich niet voor aller-

hande lyders. 270. en maakt geene fcheiding der

zieks.

ziekte. *ibid.* kan ook geheel en al gemist worden. 271. aanmerking omtrent die kwyling, welke zich in de pokjes openbaard. I, 291,

L.

Leden. Ongemakken, en byzonderheden, aan dezelve by pas geboore kinderen waargenomen. II. 410.

Ledum palustre. Waar het groeid. I. 467. *a.* nut van deszelfs olie. *ibid.* dit middel is van sommigen met voordeel tegen den kink-hoest gebruikt. 466. en *a.* 468. *a.*

Lever (de) dubbeld waargenomen. II. 368.

Lienteria. Zie spys-loop.

Lippen (de) zyn by kinderen fomtyds vastgegroeid. II. 337. hoe men dit gebrek wegneemd, 338.

Lint-worm (de). Is zeer gemeen op plaatsfen, daar veele vischen zyn. II. 33. 34. *a.* 110. word in vischen gevonden. *ibid.* 34. *a.* en in het water. 34. ook in verscheide dieren, 51. is zelfs in een gekookten visch levendig waargenomen. 35. beschryving van denzelven. 44. hy word dikwils zeer lang. 47. 50. het koude water dood hem. 49. waarom dezelve zeer bezwaarlyk kan worden uitgedreeven. *ibid.* waardoor het komt, dat 'er fomtyds stukken van hem, zonder het gebruik van genees-middelen, ontfalt worden. 51. of dezelve den mensch aangebooren zy. ? 52. kentekenen van denzelven. 70. 109. hy plaagt de menschen niet altyd even sterk. 72. en *a.* middelen om eenige toevallen, door hem verwekt, te doen bedaaren. 75. en *a.* hy word zeer moeijelyk uitgedreven. 91. hoe dit het best geschied. 92. omstandig berigt van eene juffrouw, met deezen worm geplaagd. 96. welke spyzen, en dranken, hy niet verdragen kan. 106. beschryving van het middel van

HERRENSCHWAND tegen denzelven. 108. van eenige andere middelen. 109. — 124.

Looch album. Voorschrift van dit middel volgens de Apotheek van *Parvys*. I. 387. a.

Loop. Welke ziekte deelen naam verdiene. I. 169. waardoor dezelve in het algemeen veroorzaakt word. 170. welke teekenen in deze ziekte iets goeds voorspellen. 173. in welke ziekten dezelve een kwaad toeval zy. *ibid.* wanneer hy niet te schielijk moet gestopt worden. 174. in welke gevallen hy in tegendeel aanstonds moet worden gestuit. *ibid.* ontstaat uit verscheide oorzaken, en vereischt dus eene verschillende geneeswyze. 176—214. waarneemingen omtrent deze ziekte in volwasfenen. 211.

Lyn-olie. Nut van dezelve tegen den kronkel in den darm. I. 442. a.

Lyfimachia vulgaris flore purpureo. Nut van dezelve in den loop. I. 185. en a.

M M.
Maag-hoest. Oorzaken van denzelven. I. 448. teekenen *ibid.* geneezing. 449.

Magnesia alba. Nut van dezelve. I. 99.

Mazelen. Zyn gemeenelyk eene goedaartige ziekte. I. 371. maar egter somtyds doodelyk. *ibid.* zy besmetten op dezelfde wyze, als de pokjes. 372. of men dezelve meer, dan eens, krygen konne. 373. zy tasten eigentlyk de kinderen aan. 374. en worden somtyds mede ter waereld gebragt. *ibid.* teekenen der mazelen. 375. begin, voortgang, en einde der zelyven. *ibid.* de mazel-koorts is somtyds zonder mazelen gezien. 307. a. zelden tasten een mensch te gelyk de pokjes ende mazelen aan. 380. waardoor de hoest in deze ziekte ontstaat. *ibid.* deze ziekte heeft drielid-perken. 381. middelen, welke in het eerste tydperk worden vereischt. *ibid.* geneezing der toevallen.

ten , welke in deezen tyd zich openbaaren. 385. welke middelen in het tweede tyd-perk. te staade komen. 389, welke in het derde tyd-perk. 391. geneezing der toevallen , welke zich in deezen tyd , en na denzelven , openbaaren. 392. de mazelen kunnen ook ingeënt worden. Zie inenting der mazelen.

Mee-krap. Des zelfs wortel word tegen de Engelsche ziekte aangeraaden. II. 157. en *a*.

Meelpap (de) is nadeelig voor de kinderen. I. 19. 81, *a*. 140. 479.

Mineraal-water. Hoe men het zelve, volgens MONRO, kan bereiden uit eene ontbinding van yzer- vitriool. II. 161. *a*.

Minne. Vereifchtens van eene goede. I. 6. teekenen van der zelve gezonde lighaams gesteldheid. *ib*. 6. *a*. haare leevenswyze. *ib*. 13. zy moet dagelyks open lyf hebben. 15. maar zelden purgeer-middelen gebruiken. 16. zy krygt zelden de stonden , maar heeft, dezelyen krygende, schaadelyk zog. 17. bepaaling daarvan. *ib*. *a*. zy moet den byslaap vermyden. 21. bepaaling daarvan. 22. *a*. zy moet dagelyks in beweeging zyn. 13. 22. 104. 105. en genoeg kunnen slaapen. 24. zy moet zich niet kwaad maaken. *ib*. en het kind niet laten zuigen, als zy geschrikt heeft. 25. zy moet het kind op bepaalde tyden, en niet te dikwils, de borst geeven. 28. teekenen, uit welken zy weeten kan, of een kind honger , of dorst , hebbe. *ib*. *a*. kwaade gevolgen van het draagen der kinderen op eenen, en denzelfden, arm. 29. zy moet wel kunnen zwagtelen. 30. en in alle gevallen zeer oplettend zyn op het kind. 33. en *vervolgens*. Zy moet het zelve weeten gerust te stellen. 44. en nooit slaap-middelen ingeeven. 46.

— voorzorg , welke men by het veranderen van

Ee 4

mine

- minnen neemen moet. 26. *a.* wat zy doen moet, als haar zog verminderd. 29. hoe zy voorkomen moet, dat een kind scheef word. *ibid.* zy is fomtyds oorzaak, dat een kind moeijelyk tanden krygt. 121. *a.* hoe zy zich moet gedraagen, als het kind de sprouw heeft. 126.
- Minnen-Comptoir in *Stockholm*. nut van hetzelfde. II. 238.
- Moeders (de), welke zoogen kunnen, zyn verpligt haar kind te laten zuigen. I. 1. voordeelen, welke zy daarvan ondervinden. *ibid.*
- Moeder-vlakken, dezelve zyn onderscheiden in foort. II. 416, hoe men ze moet behandelen. 417.
- Mooren. De lid-tekenen der pokjes worden by hen weder zwart. I. 295. *a.* 330. *a.*
- Musculus*. In *Norrland* meend men daar door de pokjes voor te kunnen komen. I. 317. gedagten van den Schryver daaromtrent. *ibid.* van LINNÆUS. *ibid.* *a.* in den kink-hoest word hy nuttig geoordeeld. 466, gedagten van den Schryver. *ibid.* men zie ook *a.*

N.

- N**avel-brenk. Onderscheide foorten van dezelve. II. 366. 369. waardoor zy ontstaat. *ibid.* 368. 369. welke deelen zy bevatten. 367. 368. 370. hoe zy moeten behandeld worden. 371. men vind fomtyds water in dezelve. 573.
- Navel-streng. Omzigtigheid by het afbinden van den-zelven nodig. II. 363. behandeling der bloedstorting, fomtyds na het afrukken van het afgebonden gedeelte der navel-streng ontstaande. 364. verzwearing hoe te behandelen. 365.
- Netel-koorts. Hoe de vlakken in deeze ziekte gesteld zyn. I. 411.
- Neus (de) van kinderen word fomtyds by de geboorte toegedrukt. II. 313. stoovingen zyn nuttig ter genees-

neezing. *ibid.* de neusgaten zyn by de kinderen fomtyds verftopt : hoe men dan moet te werk gaan. 337. hoe als zy door een vlies gefloten zyn. *ibid.*

O.

Offa *Helmontiana*. Waaruit zy bestaat. I. 204. *a.*
Oleum animale DIPPÉLII. Nut van dezelve in de tusfchenpoozende koorts. II. 29. *a.* tegen den lintworm. 98.

— *lini Camphoratum*. Hoe dit middel word bereid. I. 395. *a.*

Olie. Schaadelykheid van dit middel tegen de buik-pyn. I. 82. *a.* wanneer het kan gebruikt worden. 137.

— Nut van de lyn- en boom-olie tegen den kronkel in den darm. I. 442. *a.*

Ongedierte op het hoofd. Hoe men hetzelfde gemaklyk kan verdryven. II. 229.

Ontvelling. Middel daar tegen. I. 86. *ibid.* *a.* II. 419 de ontlasting , welke zich door de ontvelde plaafen openbaard , moet nooit gefluit worden. 88. *a.*

Ontwrigting. kan in eene moeiljelyke verlosfing ligt ontftaan. II. 413. hoe zy moet behandeld worden. *ibid.*

Oog. Scherpe ontlasting uit de oogen der kinderen. hoe die hersteld word. I. 89. *a.*

Oog-leden. Zyn fomtyds by de kinderen toegegroeid , en op welk eene wyze. II. 332. op welke manier men dit ongemak te keer gaat. 333.—336.

Opium. Waarin deszelfs werking bestaat. I. 158. mid- delen , nodig ter redding van menschen , die kwaade toevallen door dit middel ondervinden *ibid.* en. *a.* 159.

Opflorpemde middelen. Aanmerkingen omtrent het gebruik van dezelyen tegen het zuur. I. 98. 101. *a.*

Ooren. Aangebore ongemakken van dezelve. II. 336.
hoe zy moeten behandeld worden. *ibid.*

— Schaadelykheid der terug dryvende middelen,
wanneer de kinderen agter de ooren nat zyn. I. 43.
88. a.

Oor-smeer. Lauw water is het beste middel ter ont-
binding van verhard Oor-smeer. II. 336.

P.

P*anacea liquida*. Hoe dit middel, van JONES nitge-
dagt, bereid word. I. 129. a.

— *Solida* van den zelfden schryver hoe vervaar-
digt word. I. 130. a.

Pap. Welke voor de kinderen de beste zy. I. 81. a.

Peen. Versche peen dryft de wormen af. II. 89.

Pekel van Boter is nuttig bevonden tegen de wormen.
II. 89.

Petroleum. Nut van het zelve tegen de wormen. II.
79. in *Aegypten* dryft men den lint-worm daarmede
af. 110. dit middel is ook elders met nut gebruikt. 111.

Pis-buis (de) is somtyds gefloten. I. 76. a. II. 388,
393. 394. hoe dit ongemak te herstellen zy. *ib.* hoe
de natuur zich somtyds red. II. 388.

Pokjes. Het is onzeker, wanneer zy in *Zweeden* gekomen
zyn. I. 214. het oudste berigt van dezelve. *ibid.* a. wan-
neer zy na *Aegypten* en *Spanjen*, gebragt zyn. *ib.*
wanneer zy in *Engeland* algemeen bekend waren.
215. Hoe zy in *America*, en *Groenland*, zyn geko-
men. *ibid.* hoe aan de *Kaap de goede Hoop*. 216.
wanneer zy in een land het doodelykft zyn. *ib.* zy
dooden meer menschen, dan de pest. *ibid.* waarom
zy in groote steden, en op univerfiteiten, meesten-
tyds in zwang gaan. *ib.* waarom zy in de Nonnen-
kloo-

kloofsters zelden voorkomen. *ib.* wie door dezelve aangetaft worden. 216. zy tasten fomtyds meer dan eens een mensch aan. *ibid.* *a.* der zelve vergift word niet in de lugt voortgebragt, of met dezelve voortgeplant. 217. hoe men eene stad, ja een geheel ryk, voor dezelve zoude kunnen beveiligen. *ibid.* egter is de uitroeiing van dezelve onmogelyk. 218. *a.* op welke wyze zy worden voortgeplant 218. zy worden in den beginne zeer moeijelyk gekend. 222. waar uit men weet, dat iemand besmet zy. *ibid.* beschryving der vier tyd-perken van deeze ziekte. 223. Teekenen van goede, en kwaade, pokjes. 228. wat in het eerste tyd-perk te doen zy. 248. gesteldheid van het vertrek, waarin de zieke legt. 249. en van de legerstede. 250. wat men aan te merken hebbe omtrent het dekzel. *ibid.* wat men heeft te oordeelen van het blyven buiten het bed. *ib.* *a.* het warm houden der voeten is nodig. *ibid.* gedagten over het veranderen der hembden. 251. aanmerkingen omtrent het voedzel. 252. den drank. 253. en de geneesmiddelen. 256. wanneer eene aderlating te pas komt. *ibid.* 257. en *a.* hoedanig de buik-zuiverende middelen moeten zyn, en wanneer zy te pas komen. 259. hoe men het aangezigt voor de pokjes bewaaren kan. 264. 265. *a.* hoe de oogen worden verzorgd. 267. de neus beschermd. *ibid.* en voor de keel zorg word gedragen. 268. toevallen, welke in het eerste tyd-perk worden waargenomen, en middelen daar tegen. 269. wat in het tweede tyd-perk te doen zy. 272. voortreffelykheid van den koorts-bast in deezen tyd. 274. toevallen, welke zich nu openbaaren, en der zelve geneezing. 276. 279. *a.* genees-wyze in het derde tyd-perk nodig. 280. wat men van den *Syrupus e meconio* moet oordeelen. 281.
en

en *a.* gedagten omtrent het gebruik van den geest van vitriool by tedere kinderen 282. *a.* nur der zuuren uit het mineraal-ryk. *ibid.* het krabben schynt den kinderen niet nadeelig te zyn. 283. *a.* wanneer de etter-koorts zich doet zien. 284. oorzaaken van dezelve. *ibid.* manier om dezelve te keer te gaan. 285. nut van de Campher. *ibid.* 286. *a.* van het openen der pokjes. 286. en *a.* 357. *a.* hoe men de pis-loozing kan bevorderen. 287. herhaalde afgangen zyn somtyds voordeelig. *ibid.* wanneer FREIND en TISSOT buik-zuiverende middelen geeven. 288. en *a.* wanneer spaansche vliegen te pas komen. *ibid.* *a.* Somtyds is eene aderlaating nodig. 289. nut van den koorts-bast ook in dit tyd-perk. 290. de oogen moeten dagelyks eens geopend worden. *ibid.* hoe dit gedaan moet worden. *ibid.* en *a.* aanmerkingen omtrent de kwyling. 291. middelen ter bevordering van dezelve. *ibid.* 292. en *a.* hoe de lyder liggen moet. 293. de kwyling duurt somtyds zeer lang. *ibid.* hoe men zich dan moet gedraagen. *ibid.* *a.* middelen in het vierde tyd-perk nodig. 293. waardoor somtyds de koorts verwekt word. 294. en hoe die word voorgekomen. *ibid.* somtyds word in dit tyd-perk eene aderlating noodzaakelyk. *ibid.* *a.* 298. *a.* hoe men ontdekt, dat de etter zich na de eene, of andere, plaats van het lighaam uitwendig begeeven heeft. 295. hoe men die plaats dan moet behandelen. *ibid.* wanneer men de pokjes bestreiken moet. *ibid.* wat daartoe dienstig is. 296. en *a.* na het droogen der pokjes is het nodig, eenige malen den buik te zuiveren. 296. genees-wyze van BROCKLESBY. 297. *a.* gedagten omtrent dezelve. 298. *a.* hoe men diep invreetende verzweringen, die na kwaadaartige pokjes overblyven, moet behandelen. *ibid.* welke behan-

de-

deling een teringagtige hoeft vereifcht. 299. *a.* waarfchynelyk krygt men deeze ziekte niet meer, dan eens. 298. bepaaling daarvan. 299. *a.* veele menfchen blyven voor dezelve bevryd. 300. veele kindeeren hebben de pokjes met zich ter waereld gebragt. 302. egter word een kind niet altoos van eene moeder, welke de pokjes heeft, befmet. *ibid.* *a.* deeze ziekte is in *Zweeden* zeer doodelyk voor de kinderen. 304. 327. der zelve befmetting is byna onvermydelyk. 306. verfcheide middelen, uitgedagt om het vergift der pokjes onwerkfaam te maaken. *ibid.* van BOERHAAVE. *ibid.* zyne gedagten omtrent den aart deezer ziekte. 307. Somtyds vertoonen zich in pok-koortfen geene pokjes. 306. *a.* van DE LA METTRIE. 308. van CLEGHORN. *ibid.* van LOBB. 309. van BERKLEY. 311. van MEDICUS. 320. van den Schryver. 313. zyne gedagten van den mufcus. 317. en *a.* en den kwik 318. het fpek van zee-honden tegen de pokjes aangeprezen. 317. *a.* manier om te maaken, dat een kind goede pokjes kryge. 316. wat het draagen van fcharlaken doen kan. 319.

Pokjes. Een foortgelyk uitflag, als de pokjes, talt fomtyds menfchen aan, die andere, deeze ziekte hebbende, oppaffen. 218. der zelve vergift kan langen tyd bewaard worden. 221. wat men door het koopen van dezelyen verftaat. *ibid.* wanneer de pokjes doorgaans het goedaartigft zyn. 228. en wanneer kwaadaartig. *ibid.*

—— Inenting der zelve. Zie inenting.

Purgeer-middelen. Hoedaanige aan menfchen, welker ingewanden fterk zyn, gegeven moeten worden. II. 128.

Rhabarber-droppelen van den Heer DARELIUS. Bereiding van dezelve. II. 123. en *a*.

Rob mororum. Hoe bereid word. I. 127. *a*.

— *Nucum*. Hoe word vervaardigd. *ibid*.

Roede. Ongemakken aan dezelve by pas geboore kinderen. II. 386. 387. 389. hoe te helpen. *ibid*. 390.

Roodvonk. Beschryving van deeze ziekte. I. 400.

zy is meest aan kinderen eigen. *ibid*. en word zelden waargenomen. *ibid*. onderscheide benaamingen van dezelve. 401. *a*. toevallen van deeze ziekte. 402. zy doet zich altoos op, als eene heerschende ziekte. 408. maar regeerd niet altyd in denzelfden tyd van het jaar. *ibid*. zy tast somtyds ook menschen van meer jaaren, maar doorgaans kinderen, aan. 409. zy is niet altyd even zwaar. *ibid*. en ook zonder uitslag waargenomen. *ibid*. hoe zy van andere koortsen met uitslag onderscheiden word. 410. de oorzaak van deeze ziekte is onbekend. 411. goede en kwaade teekenen in deeze ziekte. 412. zy is besmettende. 411. genees-wyze deezer ziekte. 414. vooral vereischt de keel eene byzondere zorg. 417. hoe de toevallen worden te keer gegaan. 420.

Rosmarinus sylvestris. Nut van denzelven tegen den kink-hoest. I. 466. en *a*. zie verder *Ledum palustre*.

Rubus Chamæmorus. Gebruik van deszelfs besen. II. 10. en *a*.

— *Oxycoccus*. Hoe men zich van deszelfs besen bediend. II. 11. en *a*.

Rugge-graat. (Gespleten.) Zie water-gezwel op den Rugge.

S.

- Scarificatien.** Nut van dezelve om het aangezigt voor de pokjes te bewaaren. I. 265. *a.*
- Schede.** Door dezelve ontlast zich fomtyds de Endeldarm. I. 75. *a.* II. 402.
- ongemakken aan dezelve by pas geboore kinderen waargenomen. II. 392. 397.
- Scheel-zien.** Waardoor de kinderen fomtyds leeren scheel-zien. 38. middelen daar tegen. *ib.* en *a.*
- SCHERZER.** Hoe deszelfs balsam bereid word. I. 98. *a.*
- Schrik.** Uitwerking van denzelven. I. 443.
- Schurft.** de morsfigheid kan als eene oorzaak van dezelve aangemerkt worden. II. 220. hoe dit te verstaan zy. 221. *a.* zy word door besmetting voortgeplant. 221. en veroorzaakt door insecten. 222. der zelve beste genees-middelen. 226. en *a.* genees-wyze. 227.
- middel om een kind voor dezelve te bewaaren. I. 42. na binnen gedreeven zynde veroorzaakt veele toevallen. 145. 456. genees-wyze van dezelve. *ib.* 146. 147. en *a.* 193. *a.* 456.
- de inenting van dezelve genas iemand van eene zeer groote zwaarmoedigheid. I. 343. *a.*
- Slaap-verwekkende middelen.** Schadelykheid der zelve. I. 46. en *a.* 101. *a.* 155. 156. *a.* 157. *a.*
- Slym.** Uit dezelve worden fomtyds vliezen geformeerd. II. 214.
- (de) word fomtyds taay en hard in de blaas. *ibid.* 215.
- Solutio mercurialis.** Wat daardoor verstaan word. II. 288. gebruik van dezelve. *ibid.* ook van kleine kinderen. 290.
- Spaansche vliegen.** Voordeelen van dezelve, in het geneezen der pokjes. I. 265. *a.* zy zyn ook fomtyds by

- by de mazelen nodig. 393. 394. 398. middelen ter voorkoming van eene brandende pyn in den pis-weg, na het aanleggen van een spaansche vlieg-pleister somtyds ontstaande 393. nut van zulk een pleister tegen den kronkel in den darm. 443. *a.* tegen het in- en uitwendig water-hoofd. II. 185. 318. *a.*
- Spigelia anhelmis* (de) word tegen de wormen aan-geraden. II. 85. en *a.*
- Spiritus mercurialis*. Bereiding van dit middel. II. 287. Sprouw. Waar aan men deezen naam geeft I. 123. *a.* toevallen, welke dezelve vergezellen. *ibid.* onderscheide soorten. 124. welke kinderen voornamentlyk daar aan onderworpen zyn. 125. hoe men dezelve kan voorkomen. 126. en geneezen. *ib.* 128. *a.* 131. middelen ter verzagting der pynen nodig. 128. *a.* 129. na het afvallen der korsten gebruike-lyk. 131. 194. wanneer een buik-zuiverend middel nodig is. *ib.*
- Spys-loop. Oorzaak, en geneezing, van denzelven. I. 195.
- Staal. Vylfel van staal is van veelen tegen de wormen aangeraaden. 129.
- Stamelen. Word somtyds veroorzaakt, als de tong-riem te ver gesneeden word. I. 52.
- Steen. Nut van het kruid van de *vitis idæa* tegen denzelven. I. 255. *a.* als een steen de klieren van de blaas prikkeld, word 'er veel slym door dezelve ontlaf. 460.
- Steen-pokjes. Wanneer zy uitkomen, en verdwynen. I. 223. *a.* zy laten somtyds lidteekens na. *ibid.*
- Stuipen. Oorzaaken, waarom de kinderen, meer dan volwasfenen, aan dezelve onderhevig zyn. I. 132. dezelve zyn in allen niet even gemeen. *ib.* *a.* teeken van dezelve. 133. wanneer men voor dezelve te vreezen hebbe, *ib.* de oorzaaken van dezelve zyn

ver

verscheiden. [135](#). eene verstopping. *ib.* buik-pyn, door kwaad of te veel zog veroorzaakt. [137](#). het zog eener kwaadaartige minne. [141](#). of van zulk eene, welke de stonden heeft. [143](#). het kiygen der tanden. [144](#) te rug gedreven uitslag. [145](#). somtyds doen zy zich op, eer de pokjes, mazelen, of roodvonk, zich openbaren. [148](#). of worden verwekt door wormen. 150. eene tusschepoozende koorts. [153](#). den steen. [154](#). slaapverwekkende middelen. [155](#). en andere oorzaaken. [163](#). het wiegen. [164](#). *a.* het kittelen. 165. zy verdwynen gemeenelyk door den tyd van zelve. [167](#). oplettenheid by dezelve nodig. [168](#). de middelen ter geneezing zyn, na verscheidenheid der oorzaak, verscheiden. [135](#). *ib.* *a.* [138](#). *a.* [139](#). [142](#). *ib.* *a.* [144](#). [145](#). *ib.* *a.* [146](#). *ib.* *a.* [149](#). *a.* 151. [152](#). *a.* [153](#). [155](#). *ib.* *a.* [158](#). *ib.* *a.* 169. wat men van dezelve in het eerste tydperk der pokjes denken moet. [224](#). en *a.* hoe men ze te keer gaat. [271](#).

Stuipen in zeeker geval op eene zonderlinge wyze geneezen. II. [64](#). *a.*

Syrupus Hordeaus. Voorschrift van deezen stroop volgens de Apotheek van *Parys*. I. [386](#). *a.*

T.

Tabak. Pillen uit het extract van Tabak zyn dikwils in een krampagtigen hoeft nuttig geweest. I. [469](#). deszelfs stroop is in een' zwaaren hoeft, met aamborstigheid aangepreezen. *ibid.* *a.*

Tanden. Hoe men weten kunne, of het kind van dezelve ziek zy. I. [107](#). en *a.* zy komen op ongelijke tyden te voorschyn. [109](#). *a.* wanneer veele tanden te gelyk uitkomen, dan openbaren zich zwaare toevallen. [110](#). by welke kinderen dezelve

vroeg, en tydig, te voorschyn komen. *ib.* hoe men zulks bevorderen kan. 112. 113. *ib.* a. somtyds worden, ter verzagting der toevallen, verdoovende middelen vereischt. 115. ook kan eene aderlating dikwils veel verligting aanbrengen. 117. *ib.* a. gelyk ook bloedzuigers, onder de ooren gezet. *ib.* wanneer het tandvleesch moet doorgesneden worden. *ib.* hoe deeze insnyding het best geschied. 118. a. een geringe loop is somtyds nuttig. 119. doch eene al te sterke ontlasting schadelijk. *ib.* en a. wat men omtrent het gebruik van wolfs-tanden, en andere harde lighaamen, aan te merken hebbe. 124. *ib.* a. hoe de koorts, welke het krygen der tanden vergezeld, word geneezen. 145. a.

Tartarus Emeticus. Dit middel komt somtyds in stuipen te pas. I. 272. het verwekt geene braakingen, maar alleen afgangen, als men het met een zout vermengd, en syn wryft. 262.

Teeldeel. Aan dezelve komen somtyds, door eene kwaade behandeling of sterke drukking by de geboorte harde gezwellen voor. II. 384. hoe zy moeten behandeld worden. *ibid.*

— worden by eerst geboore meisjes somtyds gestoten gevonden. I. 76. a. II. 393. geneezing. *ibid.* en vervolgens.

Testament. Het Hiërniesche Testament. Zie *Elixir Amarum* - HJÆRNERI.

Theer. Met dezelve en melk word in *West-Borbnien* de lint-worm te keer gegaan. II. 113. a.

Theer-water. Aan het zelve word toegefschreven de kragt om de menschen voor de pokjes te bevryden. I. 311. zonderling voorbeeld daarvan. 312. het word ook met nut ter verkryging van goedaartige pokjes gebruikt. *ibid.* hoe het moet gereed gemaakt worden. *ibid.*

The

Therebinthyn-olie (de) word in *Biorneberg* tegen den lint-worm gebruikt. II. 113. a.

Tin. Gefchript tin en rood coraal wierd door MEAD tegen de wormen aangeraaden. II. 126. manier van ALSTON in het toedienen van dit middel. *ibid.* manier van BROCKLESBY. 127. wat men alhier van het zelve heeft waargenomen. 128.

Tinea. Zie kwaad zeer.

Tinctura Catholica Purgans van D. ROTHEN. Hoe dit middel bereid word. II. 93.

———— *Rhei Amara.* Hoe volgens de *Edinburgsche* Apotheek word vervaardigd. I. 179. a.

———— *dulcis.* Voorschrift van dit middel volgens de *Edinburgsche* Apotheek. I. 260. a.

Tong (de) word fomtyds door eerstgeboore kinderen ingeslikt. I. 56. 58. II. 356. hoe dit belet kan worden. I. 57. 67. II. 356. kleeft dikwils aan het verhemelte, en belet dus het zuigen. I. 62. II. 357. middel daar tegen. *ib.* der zelve beweeging word fomtyds door tegennatuurlyke bandjes belet. I. 62. II. 357.

Tong-riem. Welk deel men daardoor verstaat. I. 50. II. 350. wanneer deeze band moet gesneden worden. I. 39. 40. 50. II. 351. manier van PETIT om dit te ontdekken. 51. hoe hy raad, zich daarby te gedraagen. 58. en de operatie te verrigten. 59. II. 352.

Trichurides van ROEDEKER. Welke wormen daardoor verstaan worden. II. 38. a.

U.

Uitslag moet niet te rug gedreven worden. I. 145. 147. a. II. 228. a. middelen, om het weder te voorschyn te doen komen. 147. a. 148. a. 193. a. ————— aan de lippen en den neus. Wat het is

tusfchenpoozende koortsen te kennen geeft. II. 17.
 Uitflag. Een zeer fterk uitflag verminderd de pokjes
 niet. I. 231.

Uitflag. Zeeker uitflag in *America* gemeen. II. 221. a.
 hoe het word voortgeplant. *ibid.*

—— (veneriefch) hoe het beft geneezen word. II.
 283. a.

Unguentum Agrippæ. Uitwendig gebruik van hetzelfde
 tegen de wormen. II. 124.

—— *Artbanitæ*. Het word uitwendig tegen de
 wormen gebruikt. II. 124.

—— *Majoranæ*. Hoe bereid word. I. 93. a.

V.

Valeriana *Sylveftris* (de) is zeer nuttig tegen de
 wormen. II. 130.

Vallende ziekte. wat men by kinderen daardoor ver-
 ftaat. I. 133. zie verder *Struipen*.

Varen. De wortel van het mannelyk Varen-kruid is zeer
 goed tegen de wormen. II. 108. 130. 138.

Venus-ziekte. Wanneer, waar van daan, en hoe;
 dezelve na Europa gekomen is. II. 230. is van tyd tot
 tyd minder kwaadaartig geworden. *ibid.* hoe men zich
 dezelve op den hals haald. 232. befmet ook de kin-
 deren. 234. welken ook door de minnen fomtyds
 deeze ziekte word medegedeeld. 238. gelyk zy de-
 zelve ook wel in andere gevallen aan de minne me-
 de deelen. 239. de deelen, welke het eerft befmet
 worden, doen ook het eerft de uitwerking der ziek-
 te zien. *ibid.* kinderen worden eer befmet, dan be-
 jaarden. 240. waarin dit vergift beftaa, is onzeeker.
 241. fomtyds blyft deeze ziekte jaaren lang verbor-
 gen. 242. 256. of vertoond zich onder andere ziek-
 ten. 243. verfcheide voorbeelden daarvan. 244. a.
 245.

245. 246. 247. tekenen deezer ziekte by kinderen.
 247. by de minne. 249. by de ouders. 252. hoe de
 veneriefche zweeren van anderen te onderscheiden
 zyn. *ibid.* 257. welke kinderen men het gemakkelykft
 helpen kan. 258. de geneezing is, in den beginne
 der ziekte, doorgaans zeeker. 259. hoe dezelve by
 zwangere vrouwen moet in het werk gesteld worden.
 262. hoe by een kind. 263. wat men van het gebruik
 van den *Mercurius dulcis*, de *Panacea Mercurialis*,
 en foortgelyke middelen, te denken hebbe. 265.
 wanneer rookingen met *Cinnaber* hulpe aanbreugen.
 266. de kwyling is onnut. 267. de gemakkelykste,
 en zeekerste, geneezing word door het smeeren te
 weeg gebragt. 271. voorbereiding daartoe. 274. dieet
 onder de cuur. 278. hoe de zalf moet gereed gemaakt
 worden. 279. hoe het smeeren geschied. 281—285.
 op welke wyze verscheide veneriefche ongemakken
 kunnen geneezen worden. 283. a. de geneezing kan
 ook te weeg worden gebragt door den *Mercurius su-
 blimatus corrosivus*. 285. 295. het best is, dat men
 by het smeeren de *solutio mercurialis* gebruikt. 291.
 waaruit het middel van PLINCK bestaat. 264. a. 292.
 wat men van onderscheide afkookfels denken moet.
 294. middel aan FABRE medegedeeld. 296. wat van
 de *Cicutate* oordeelen is. *ibid.* nut van het *Aconitum*,
 en de *Flammula Jovis*. 297. uitwendig gebruik van
 den *Spiritus mercurialis*. 298.

Verkoudheid. Welke kinderen daar mede geplaagd zyn.
 I. 93. middelen daartegen. *ib.*

————— Hoeft uit verkoudheid. I. 450. oorzaak
 daarvan. *ibid.* geneezing. 453.

Verstopping. Middel daartegen, in een eerstgebooren
 kind. I. 67. 69. a. 77. a. in een gespeend kind. 80.

Verzweeringen in de maag zyn fomtyds geneezen. I.

207. in de lever, of long zynde, geneezen zy zelden. *ibid.* in welke gevallen dit egter fomtyds geschied. 208. hoe men zich anders moet gedraagen, *ibid.*

Vet. Vette zaaken zyn voor de maag nadeelig. I. 82.

Vinum Aloëticum alkalinum. Hoe volgens de *Londensche* Apotheek bereid word. I. 487. a.

—— *Chalybeatum.* Bereiding van dit middel volgens de *Londensche* Apotheek. I. 184. a.

—— *Scilliticum.* Bereiding van deezen wyn, vol- de Apotheek van *Parys.* I. 423. a.

Vitriool-zuur doet de melk niet ronnen. I. 282. a.

Voetzool. De voetzoelen der pasgeboore kinderen zyn dikwils na binnen gekeerd. II. 414. hoe te helpen. *ib.*

Vrees. Uitwerking van dezelve. I. 443.

W.

Wal-nooten. Een met water bereid extract uit on- rype wal-nooten tegen de wormen aangeraden. II. 88.

Water. Nuttigheid van het koude water tegen den lint-worm. II. 91. Hoe men daar mede de geneezing by de *Saetra*-bron verrigt. 95.

—— lauw water ontbind verhard oor-smeer het best. II. 336.

Water-breuk. Tweërley soort van dit ongemak. II. 384. waardoor het ontstaat. 385. geneezing van het zelve. *ibid.* 386. zie ook het woord *Breuk.*

Water-gezwel op den rugge. II. 178. 326. Het zelve word verzeld door eene verlamming der onderste leden. 179. 330. hoe dit ongemak ontstaat. *ibid.* 326. 329. word gespleten rugge-graat genoemd. 180. 326. waar het doorgaans gevonden word. 326. hoe het waarschynelyk kan geneezen worden. 187. 331.

Water-

Water-hoofd. Oorzaak van deeze ziekte. II. 167. zy maakt de verlosfing voor de moeder moeiljelyk. 168. en *a.* word meestentyds eerft lang na de geboorte ontdekt. 169. 174. *a.* is fomtyds fchielyk doodelyk. 168. 174. *a.* dog in sommige gevallen niet, dan na veele jaaren. 170. ja WATSON heeft dezelve eens geneezen. 174. *a.* gevolgen deezer ziekte. *ibid.* ontdekkingen by het openen der lyken. 173. 316. word onderscheiden in een uit- en inwendig water-hoofd. *ibid.* 180. 316. de quantiteit van het water in een inwendig water-hoofd is zeer verfchillend. 175. fomtyds verzameld zich het water niet, voor dat het kind twee of drie jaar oud is. 176. 174. *a.* by volwasfenen ontftaat dit ongemak ook fomtyds. 174. *a.* met deeze ziekte zyn andere zwaare gebreken verbonden. 177. een week gezwel op het hoofd. *ibid.* een water-gezwel op den rugge. 178. befchryving van een uitwendig water-hoofd. 180. 317. verfcheide foorten van het zelve. 181. van weinige is deeze ziekte waargenomen. *ibid.* hoe het water, in beide foorten van het water-hoofd, zich vergadere. *ibid.* geneezing der zelve in het algemeen. 183. 318. der byzondere foorten. 185.

Water-pokjes. Wanneer zy uitkomen, en verdwynen. I. 223. *a.* zy zyn doorfchynend. *ibid.*

Waterzugt. In welke foort van waterzugt buikzuiverende middelen ondienftig zyn I. 173.

Wieg. hoe dezelve het beft geplaatst kan worden. I. 42. voor- en nadeel van het wiegen. 95. *a.* 164. *a.*

Wormen. Worden fomtyds by eerft-geboren kinderen waargenomen I. 150 *a.* zy komen voort uit hun zaad II. 31. hoe hun zaad in s'menfchen lighaam komt. *ibid.* waarom zy by den gemeenen man meer worden befpeurd. 32. der zelyer oorfprong is in het algemeen nog onzeker.

ker. 32. *a.* zy kunnen groote hitte verdraagen. 35. en *a.* waardoor der zelve zaad in de maag en darmen uitgebroeid word. 36. wie het meest aan dezelve onderworpen zyn. 37. vyf soorten worden inzonderheid in menschen waargenomen. 38. de aars-maaden. 39. de ronde wormen. 40. de lint-worm. 44. de *ascaris lumbricoides*. 52. *Fasciola intestinalis*. 53. *Gordius*. 54. deeze soorten zyn zelden alle te gelyk by een mensch. 56. de wormen zyn in het eene jaar gemeener, dan in het ander. *ibid.* waaruit de toevallen, welke zy veroorzaaken, voortkomen. 58. zy doorbooren somtyds de darmen 43. 59. 60. *a.* welke spyzen de wormen niet kunnen verdraagen. 63. algemeene kentekenen der wormen. 65. kentekenen der byzondere soorten. 70. middelen, waardoor de toevallen verzagt worden. I. 151. II. 73. hoe zy te verdryven zyn. 76. hoe, wanneer zy in eene ziekte iemand plaagen. 90. aanhangel aangaande de geneeswyze der wormen. 124.

Y.

Yzer-vitriool. Nut van het zelve tegen de wormen. II. 83. 133. hoe men uit eene ontbinding van het zelve, volgens MONRO, mineraal-water kan bereiden. 161. *a.*

Z.

Zeeep. Nuttigheid van dezelve tegen het zuur. I. 99. *a.* 104. sommige kinderen schynen dezelve niet te kunnen verdraagen. I. 82. *a.*

Zee-honden. Der zelve vet is, in melk gekookt, tegen den kink-hoest gebruikt. I. 468.

Zenuwen (de) der kinderen worden zeer ligt aangedaan. 132. en zyn zeer gevoelig. *ib.* het welk met de

de jaaren verminderd. 167. *a.* zy worden , naar mate het lighaam groeid, in evenredigheid kleiner. *ib.* en zyn minder week.

Zog. Het zog van de moeder is voor een kind beter, dan dat van eene minne. I. 1. noodzakelykheid, dat de moeder haar eige kind zoogd, betoogd. 2. *a.* In welke gevallen dit egter af te raaden is. *ib.* 3. 5. *a.* teekenen van goed zog. 8. men moet het onderzoeken, als de minne nog nugteren is. 9. *a.* schadelykheid van het zog, wanneer de minne haare borsten aan de koude heeft blootgesteld. 13. wanneer zy zich kwaad gemaakt heeft. 24. of heeft geschrikt. 25. wanneer zy kortlings gegeten heeft, of nugter is. 28. 29.

— Hoe men hetzelfde, als het verminderd, fomtyds weder kan vermeerderen. I. 29. Het eerste zog is voor een eerstgebooren kind een buikzuiverend middel. 78. *a.* hoe oud zog, het welk de kinderen verstoppt maakt, te verdunnen zy. 80. *a.* waardoor het zog in de maag der kinderen ligt zuur word. 95. *a.* Zout. Nut van het keuken-zout tegen de wormen. II. 76. 77. *a.*

Zuigen. Hoe lang een kind zuigen moet. I. 42. ongemakken, welke hetzelfde beletten. 49. 123. zoo in de kinderen. 50. als in de minnen. 65. het te veel zuigen is nadeelig 137. en *a.*

Zuur. Oorzaak van hetzelfde. I. 95. *a.* 428. toevallen, welke door hetzelfde verwekt worden. *ib.* middelen om te beletten, dat hetzelfde geformeerd worde, en hoe te verbeteren. 98. *a.* 99. 105. 429. II. 154. 158.

Zwagtelen. Hoe het zwagtelen geschieden moet. I. 30. uitwerking van het styf zwagtelen. 45.

Zwavel (de) in- en uitwendig gebruikt, is het beste middel tegen de schurft. II. 226.

- Zweeren (Chankeragtige), kentekenen derzelven. II.
 250. Hoe dezelve van kankeragtige, en die, welke
 door den fcheurbuik ontftaan te onderscheiden zyn.
 252. 258. hoe zy het best geneezen worden. 283. a.
 ————— Kankeragtige, II. 254. onderscheid van de-
 zelve. *ibid.*
 ————— Scheurbuikige, waardoor zy gekend worden.
 II. 257.

D R U K F O O T E N.

- I. Deel. pag. 74. reg. 17. *Urinarmia* lees *Urinariam*.
 127. r. 28. *festem* l. *festum*. 185. r. 16. *aut* l. *aut*.
 191. r. ult. *Sacchari* l. *Sacchari*. 286. r. 22. dezel-
 ve l. derzelven. 368. r. 2. den l. de. 411. r. 6. welke
 l. het welk. 453. r. 13. net. l. niet. 488. r. 18.
 ziekte. l. zieke. 490. r. 12. den l. de.
 II. Deel. pag. 39. reg. 12. gebuik lees gebruik. 76.
 r. 22. zyn l. is. 95. r. 6. zegen l. zeven. 177. r.
 14. Het bestaat l. Het eerste bestaat. 178. r. 27.
chir. art. I. l. *chir. Fasc.* I. *art.* I. 217. r. 18. scha-
 lyk. l. schadelyk. 236. r. 9. ander. l. anders. 239.
 r. 20. Sockholm. l. Stockholm. 298. r. 3. Regimets
 l. Regiments. 303. r. 7. welk l. welke. 335. r. 19.
Sclerotica l. *Sclerotica*. 359. r. 28. *Barol.* l. *Berol.*
 374. r. 24. werker l. welker. 419. r. 14. by l. hy.

